

## فصل ۷

# جذب و انتقال مواد در گیاهان

نکته ۱: همه گیاهان توانایی فتوسنتز را دارند. (مثال گیاهان انگلی)

نکته ۲: همه سلول‌های یک گیاه و در پی آن پروتئین و لیپید را تولید کنند؛ اما همچنان به مواد مغذی مانند آب و مواد معدنی نیاز دارند. فتوسنتز کننده هم دارای گیاهان، این مواد را به کمک اندام‌های خود، به ویژه ریشه‌ها جذب می‌کنند. گیاهان چه ساز و کارهایی

کلروپلاست و کلروپیل نیستند. برای جذب مواد مورد نیاز و نیز انتقال آنها به اندام‌های خود دارند؟ مواد حاصل از فرایند فتوسنتز چگونه به سراسر گیاه منتقل می‌شوند؟ در این فصل به فرایندهای مربوط به تغذیه، جذب و انتقال

نکته ۳: گیاه آب و مواد معدنی را از طریق ریشه در پی می‌گیرد. مورد نیاز خود را عموماً از طریق ریشه در پی می‌گیرد.

نکته ۸: بیشتر کربن دی اکسید گیاه از راه روزنه و از هوای میان می شود ولی مقدار کمی هم از طریق برگ و یا ریشه به صورت بی کربنات جذب می شود.

نکته ۹: در گیاهان دولپه ای حیوان هم در ریشه و هم در برگ روزنه وجود دارد ولی در گیاهان ساقه دار

## گفتار ۱ تغذیه گیاهی

ولگی ای بی در برگ روزنه وجود دارد و در ساقه گیاه که بافت پوششی آن از نوع پیرایوسی است روزنه وجود ندارد و جاهای آن مدسک دارد و بی از طریق مدسک جذب می شود.

گیاهان، مواد مورد نیاز را از (هوا، آب یا خاک اطراف) خود جذب می کنند. کربن دی اکسید یکی از مهم ترین موادی است که گیاهان از هوا جذب می کنند. (کربن، اساس ماده آلی و بنابراین یکی از

عناصر مورد نیاز گیاهان است. کربن دی اکسید به همراه سایر گازها از طریق روزنه ها وارد فضاها

بین باخته ای گیاه می شود. مقداری از کربن دی اکسید هم با حل شدن در آب، به صورت بی کربنات در

در گیاهانی مانند کاکتوس ها در شرایطی می آید که می تواند توسط گیاه جذب شود. سایر مواد مغذی هم بیشتر از طریق خاک جذب می شوند.

دراخت و گرم زندگی می کنند؛ اگر روزها روزنه هایشان را **بزرگ** باز کنند، هر چه  $O_2$  و  $H_2O$  و  $CO_2$  دارد.

## خاک و مواد مغذی مورد نیاز گیاهان

خاک، ترکیبی از مواد آلی، غیر آلی و ریزاندامگان ها (میکروارگانیسم ها) است. خاک های مناطق

مختلف به علت تفاوت در این ترکیبات، توانایی متفاوتی در نگهداری آب، مقدار هوای خاک، pH و

مواد معدنی دارند. در شب ها  $CO_2$  را جذب می کنند و آن را در واگوشول هایشان

در حال تجزیه آنها تشکیل شده است. گیاهان، با داشتن بارهای منفی، یون های مثبت را در سطح

خود نگه می دارند و در نتیجه مانع از شست و شوی این یون ها می شوند. گیاهان همچنین باعث

اسفنجی شدن حالت خاک می شود که برای نفوذ ریشه مناسب است.

کازها، و ظایف تفرق (فروم گزها) زرات غیر آلی خاک از تخریب فیزیکی و شیمیایی سنگ ها در فرایندی به نام هوازدگی ایجاد می شوند.

این ذرات از اندازه بسیار کوچک رس تا درشت شن و ماسه را شامل می شوند. تغییرات متناوب یخ زدن

و ذوب شدن، که باعث خرد شدن سنگ ها می شود، نمونه ای از اثر هوازدگی فیزیکی است. اسیدهای

تولید شده توسط جانداران و نیز ریشه گیاهان هم می توانند هوازدگی شیمیایی ایجاد کنند.

نکته ۸: گیاهان هم مانند کلاهیک با بی نفوذ راحت تر ریشه به داخل خاک می شود.

نکته ۹: مثل مواد مغذی خاک سنگ است.

خاک های مختلف، ذراتی با اندازه های مختلف دارند. تحقیق کنید که رشد ریشه گیاهان در خاک های

### فعالیت

رسی و ماسه ای با چه چالش ها و فرصت هایی روبه روست؟

### جذب مواد معدنی خاک

نیتروژن و فسفر دو عنصر مهمی هستند که در ساختار پروتئین ها و مولکول های وراثتی شرکت


می کنند. گیاهان، ترکیبات این دو عنصر را بیشتر از خاک جذب می کنند.

## جذب نیتروژن

با اینکه جو زمین دارای ۷۸ درصد نیتروژن ( $N_2$ ) است، گیاهان نمی‌توانند شکل مولکولی نیتروژن را جذب کنند. بیشتر نیتروژن مورد استفاده گیاهان به صورت یون آمونیوم ( $NH_4^+$ ) یا نیترات ( $NO_3^-$ ) است. این ترکیبات در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل می‌شوند. خلاصه‌ای از این فرایندها در شکل ۱ نشان داده شده است. به تبدیل نیتروژن جو به نیتروژن قابل استفاده گیاهان تثبیت نیتروژن گفته می‌شود. بخشی از نیتروژن تثبیت شده در خاک، حاصل عملکرد زیستی باکتری‌هاست. باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن، به صورت آزاد در خاک یا همزیست با گیاهان زندگی می‌کنند. نیتروژن تثبیت شده در این باکتری‌ها به مقدار قابل توجهی دفع، و یا پس از مرگ آنها برای گیاهان قابل دسترس می‌شود. مهم‌ترین انواع تثبیت نیتروژن، در ادامه این فصل توضیح داده خواهد شد. امروزه تلاش‌های زیادی برای انتقال ژن‌های مؤثر در تثبیت نیتروژن به گیاهان در جریان است، تا بدون نیاز به این باکتری‌ها، نیتروژن مورد نیاز در اختیار گیاه قرار گیرد.

در شکل ۱ انواع دیگری از باکتری‌های خاک دیده می‌شوند. نقش هر یک از آنها در تغییر و تبدیل مواد نیتروژن دار چیست؟

شکل ۱- تغییرات مواد نیتروژن دار و چگونگی جذب آنها از خاک



## جذب فسفر


فسفر (P) از دیگر عناصر معدنی است که کمبود آن، رشد گیاهان را محدود می‌کند. گیاهان، فسفر مورد نیاز خود را به صورت یون‌های فسفات از خاک به دست می‌آورند. گرچه فسفات در خاک فراوان است، اغلب برای گیاهان غیرقابل دسترس است. یکی از دلایل، این است که فسفات به بعضی ترکیبات معدنی خاک به طور محکمی متصل می‌شود. برخی گیاهان برای جبران، شبکه گسترده‌تری از ریشه‌ها و یا ریشه‌های دارای تارکستونه بیشتر ایجاد می‌کنند که جذب را افزایش می‌دهد.

نکته ۱۳: فسفات در خاک فراوان است ولی فسفر در اغلب خاک‌ها کم است.

نکته ۱۴: در هم‌ی گیاهان تارکستونه وجود دارد مانند گیاهان دولی‌ان پیرکس سامان باصت یوسلنی آن‌ها ۹۹ از نوع پیرا پوست است و فاقد تارکستونه است.

نکته ۱۵: نیتراتی هم که وارد ریشه می‌شود در ریشه به آمونیوم تبدیل می‌شود و این آمونیوم است که در طول ریشه حرکت می‌کند.

نکته ۱۲: یون‌های فسفات که گیاه از خاک می‌گیرد، به صورت  $H_2PO_4^-$  و  $HPO_4^{2-}$  است.




## بهبود خاک

خاک مناطق مختلف ممکن است دچار کمبود برخی مواد یا فزونی مواد دیگر باشد. اصلاح این خاک‌ها می‌تواند آنها را برای گیاهان قابل کشت کند. اگر این خاک‌ها دچار کمبود باشند، با افزودن کود می‌توان حاصلخیزی آنها را افزایش داد. زیست‌شناسان برای تشخیص نیازهای تغذیه‌ای گیاهان، آنها را در محلول‌های مغذی رشد می‌دهند (شکل ۲). این محلول‌ها، آب و عناصر مغذی محلول به مقدار معین دارند. از این شیوه برای تشخیص اثرات عناصر بر رشد و نمو گیاهان نیز استفاده می‌شود.

مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم قابل دسترس در اغلب خاک‌ها محدود است، به همین دلیل در بیشتر کودها این عناصر وجود دارند. کودهای مهم در انواع آلی، شیمیایی و زیستی (بیولوژیک) وجود دارند. کودهای آلی، شامل بقایای در حال تجزیه جانداران اند. این کودها مواد معدنی را به آهستگی آزاد می‌کنند و چون به نیازهای جانداران شباهت بیشتری دارند، استفادهٔ بیش از حد آنها به گیاهان آسیب کمتری می‌زند. از معایب این کودها، احتمال آلودگی به عوامل بیماری‌زاست.

کودهای شیمیایی شامل

مواد معدنی هستند که به راحتی در اختیار گیاه قرار می‌گیرند؛ بنابراین می‌توانند به سرعت، کمبود مواد مغذی خاک را جبران کنند. مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی می‌تواند آسیب‌های زیادی به خاک و محیط‌زیست وارد و بافت خاک را تخریب کند. از طرفی، با شسته شدن توسط



شکل ۲- دستگاه ساده‌ای برای کشت گیاهان در محلول‌های مغذی

بارش‌ها، این مواد به آب‌ها وارد می‌شوند. حضور این مواد باعث رشد سریع باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان آبی می‌شود. افزایش این عوامل مانع نفوذ نور و اکسیژن کافی به آب می‌شود و می‌تواند باعث مرگ و میر جانوران آبی شود.

کودهای زیستی شامل باکتری‌هایی هستند که برای خاک مفید و با فعالیت و تکثیر خود، مواد معدنی خاک را افزایش می‌دهند. استفاده از این کودها بسیار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر است. این کودها معمولاً به همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می‌شوند و معایب دو نوع کود دیگر را ندارند.

همان‌طور که کاهش عناصر مغذی در خاک برای گیاهان زیان‌بار است، افزایش بیش از حد بعضی مواد در خاک می‌تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان می‌توانند

غلظت‌های زیادی از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگهداری کنند؛ مثلاً نوعی سرخس می‌تواند باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان را می‌تواند (آرسنیک را که ماده‌ای سمی برای گیاه است) در خود جمع کند. بعضی گیاهان می‌توانند

ماده‌های سمی را نیز در بافت‌ها ذخیره کنند. مثلاً گیاه گل‌آدرسی که در خاک‌های خنثی و قلیایی صورتی باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان را می‌تواند (آرسنیک را که ماده‌ای سمی برای گیاه است) در خود جمع کند. بعضی گیاهان می‌توانند

نکته ۱۵: کودهای آبی کم‌کم مواد معدنی را آزاد می‌کنند ولی کودهای شیمیایی خودشان مواد معدنی را به سرعت کمبود مواد معدنی گیاه را تا ماه می‌کنند.

نکته ۱۶: شسته شدن کودهای شیمیایی توسط باران و آب و وارد شدن آن به حوضچه‌های آبی و دریاها و... یک سود و ضرر دارد: سود آن این است که

بعضی مواد در خاک می‌تواند مسمومیت ایجاد کند و مانع رشد گیاهان شود. بعضی گیاهان می‌توانند غلظت‌های زیادی از این مواد را درون خود به صورت ایمن نگهداری کنند؛ مثلاً نوعی سرخس می‌تواند باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان را می‌تواند (آرسنیک را که ماده‌ای سمی برای گیاه است) در خود جمع کند. بعضی گیاهان می‌توانند

ماده‌های سمی را نیز در بافت‌ها ذخیره کنند. مثلاً گیاه گل‌آدرسی که در خاک‌های خنثی و قلیایی صورتی باکتری‌ها، جلبک‌ها و گیاهان را می‌تواند (آرسنیک را که ماده‌ای سمی برای گیاه است) در خود جمع کند. بعضی گیاهان می‌توانند

نکته ۱۸: بعضی از گیاهان مانند همین گل (درسی دارا) و کوسل‌هایی هستند که توانایی ذخیره‌ی آلومینیوم دارند.

**بیشتر بدانید**

به دلیل اینکه بیشتر کشور ما دارای اقلیم خشک و یا شور است، عناصری مانند بور و آلومینیم در خاک‌ها فراوان است که می‌تواند باعث مسمومیت در گیاهان شود. گیاهان از بور برای استحکام دیواره‌ی یاخته‌ای استفاده می‌کنند ولی افزایش آن موجب کاهش نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم برگ‌ها می‌شود. یون آلومینیم نیز یکی از مواد فراوان خاک است و به مقدار کم می‌تواند به بافت‌های گیاهی نفوذ کند. این یون مانع جذب مواد معدنی دیگر و آب، توسط ریشه‌ها می‌شود. (مقدار آلومینیم در خاک‌های اسیدی فراوان‌تر است.)

رنگ هستند در خاک‌های اسیدی آبی رنگ می‌شوند. این تغییر رنگ به علت تجمع آلومینیوم در گیاه است (شکل ۳). بعضی گیاهان نیز با جذب و ذخیره‌ی نمک‌ها، موجب کاهش شوری خاک می‌شوند. با کاشت و برداشت این گیاهان در چند سال پی‌درپی می‌توان باعث کاهش شوری خاک و بهبود کیفیت آن شد.

← **چقدر رقتند**



شکل ۳- رنگ گل گیاه ادرسی در خاک‌های اسیدی (الف) و قلیایی و خنثی (ب)

**فعالیت**

آزمایشی را طراحی کنید که به کمک آن بتوان تأثیر کاهش یا افزایش مواد معدنی را در رشد و نمو گیاهان تعیین کرد.

نکته ۱۹: گیاهانی مانند چغندر رقت با جذب فراوان نمک و ذخیره‌ی آن در صورت باغی امراضی مثل اسهال در صورت کلاه و کاسه‌ی مساز اسهالی می‌شوند.

کتاب ۱: تمام قارچ ها هموتروف هستند و نمی توانند مواد آلی تولید کنند و باید این مواد را از جانداران هموتروف بگیرند.

## گفتار ۲ جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

کتاب ۲: عملکرد قارچ ریشه ها مانند عملکرد نارسیده ها است.

کتاب ۳: قارچ ریشه ها به ریشه گیاهانی می پیوندند و توانایی فتوسنتز دارند. چون در دانه گیاهان که هموتروفات فتوسنتز نمی کنند، مانند گیاهان انگلی.

گیاهان شیوه های شگفت انگیزی برای گرفتن مواد مورد نیاز خود از جانداران دیگر دارند. گیاهان با بعضی از این جانداران ارتباط همزیستی برقرار می کنند. از مهم ترین انواع این همزیستی ها، قارچ ریشه ای ها (میکوریزا) و باکتری های تثبیت کننده نیتروژن هستند.


### قارچ ریشه ای

یکی از معمول ترین سازگاری ها برای جذب آب و مواد مغذی، همزیستی ریشه گیاهان با انواعی از قارچ ها است که به آن قارچ ریشه ای گفته می شود (شکل ۴). حدود ۹۰ درصد گیاهان دانه دار با قارچ ها همزیستی دارند. این قارچ ها در سطح ریشه زندگی می کنند. رشته های ظریفی به درون ریشه می فرستند که تبادل مواد را با آن انجام می دهند.

در قارچ ریشه ای، قارچ، مواد آلی را از ریشه گیاه می گیرد و برای گیاه، مواد معدنی و به خصوص فسفات فراهم می کند. پیکر رشته ای و بسیار ظریف قارچ ها، نسبت به ریشه گیاه با سطح بیشتری از خاک در تماس است و می تواند مواد معدنی بیشتری را جذب کند.



(ب)



(الف)

شکل ۴- قارچ ریشه ای: (الف) طرح ساده نوعی قارچ ریشه ای که غلافی را روی ریشه گیاه تشکیل می دهد. بخش کوچکی از قارچ به درون ریشه نفوذ و در تبادل مواد شرکت می کند. (ب) مقایسه دو گیاه که یکی با کمک قارچ ریشه ای (چپ) و دیگری بدون آن (راست) و در وضعیت برابر محیطی رشد کرده است.

نکته ۴: ریزوبیوم ها با دارایی هتر و سروتنز و همی آن ها توانایی تثبیت نیتروژن را دارند.  
 نکته ۵: هم ریزوبیوم ها و هم سیانوباکتری ها هر دو با کتری هستند پس دارای ویژگی های ① و ②  
 فاقد هستند مشخص ④ فاقد DNA هستند ③ فاقد آنزیم ⑤ دارای ریزوبیوم و ... هستند.



شکل ۵- گرهک های ریشه گیاهان تیره پروانه واران

**همزیستی گیاه با تثبیت کننده های نیتروژن**

برخی گیاهان با انواعی از باکتری ها همزیستی دارند که این همزیستی برای به دست آوردن نیتروژن بیشتر است. دو گروه مهم این باکتری ها عبارت اند از: ریزوبیوم ها و سیانوباکتری ها.

**ریزوبیوم:** از گذشته برای تقویت خاک، تناوب کشت انجام می شد که در آن گیاهان زراعی مختلف به صورت پی در پی کشت می شد. یکی از انواع گیاهانی که در تناوب کشت مورد استفاده قرار می گیرد، گیاهان تیره پروانه واران است (دلیل این نام گذاری، شباهت گل های آنها به پروانه است). (سویا، نخود و یونجه) از گیاهان مهم زراعی این تیره هستند. (در ریشه این گیاهان و در محل برجستگی هایی به نام گرهک، نوعی باکتری تثبیت کننده نیتروژن به نام ریزوبیوم زندگی می کند (شکل ۵)). هنگامی که این گیاهان می میرند یا بخش های هوایی آنها برداشته می شود، گرهک های آنها در خاک باقی می ماند و گیاه خاکی از نیتروژن ایجاد می کنند. ریزوبیوم ها با تثبیت نیتروژن، نیاز گیاه را به این عنصر برطرف می کنند و گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز باکتری را برای آن فراهم می کند.

**بیشتر بدانید**


گیاه آبی آزولا، بومی ایران نیست و برای تقویت مزارع برنج به تالاب های شمالی وارد شد. رشد سریع این گیاه موجب کاهش اکسیژن آب و مرگ بسیاری آبیان می شود. این گیاه اکنون به معضلی برای این تالاب ها بدل شده است. چنین مواردی به ما هشدار می دهند که نباید بدون مطالعه و در نظر داشتن پیامدهای احتمالی، گونه های غیربومی را وارد محیط زیست کرد.

**همزیستی با سیانوباکتری ها.** سیانوباکتری ها نوعی از باکتری های فتوسنتز کننده هستند

که بعضی از آنها می توانند علاوه بر فتوسنتز، تثبیت نیتروژن هم انجام دهند. آزولا گیاهی کوچک است که در تالاب های شمال و مزارع برنج کشور به فراوانی وجود دارد. گیاه آزولا با سیانوباکتری ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده آن را دریافت می کند (شکل ۶- الف). گیاه گونوا نیز در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفت انگیزی دارد. چگونه این گیاه با وجود کمبود نیتروژن چنین رشدی دارد؟ سیانوباکتری های همزیست درون ساقه و دمبرگ این گیاه، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می کنند (شکل ۶- ب).

الف) گیاه گونوا یک گیاه بار دانا است. ب) گیاه گونوا

شکل ۶- الف) گیاه آبی آزولا،



شکل ۶- ب) گیاه گونوا  
 نکته ۶: گیاهان گونوا در تالاب های شمالی کشور به فراوانی وجود دارند. این گیاه با سیانوباکتری ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده آن را دریافت می کند (شکل ۶- الف). گیاه گونوا نیز در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفت انگیزی دارد. چگونه این گیاه با وجود کمبود نیتروژن چنین رشدی دارد؟ سیانوباکتری های همزیست درون ساقه و دمبرگ این گیاه، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می کنند (شکل ۶- ب).

نکته ۹: سیانوباکتری ها در ساقه و ساقه و دمبرگ های گیاه گونوا دیده می شود. در برگی این گیاه ریزوبیوم  
 نکته ۱۰: گیاه سیانوباکتری سواناکی فتوسنتز را در ریزوبیوم می کند. بعضی از گیاهان در جایی از  
 گیاه گونوا در تالاب های شمالی کشور به فراوانی وجود دارند. این گیاه با سیانوباکتری ها همزیستی دارد و نیتروژن تثبیت شده آن را دریافت می کند (شکل ۶- الف). گیاه گونوا نیز در نواحی فقیر از نیتروژن رشد شگفت انگیزی دارد. چگونه این گیاه با وجود کمبود نیتروژن چنین رشدی دارد؟ سیانوباکتری های همزیست درون ساقه و دمبرگ این گیاه، تثبیت نیتروژن انجام می دهند و از محصولات فتوسنتزی گیاه استفاده می کنند (شکل ۶- ب).

نکته ۱۱: فتوستنزه، تکثیر CO<sub>2</sub> مهم گویند. حاله همی ریزوبیوم ها توانایی تکثیر نیتروژن را دارند ولی هیچکدام از آن ها توانایی تکثیر CO<sub>2</sub> را ندارند. ولی سیانوباکتری ها اغلب توانایی تکثیر نیتروژن را دارند و همه شان توانایی تکثیر CO<sub>2</sub> را دارند.

**روش های دیگر به دست آوردن مواد غذایی در گیاهان**

**گیاهان حشره خوار:** این گیاهان فتوستنزه کننده اند و در مناطقی زندگی می کنند که از نظر نیتروژن فقیرند. در این گیاهان برخی برگ ها برای شکار و گوارش جانوران کوچک مانند حشرات، تغییر کرده است. **گیاه توبره واش** که از گیاهان حشره خوار است در تالاب های شمال کشور می روید. این گیاه حشرات و لارو آنها را به سرعت به درون بخش کوزه مانند خود می کشد و سپس گوارش می دهد. در شکل ۸، انواع دیگری از گیاهان حشره خوار نشان داده شده است.



شکل ۷- توبره واش



نیم تنس



دیو یا ونوس



دروزر یا ونوس

شکل ۸- چند نوع گیاه حشره خوار.

**گیاهان انگل:** انواعی از گیاهان انگل وجود دارند که همه یا بخشی از آب و مواد غذایی خود را از گیاهان فتوستنزه کننده دریافت می کنند. گیاه بسس، نمونه ای از این گیاهان است. این گیاه ساقه نارنجی یا زرد رنگی تولید می کند که فاقد ریشه است. گیاه بسس به دور گیاه سبز میزبان خود می پیچد و اندام های مکنده ایجاد می کند (شکل ۹- الف) که به درون آوندهای گیاه نفوذ، و مواد مورد نیاز انگل را جذب می کند. گل جالیز نمونه دیگری از این گیاهان است که با ایجاد اندام مکنده و نفوذ آن به ریشه گیاهان جالیزی، مواد مغذی را دریافت می کند (شکل ۹- ب).

مانند: کدو، لهندوانه، زرنجه، خیار، کعبه فرنگی



ب) گیاه گل جالیز در کنار بوته گوجه فرنگی

گیاهان بالری



شکل ۹- گیاهان انگل: الف) گیاه بسس




نکته ۱: تعرق یعنی خروج آب به صورت بخار از گیاه به وسیلهٔ پores از روزنه‌های هوایی صورت می‌گیرد ولی از پوست و مدسک نیز تعرق انجام می‌شود.  
 نکته ۲: تعریق یعنی خروج آب به صورت مايع از گیاه که از روزنه‌ها آب به صورت مايع می‌گیرد.

نکته ۳: تعرق در سه گیاهت وجود دارد.  
 نکته ۴: تعریق در بعضی از گیاهان علمی موجود دارد.

### گفتار ۳ انتقال مواد در گیاهان

نکته ۵: حامل اصلی تعرق پتانسیل آب است.  
**انتقال از خاک به برگ**


آب و مواد مورد نیاز گیاهان، که از خاک اطراف ریشه‌ها جذب می‌شود و در مسیرهایی به ساقه و برگ می‌رود (بخش زیادی از آب جذب شده از سطح برگ‌ها به هوا تبخیر می‌شود). خروج آب به صورت ATP، مصرف انرژی، آزاد شدن فسفا بخار از سطح اندام‌های هوایی گیاه تعرق نامیده می‌شود. تعرق، سازوکار لازم را برای جابه‌جایی آب و مواد معدنی به برگ فراهم می‌کند. جابه‌جایی مواد در گیاهان را می‌توان در دو مسیر کوتاه و بلند بررسی کرد: (در مسیر کوتاه، جابه‌جایی آب و مواد در سطح یا چند یاخته بررسی می‌شود). در مسیر بلند، جابه‌جایی مواد در مسیرهای طولانی‌تر بررسی می‌شود. این مسافت در بعضی درختان به بیش از صد متر می‌رسد. در هر دوی این مسیرها آب به‌عنوان انتقال‌دهندهٔ مواد، نقش اساسی دارد که این ریزه وجود دارد، ولی عبور آب از نقش به‌علت ویژگی‌های آن است). پروتئین‌های کانالی در بعضی سلول‌ها موجود نیست و انجام نمی‌گیرد. بلکه بعضی از سلول‌ها با غشای واکوئولی و در بعضی از واکوئول‌های سلول گیاهی این پروتئین کانالی در جابه‌جایی مواد در مسیر کوتاه



شکل ۱۰ - پروتئین تسهیل کننده عبور آب در غشا

**انتقال مواد در سطح یاخته‌ای:** در این حالت، جابه‌جایی مواد با فرایندهای فعال و غیرفعال و در حد یاخته انجام می‌شود. با این فرایندها قبلاً آشنا شدید. شیوه‌هایی مثل انتشار و انتقال فعال، نمونه‌هایی از این روش‌هاست. برای انتقال آب در عرض غشای بعضی یاخته‌های گیاهی و جانوری و غشای واکوئول بعضی یاخته‌های گیاهی، پروتئین‌هایی دخالت دارند که سرعت جریان آب را افزایش می‌دهند. هنگام کم‌آبی، ساخت این پروتئین‌ها تشدید می‌شود (شکل ۱۰).

آگو آبرین



شکل ۱۱ - شیوه‌های انتقال مواد در مسیرهای کوتاه

**انتقال مواد در عرض ریشه:** در عرض ریشه، انتقال آب و مواد محلول معدنی به سه روش انجام می‌شود: انتقال از عرض غشا، انتقال سیمپلاستی و انتقال اپوپلاستی. پلاسمودسم = مسیر عرض غشایی شامل جابه‌جایی مواد از عرض غشای یاخته است. سیمپلاست به معنی پروتوپلاست همراه با پلاسمودسم‌ها است. انتقال سیمپلاستی حرکت


مواد از پروتوپلاست یک یاخته به یاخته مجاور، از راه پلاسمودسم‌هاست. آب و بسیاری از مواد محلول می‌تواند از فضای پلاسمودسم به یاخته‌های دیگر منتقل شود (شکل ۱۱). منافذ پلاسمودسم آن قدر بزرگ است که پروتئین‌ها، نوکلئیک اسیدها و حتی ویروس‌های گیاهی از آن عبور می‌کنند. در مسیر اپوپلاستی، حرکت مواد محلول از فضاهای بین یاخته‌ای و دیواره یاخته‌ای انجام می‌شود.

نکته ۱۰: در مسیرهایی که آب و مواد محلول در آن از پروتوپلاست سلول (بعضی ریزه سلول) عبور می‌کنند توسط سیمپلاست سلول با ریزی می‌شوند و از زورود مواد مغذی و ناخالصی‌ها جلوگیری می‌کنند ولی در مسیر اپوپلاستی چون دیگر آب و مواد محلول در آن از پروتوپلاست عبور نمی‌کنند، پس با ریزی نمی‌شوند و احتمال دارد در درای مواد مغذی باشند، با طریقه‌هایی اصطلاحاً مسیر اپوپلاستی مسیر قاعی می‌گویند.

نکته ۹: در مسیر عرض غشای آب و مواد محلول در آن از بعضی ریزه سلول یعنی پروتوپلاست و غشا و دیواره سلول عبور می‌کنند. در مسیر سیمپلاستی آب و مواد محلول در آن از بعضی ریزه سلول یعنی پروتوپلاست و غشا و دیواره سلول عبور می‌کنند. در مسیر اپوپلاستی آب و مواد محلول در آن از بعضی ریزه سلول یعنی پروتوپلاست و غشا و دیواره سلول عبور می‌کنند.

کتاب ۱۱: هم در مسیر عرض غشایی و هم در مسیر سیمپلاستی مواد محلول در آب و مواد آلی از بیرون به داخل عبور می کنند. منتها تفاوت این دو مسیر در این است که در مسیر عرض غشایی آب و مواد محلول در آن از دیواره سلول ها عبور می کنند.

آب و مواد محلول در عرض ریشه سرانجام به درونی ترین لایه پوست به نام درون پوست (آندودرم) می رسند. درون پوست استوانه ای ظریف از یاخته ها است که یاخته های آن کاملاً به هم چسبیده اند و سدی را در مقابل آب و مواد محلول ایجاد می کنند (شکل ۱۲). یاخته های درون پوست در دیواره



شکل ۱۲- مسیر آپوپلاستی، سیمپلاستی و عرض غشایی در گیاهان: نوار کاسپاری درون پوست مانع انتقال آپوپلاستی از درون پوست به درون آوند چوبی می شود. همان طور که مشاهده می شود جابه جایی مواد در بخشی از مسیر می تواند آپوپلاستی و یا سیمپلاستی باشد.

کتاب ۱۲: چوب پنبه یا سوبیرین یکی موم است. همان طور که در فصل اول خواص موم ها دسته ای بسیار کم از لیپیدها بودند. و در آنجا خواندیم که مومها آبگریزی بسیار سریعی دارند. پس وقتی که آب و مواد محلول در مسیر آپوپلاستی حرکت می کنند و در لایه درون پوست (سوبیرین) جانبی خود دارای نواری از جنس چوب پنبه (سوبیرین) هستند که به آن نوار کاسپاری گفته می شود. بنابراین آب و مواد محلول آن نمی توانند از طریق مسیر آپوپلاستی وارد یاخته های درون پوست شوند. یاخته های درون پوست انتقال مواد را کنترل می کنند (این لایه در ریشه مانند صافی عمل می کند که مانع از ورود مواد ناخواسته یا مضر مسیر آپوپلاستی به درون گیاه می شوند. درون پوست، همچنین از برگشت مواد جذب شده به بیرون از ریشه جلوگیری می کند). بعد از درون پوست حرکت در هر سه مسیر ادامه می یابد. مواد به آوندهای چوبی منتقل، و آماده جابه جایی برای مسیرهای طولانی تر می شود که به این فرایند بارگیری چوبی گفته می شود.

در ریشه بعضی گیاهان، نوار کاسپاری علاوه بر دیواره های جانبی درون پوست، دیواره پشتی را نیز می پوشاند و انتقال مواد از این یاخته ها را غیر ممکن می کند. در برش عرضی و زیر میکروسکوپ نوری این یاخته ها ظاهر نعلی یا U شکل دارند (شکل ۱۳). در این گیاهان یاخته های درون پوستی ویژه ای، به نام یاخته معبر وجود دارند که فاقد نوار کاسپاری در اطراف خود هستند و انتقال مواد به آندها از طریق این یاخته ها انجام می شود.




دو بار آن کتاب ۱۵: انتقال آب

شیره خ کارآمد نیست سرعت انتقال چندین متر و با همراهی فشار

فعال، یون این یون ها، قشای با عا هل د صعود شیره عاملی باعث تعرق: علت تعرق چوبی پوست

(شکل ۱۵) بیشتر یک روز گرم آوندهای چوبی کتاب ۱۷: پیوستگی

شکل ۱۳- تصویر میکروسکوپی  
مقطع عرضی ریشه نوعی گیاه.  
یاخته‌های معبر با پیکان نشان داده  
شده‌اند. یاخته‌های درون پوست در  
این ریشه‌ها به صورت نعلی شکل (U)  
دید می‌شود.



نکته ۴: سلول‌های ریشه پیرامون  
آوندهای ریشه، دو نوع (نوع D)  
سلول‌های پارانشیمی که در گفتار

دو با آن‌ها آشنا شویم و سلول‌های پایه ریشه را (مستعد).

نکته ۵: این دو نوع سلول در نکته ۴ گفتیم با سلول‌های پایه آنزودرم یون‌های معدنی را با انعقاد فعال  
**انتقال آب و مواد معدنی در مسیرهای بلند** یعنی با مصرف ATP و انرژی و آزاد کردن فسفات و تولید ADP

شیره خام در گیاهان، گاه تا فواصل بسیار طولانی جابه‌جا می‌شود. انتشار برای فواصل طولانی، به درون آوندهای چوبی منتقل  
کارآمد نیست. در گیاهان، جابه‌جایی مواد در مسیرهای طولانی توسط جریان توده‌ای انجام می‌شود.

سرعت انتشار آب و مواد در گیاه، چند میلی‌متر در روز است ولی در جریان توده‌ای، این سرعت به  
چندین متر در روز می‌رسد. جریان توده‌ای در آوندهای چوبی تحت اثر دو عامل فشار ریشه‌ای و تعرق،  
و با همراهی خواص ویژه آب انجام می‌شود.

**فشار ریشه‌ای:** یاخته‌های درون پوست و یاخته‌های زنده پیرامون آوندهای ریشه، با انتقال  
فعال، یون‌های معدنی را به درون آوندهای چوبی منتقل می‌کنند. این عمل باعث افزایش مقدار  
این یون‌ها، افزایش فشار اسمزی و در نتیجه ورود آب به درون آوند چوبی می‌شود. در اثر تجمع آب و  
یون‌ها، فشار در آوندهای چوبی ریشه افزایش می‌یابد و فشار ریشه‌ای را ایجاد می‌کند. فشار ریشه‌ای  
باعث هل دادن شیره خام به سمت بالا می‌شود (شکل ۱۴). در بیشتر گیاهان، فشار ریشه‌ای در  
صعود شیره خام نقش کمی دارد و در بهترین حالت می‌تواند چند متر آن را به بالا بفرستد. پس چه  
عاملی باعث حرکت شیره خام به نوک درختان بسیار بلند می‌شود؟


**تعرق:** عامل اصلی انتقال شیره خام، مکشی است که در اثر تعرق از سطح گیاه ایجاد می‌شود.  
علت تعرق نیز حرکت آب از محل دارای آب بیشتر به محل با آب کمتر است. ستون آب درون آوندهای  
چوبی پیوسته است. این پیوستگی به علت ویژگی‌های هم‌چسبی و دگرچسبی مولکول‌های آب است  
(شکل ۱۵).

بیشتر تعرق گیاهان از روزنه‌های برگ انجام می‌شود. نیروی مکش تعرق آن قدر زیاد است که در  
یک روز گرم می‌تواند باعث کاهش قطر تنه یک درخت شود؛ هرچند این کاهش اندک است. اگر دیواره  
آوندهای چوبی استحکام کافی نداشت به راحتی در اثر مکش تعرق، له می‌شد.

نکته ۱۷: تعرق برخلاف ویژگی‌های هم‌چسبی و دگرچسبی و فشار ریشه‌ای باید تضعیف پیوستگی ستون آب می‌شود.

نکته ۱۲: درست است که در بیشتر  
گیاهان فشار ریشه‌ای عامل اصلی  
نیست ولی در بعضی از گیاهان  
مانند بعضی از گیاهان بی‌مغز  
ریشه آنقدر امز این‌ها می‌یابد  
که آب به نوک ریشه می‌رسد  
و از آنجا از طریق روزنه‌ها  
آبی خارج می‌شود. به این  
پدیده تعرق می‌گویند.

شکل ۱۴- آزمایشی برای  
اندازه‌گیری فشار ریشه‌ای



سلول‌های نگهبان روزنه قابل تنظیم است و در هر یک ستک و یا گلاسه تعرق کامل تنظیم نیست.

توانایی فتوسنتز در ریزوم کلروفل و کلروپلاست در آن سلول‌ها را نگهبان روزنه هستند.


توانایی تغییر اندازه کنت و همچنین درازن آن‌ها افزایش می‌دهد و شکلی شبیه به سکه پیدا می‌کند و در نتیجه دیواره پستی از یک طرف بیشتر است.

آنها افزایش می‌دهد و کنت آنها تغییر اندازه می‌دهد و شکلی شبیه به سکه پیدا می‌کند و در نتیجه دیواره پستی از یک طرف بیشتر است.

در حالت غیرفعال، دیواره پستی از یک طرف بیشتر است.


نکته ۱۸: هنگام مرگ آب از رگبرگ خارج می‌شود و در میان سلول‌های مسلول‌های رگبرگ اسفنجی و داخل خود سلول‌های میان‌برگ اسفنجی. از هر دو طریق با هم در فضای میان‌برگ یا فضای بین رگبرگ‌ها یون‌های و به بخار آب تبدیل می‌شوند و سپس از فضای میان‌برگ‌ها خارج می‌شوند.

در گیاهان، تعرق می‌تواند از طریق روزنه‌های هوایی، پوستک و عدسک‌ها انجام شود. بیشتر تبادل گازها و در نتیجه تعرق برگ‌ها از منفذ (روزنه) بین یاخته‌های نگهبان روزنه هوایی انجام می‌شود. روزنه‌های هوایی می‌توانند با باز و بسته شدن، مقدار تعرق را تنظیم کنند. باز و بسته شدن روزنه به دلیل ساختار خاص یاخته‌های نگهبان روزنه و تغییر فشار تورژسانس آنهاست. جذب آب به دنبال انباشت مواد محلول در یاخته‌های نگهبان روزنه انجام می‌شود. عوامل محیطی و عوامل درونی گیاه بازوبسته شدن روزنه‌ها را تنظیم می‌کنند. مثلاً نور با تحریک انباشت ساکارز و یون‌های  $K^+$  و  $Cl^-$  در یاخته نگهبان، فشار اسمزی یاخته‌ها را افزایش می‌دهد و آب از یاخته‌های مجاور به یاخته‌های نگهبان روزنه وارد می‌شود. در نتیجه، یاخته‌ها دچار تورژسانس شده و به علت ساختار ویژه آنها، روزنه باز می‌شود. بسته شدن روزنه‌ها هم، به علت خروج آب از یاخته‌های نگهبان روزنه انجام می‌شود (شکل ۱۶).



شکل ۱۵- حرکت شیره خام، تحت تأثیر مکش تعرقی‌های روپستی ساقه‌ها می‌شود. و هم‌بسط‌کردن هم‌فقط در پیرا پوست وجود دارد.

**ساختار یاخته‌های نگهبان روزنه:** دیواره یاخته‌های نگهبان روزنه، ساختار خاصی دارند که با جذب آب، افزایش طول پیدا می‌کنند. یکی از این عوامل، آرایش شعاعی رشته‌های سلولزی است که مانند کمر بندی دور دیواره یاخته‌های نگهبان روزنه قرار دارند. این کمر بندی‌های سلولزی، هنگام تورژسانس یاخته، مانع از گسترش عرضی یاخته شده، ولی مانع افزایش طول یاخته نمی‌شوند. عامل دیگر، اختلاف ضخامت در دیواره یاخته‌های نگهبان روزنه است. هنگام تورژسانس، به علت ضخامت کمتر، دیواره پستی یاخته بیشتر منبسط می‌شود. این دو ویژگی باعث می‌شود هنگام جذب آب و تورژسانس، یاخته‌ها خمیدگی پیدا کند و منفذ روزنه هوایی باز شود. در این حالت امکان تبادل گازها، فراهم می‌شود (شکل ۱۶).



نکته ۲۲: سلول‌های نگهبان روزنه با دلیل این‌که دارای رشته‌های سلولزی شعاعی هستند هنگام تورژسانس این کمر بندی‌های سلولزی از افزایش قطری و عرضی آنها مانع می‌شود. در نتیجه گیاه فقط رشد طولی پیدا می‌کند.

شکل ۱۶- چگونگی باز و بسته شدن روزنه‌های هوایی

دیواره پستی ← دیواره شکلی ← دیواره پستی

نکته ۲۳: دیواره شکلی دارای منفذ است بیشتر و هنگام تورژسانس انبساط کمتری دارد ولی دیواره پستی دارای منفذ است کمتر و هنگام تورژسانس انبساط بیشتری دارد.

عوامل مؤثر بر در گیاهان بر حرکات روزنه هستند. افزایش روزنه‌ها در گیاه رفتار روزنه‌ها و سبب می‌شود روزنه‌ها، کاهش هستند. شما چه فعالیت

نکته ۲۹: فعالیت

ب) برگ نازک آن از پ) نامی بزرگ نامی ت) تع یا میکروسکو

نکته ۳۱: تعرق در هنگام درون پوست می‌دهند. اگر سطح برگ علفی خارج ایجادکننده تعرق گرفت. تعرق ریشه‌های است

نکته ۳۲: ولی روزنه

نکته ۳۳: تا نوع

نکته ۳۴: در شب

ولی تعرق

نکته ۳: هر کدام از عوامل درونی و محیطی در پایین، عوامل اصلی تعرق شیبند و فقط عوامل مکمل هستند. عامل اصلی تعرق حرکت آب از مکان با فشار اسمزی پایین تر (پیریتانسیل) با مکان با فشار اسمزی بالاتر (کم پیتانسیل) است.

نکته ۲۵: یکی از عوامل درونی که در بستن روزنهها مؤثر است آبسیزیک است. نام دارد.

در گیاهان، تغییرات مقدار نور، دما، رطوبت و کربن دی اکسید از مهم ترین عوامل محیطی مؤثر نکته ۲۶: هر عاملی که باعث بستن روزنهها بر حرکات روزنههای هوایی است. مقدار آب گیاه و نیز هورمونهای گیاهی، از عوامل درونی مهم هستند. افزایش مقدار نور، دما و کاهش کربن دی اکسید، تا حدی معین، می تواند باعث باز شدن روزنهها در گیاهان شود. کاهش شدید رطوبت هوا باعث بسته شدن روزنهها می شود.

رفتار روزنههای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوسها، در حضور نور متفاوت است. سبب بستن است. ولی بعضی از گیاهان مانند و سبب می شود در طول روز، روزنهها بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود. کاهش تعداد همین کتوسها چون در روزنهها بستن روزنهها، کاهش تعداد یا سطح برگها نیز از سازگاریهای گیاهان برای زندگی در محیطهای خشک است. روزنهها بستن را با زنگنه و CO2 را برمی آورند. شما چه سازگاریهای دیگری را می شناسید؟ بعضی گیاهان در شب روزنهها را باز میکنند تا برای خودشان CO2 انباشتند و فردا با فتوسنتز بپردازند.

نکته ۲۹: یکی دیگر از راهکارهای دیگر برای کاهش تعرق بیسی از طریق بستن روزنهها در سطح فعالیت


الف) یک برگ شاداب تره را انتخاب کرده و سطح پشتی و رویی آن را مشخص کنید.

- ب) برگ را از محل رگبرگ میانی به بیرون شکسته ولی روپوست را پاره نکنید. هر نیمه را به نحوی به طرفین بکشید تا روپوست نازک آن از بافتهای زیرین جدا شود. این کار اگر با دقت انجام شود روپوست غشایی و بی رنگ را جدا می کند.
- پ) نمونه را در یک قطره آب، روی تیغه شیشه ای قرار دهید و با تیغک بیوشانید. یاخته های روپوست و نگهبان روزنه را در بزرگ نمایی های مختلف مشاهده کنید. آیا می توانید سبب بسته شدن روزنهها را در این یاختهها ببینید؟ فقط در نگهبان روزنهها
- ت) تعداد روزنههای موجود در میدان دید را شمارش کنید. تعداد روزنه را در واحد سطح برگ تعیین کنید.
- ث) با استفاده از تیغ تیز و با احتیاط، نمونه های روپوست پشتی را از برگ گیاهان میخک، شمعدانی و برگ بیدی تهیه و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. یاخته های روپوست و نگهبان روزنه را در این گیاهان و تره مقایسه کنید.

نکته ۳۱: تعرق همیشه در گیاهان دیده می شود و تعرق فقط در بعضی گیاهان ملاحظه می شود.  
نکته ۳۲: تعرق از طریق روزنهها در تمام گیاهان ملاحظه می شود و تعرق از طریق روزنههای آب انجام می شود.

### تعریق

در هنگام شب یا در هوای بسیار مرطوب که شدت تعرق کاهش می یابد، یاخته های درون پوست همچنان به پمپ کردن یونهای معدنی به درون استوانه آوندی ادامه می دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه ای به برگها می رسد از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به صورت قطراتی از انتهای یا لبه برگهای بعضی گیاهان علفی خارج می شود که به آن تعریق می گویند (شکل ۱۷). گرچه شرایط محیطی ایجادکننده تعریق مشابه شرایط ایجاد شبنم است، این دو پدیده را نباید با هم اشتباه گرفت. تعریق از ساختارهای ویژه ای به نام روزنههای آبی انجام می شود و نشانه فشار ریشه ای است. این روزنهها همیشه باز هستند و محل آنها در انتهای یا لبه برگهاست.



نکته ۳۳: روزنههای آبی روزنهها هستند که همیشه باز هستند ولی روزنههای معمولی بعضی اوقات باز و بعضی اوقات بسته اند.  
نکته ۳۴: روزنههای معمولی هم به طور معمولی شکل ۱۷- تعریق در گیاهان

نکته ۳۵: تفاوت تعریق و شبنم مثل قرار گرفتن قطرات آب در تعریق در انتهای برگ یا لبه برگ است ولی شبنم روی سطح برگ است. شبنم آب محیط است که میعان می شود و روی سطح برگ قرار می گیرد ولی تعریق از طریق روزنهها است.

نکته ۳۰: راهکارهایی برای کاهش تعرق در گیاهان خزه ها روزنهها را می بندد

نکته ۳۶: همی بخشی های فتوسنتز کننده گیاه محل منبع اند. ولی هر محل منبعی بخشی فتوسنتز کننده  
 نکته ۳۷: شیرهای پرورده که از مناطق حرکت کننده از محل منبع به همی مناطق زنده گیاه می رود به همی  
 مناطق گیاه

نکته ۳۸: حرکت شیرهای پرورده از محل منبع به محل مصرف را با جایی می گیرند.

### فعالیت


#### مشاهده باز و بسته شدن روزنه های هوایی

الف) همانند فعالیت قبل، روپوست تره یا کاهو را تهیه کنید و درون محلول های ۰/۵ درصد KCl، آب خالص و آب نمک ۴ درصد در روشنایی قرار دهید. مشابه این نمونه ها را تهیه و در تاریکی قرار دهید.  
 ب) پس از ۱۵ دقیقه، روپوست را در یک قطره از همان مایعی که درون آن قرار دارد، زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. در کدام محلول ها روزنه ها باز و در کدام بسته اند؟ آیا میزان باز یا بسته بودن روزنه ها یکسان است؟ چرا؟  
 پ) پس از ۱۵ دقیقه نمونه های تاریکی را به سرعت زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. چرا باید به سرعت آنها را مشاهده کنیم؟ وضعیت روزنه ها را با مرحله قبل مقایسه کنید.

### حرکت شیریه پرورده

می دانید که شیریه پرورده، درون آوندهای آبکشی حرکت می کند. حرکت شیریه پرورده در همه جهات می تواند انجام شود. بخشی از گیاه که ترکیبات آلی مورد نیاز بخش های دیگر گیاه را تأمین می کند، محل منبع و بخشی از گیاه که ترکیبات آلی به آنجا می روند و ذخیره (مثلاً ریشه) یا مصرف (گل) می شوند، محل مصرف نامیده می شود. برگ ها از مهم ترین محل های منبع هستند. بخش های ذخیره کننده مواد آلی، هنگام ذخیره این مواد، محل مصرف و هنگام آزادسازی آن، محل منبع به شمار می آیند. برای تعیین سرعت و ترکیب شیریه پرورده می توان از شته ها استفاده کرد (شکل ۱۸).

شته رای حس می کنند و سپس خرطوم آن را می برند.



شکل ۱۸- استفاده از شته برای تعیین سرعت و ترکیب شیریه پرورده


**چگونگی حرکت شیریه پرورده:** حرکت شیریه پرورده از طریق سیتوپلاسم یاخته های زنده آبکشی و از یاخته ای به یاخته دیگر انجام می شود. بنابراین حرکت شیریه پرورده از شیریه خام کندتر و پیچیده تر است. یک گیاه شناس آلمانی به نام ارنست مونس، الگوی جریان فشاری را برای جابه جایی شیریه پرورده، ارائه داده است که در شکل ۱۹ به طور خلاصه مشاهده می کنید.

یعنی حرکت شیریه پرورده از محل منبع به محل مصرف

نکته ۳۹: سلول‌ها، محل منبع با انتقال فعال قند و مواد آلی را با درون آوند آبکی می‌فرستد اما مصرف انرژی و ATP و تولید ADP و آزاد شدن فسفات همراه است.

بغیر از ساکارز (فروکتوز + گلوکز) و سایر مواد آلی (سیدهای میوه)

نکته ۴۰: در گرفتار فصل انتقال قند و مواد آلی در کنار سلول‌های آوند آبکی، سلول‌های همراه قرار دارند که این سلول‌ها دارای هینوکندریس زیادی بودند و مسئول ساخت ATP برای سلول‌های آوند آبکی بودند. حال در اینجا خواهیم دید که آوند آبکی چگونه در بار برداری و در بارگیری آبکی مواریبا انتقال فعال عبور و حرکت می‌کنند.



مرحله ۱: قند و مواد آلی در محل منبع، به روش انتقال فعال، وارد یاخته‌های آبکی می‌شوند. به این عمل، بارگیری آبکی می‌گویند.

مرحله ۲: با افزایش مقدار مواد آلی و به ویژه ساکارز، فشار اسمزی یاخته‌های آبکی افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه، آب از یاخته‌های مجاور آوندهای چوبی به آوند آبکی وارد می‌شود.

مرحله ۳: در یاخته‌های آبکی، فشار افزایش یافته و در نتیجه محتویات شیره پرورده به صورت توده‌ای از مواد به سوی محل دارای فشار کمتر (محل مصرف) به حرکت درمی‌آید.

مرحله ۴: در محل مصرف، مواد آلی شیره پرورده، با انتقال فعال، بار برداری (بار برداری آبکی) و آنجا مصرف یا ذخیره می‌شوند.

شکل ۱۹- چگونه حرکت مواد در آوند آبکی


حرکت از طریق نان

شان دان

شان دان

مواد آلی در گیاهان به صورت تنظیم شده، تولید و مصرف می‌شوند. برای مثال در گل دهی یا تولید میوه، گاهی تعداد محل‌های مصرف، بیشتر از آن است که محل‌های منبع بتوانند مواد غذایی آنها را فراهم کنند. در این موارد ممکن است گیاه به حذف بعضی گل‌ها، دانه‌ها یا میوه‌های خود اقدام کند تا مقدار کافی مواد قندی به محل‌های مصرف باقی مانده برسد. در باغبانی، برای داشتن میوه‌های درشت‌تر، تعدادی از گل‌ها یا میوه‌های جوان را می‌چینند تا درختان میوه‌هایی کمتر ولی درشت‌تر به بار آورند.

حذف پوست به صورت یک حلقه از تنه درخت (شامل آوند آبکی) (هم مسود)



بخش جدا شده شامل آوند آبکی

مواد آلی در آوند آبکی بالای حلقه جمع شده و باعث تورم در این بخش می‌شود.

تعدادی از گل‌ها یا میوه‌های جوان را می‌چینند تا درختان میوه‌هایی کمتر ولی درشت‌تر به بار آورند.

شکل ۲۰- طرحی برای نشان دادن محل آوند آبکی و جهت جریان شیره پرورده. تورم در بالای حلقه نشان می‌دهد که شیره پرورده فقط در آوند آبکی و نه در آوند چوبی (بخش باقیمانده در تنه) جریان دارد.