



نام و نام خانوادگی :	رشته : ریاضی و فیزیک	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	سؤالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲
تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	ساعت شروع: ۸ صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کینهت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	نمره	استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است.
۱	۰/۵	درستی یا نادرستی عبارت های زیر را تعیین کنید. الف) تابع تائزانت در هر بازه ای که در آن تعریف شده باشد، صعودی است. ب) اگر برای تابع $f$ داشته باشید $f''(c) = 0$ آن گاه همواره نقطه $(c, f(c))$ نقطه عطف تابع است.
۲	۰/۵	جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. الف) اگر تابعی در یک فاصله هم صعودی و هم نزولی باشد، تابع در آن فاصله ..... است. ب) اگر $f$ یک تابع و $I \subseteq D_f$ یک همسایگی از نقطه $c$ باشد که به ازای هر $x$ متعلق به $I$ داشته باشیم $f(x) \leq f(c)$ ، در این صورت $f(c)$ را یک ..... تابع $f$ می نامیم.
۳	۱	الف) نمودار تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را در بازه $[0, 4]$ رسم کنید. ب) به کمک نمودار $f(x)$ نمودار تابع $g(x) = 2f(x-1)$ را رسم کنید. سپس دامنه و برد $g$ را تعیین کنید.
۴	۰/۷۵	اگر باقی مانده تقسیم چند جمله ای $p(x) = x^4 + kx^3 - 3$ بر $x+1$ برابر ۲ باشد، $k$ را تعیین کنید.
۵	۱	اگر $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1} \leq \left(\frac{1}{27}\right)$ باشد، حدود $x$ را به دست آورید.
۶	۰/۵	چند جمله ای $x^5 + 3x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x$ را بر حسب عامل $x+2$ تجزیه کنید.
۷	۱/۲۵	معادله مثلثاتی $\cos^3 x + \cos x = 0$ را حل کنید.
۸	۱/۵	نمودارداده شده مربوط به تابعی با ضابطه $y = a \sin bx + c$ است. مقادیر $a$ و $b$ و $c$ را محاسبه کنید و ضابطه آن را مشخص نمایید. 
۹	۱/۵	حدود زیر را بیابید. الف) $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{\lfloor x \rfloor - 2}{x - 2}$ ب) $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^+} \frac{2}{\tan x}$ پ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^3 + 2x + 1}{4x - 1}$

نام و نام خانوادگی :	رشته : ریاضی و فیزیک	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	سؤالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲
تعداد صفحه: ۲	تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	ساعت شروع: ۸ صبح	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت شهریور ماه سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>

ردیف	نمره	استفاده از ماشین حساب ساده بلامانع است.
۱۰	۱	با توجه به نمودار تابع $f$ ، موارد زیر را به دست آورید. (الف) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ (ب) $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \end{cases}$ 
۱۱	۰/۵	اگر خط $y = 2$ مجانب افقی تابع $f(x) = \frac{ax^3 + 1}{2x^3 - 3x}$ باشد، مقدار $a$ را بیابید.
۱۲	۱/۵	مشتق پذیری تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 + 1 & x \geq 1 \\ 3x - 1 & x < 1 \end{cases}$ بررسی کنید.
۱۳	۲/۷۵	مشتق توابع زیر را به دست آورید . ( ساده کردن مشتق الزامی نیست). (الف) $f(x) = (4x^3 - 5x)^3 (\sqrt{x} + 1)$ (ب) $g(x) = \frac{9x + 1}{x - x^3}$ (پ) $h(x) = \sin(3x^3)$
۱۴	۰/۷۵	با در نظر گرفتن نمودار تابع $f$ در شکل مقابل از بین نقاط مشخص شده مطلوب است طول نقطه ای که : (الف) تابع در آن مشتق پذیر نیست . (ب) مماس در آن موازی محور طول هاست . (پ) مشتق و مقدار تابع در آن مثبت است. 
۱۵	۱	معادله حرکت متخرکی به صورت $f(t) = 2t^3 - t + ۳$ بر حسب متر است. ( $t$ بر حسب ثانیه است). (الف) سرعت متوسط تابع در بازه $[۰, ۳]$ را به دست آورید. (ب) سرعت لحظه ای تابع را در $t = ۴$ به دست آورید.
۱۶	۱	ضرایب $a$ و $b$ را در تابع $f(x) = x^3 + ax - b$ طوری پیدا کنید که نقطه $(۱, ۲)$ اکسترمم نسبی تابع باشد.
۱۷	۱	جهت تقر و مختصات نقطه عطف تابع $f(x) = x(x^3 - ۳) + ۱$ را تعیین کنید.
۱۸	۲	جدول رفتار و نمودار تابع $f(x) = \frac{x + ۳}{1 - x}$ رسم کنید.
۲۰	جمع نمرات	موفق و سریلند باشید. «

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>		
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست (۰/۲۵) تمرين صفحه ۳۴ ب) نادرست (۰/۲۵) صفحه ۱۳۲	۰/۵
۲	الف) ثابت (۰/۲۵) تمرين ۴ صفحه ۲۲ ب) ماکریم نسبی (۰/۲۵) تعریف صفحه ۱۱۲	۰/۵
۳	مشابه کارد کلاس صفحه ۴ $R_g = [0, 4]$ و $D_g = [1, 5]$ هر قسمت (۰/۲۵)	۱
۴	مشابه تمرين صفحه ۲۲ $x+1=0 \Rightarrow x=-1 \quad (0/25) \Rightarrow p(-1)=2 \Rightarrow (-1)^4 + k(-1)^3 - 3 = 2 \Rightarrow k=4 \quad (0/5)$	۰/۷۵
۵	مشابه تمرين ۹ صفحه ۲۲ $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1} \leq \left(\frac{1}{3}\right)^3 \quad (0/25) \Rightarrow 2x+1 \geq 3 \quad (0/5) \Rightarrow x \geq 1 \quad (0/25)$	۱
۶	کارد کلاس صفحه ۲۰ $(x+2)(x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16) \quad (0/5)$	۰/۵
۷	مشابه تمرين صفحه ۴۴ $\cos x(2\cos x + 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \cos x = 0 \quad (0/25) \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2} \quad (0/25) \\ 2\cos x + 1 = 0 \Rightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Rightarrow x = 2k\pi \pm \frac{2\pi}{3} \quad (0/25) \end{cases}$	۱/۲۵
۸	مشابه تمرين ۴ صفحه ۳۴ $\begin{cases}  a  + c = 5 \\ - a  + c = -1 \end{cases} \quad (0/25) \Rightarrow c = 2 \quad (0/25), \quad a = \pm 3 \quad (0/25)$ $4\pi = \frac{2\pi}{ b } \quad (0/25) \Rightarrow  b  = \frac{1}{2} \Rightarrow b = \pm \frac{1}{2} \quad (0/25)$ $\Rightarrow y = 3\sin \frac{x}{2} + 2, \quad y = -3\sin(-\frac{x}{2}) + 2 \quad (0/25)$ در صورت نوشتن فقط یکی از ضابطه‌ها نمره داده شود.	۱/۵
«ادامه در صفحه دوم»		

با اسمه تعالی

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه			تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور سال ۱۴۰۱			مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۹	مشابه صفحه ۵۳ مشابه تمرين صفحه ۶۹	۱/۵	(الف) $\frac{1-2}{2^--2} = \frac{-1}{-} = +\infty \quad (0/5)$ (ب) $\frac{2}{\tan(\frac{\pi}{2})^+} = \frac{2}{-\infty} = + \quad (0/5)$  (پ) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x^r}{4x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{4} = +\infty \quad (0/5)$
۱۰	مشابه تمرين صفحه ۶۹	۱	(الف) ۲ $(0/5)$ (ب) $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty & (0/25) \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = +\infty & (0/25) \end{cases}$
۱۱	مشابه کاردکلاس صفحه ۶۶	۰/۵	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{ax^r + 1}{2x^r - 3x} = 2 \Rightarrow \frac{a}{2} = 2 \Rightarrow a = 4 \quad (0/5)$
۱۲	مشابه تمرين ۶ صفحه ۱۰۰ تابع در $x=1$ پیوسته است. $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^r + 1 - 2}{x - 1} = 2 \quad (0/5)$ , $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x - 1 - 2}{x - 1} = 3 \quad (0/5)$ (پ) پس تابع در $x=1$ مشتق پذیر نمی باشد. $f'_+(1) \neq f'_-(1) \quad (0/25)$	۱/۵	
۱۳	مشابه تمرين صفحه ۱۰۱	۲/۷۵	(الف) $f'(x) = \underbrace{3(4x^r - 5x)^r (8x - 5)(\sqrt{x} + 1)}_{(0/75)} + \underbrace{\frac{1}{2\sqrt{x}}(4x^r - 5x)^r}_{(0/5)}$  (ب) $g'(x) = \underbrace{\frac{9(x-x^r) - (1-2x)(9x+1)}{(x-x^r)^2}}_{(0/25)} \quad (0/5)$  (پ) $h'(x) = 6x \cos(3x^r) \quad (0/5)$
۱۴	مشابه تمرين صفحه ۸۲ الف) $b$ (پ) $d$ (ب) $e$ (پ) $c$	۰/۷۵	
«ادامه در صفحه سوم»			

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: حسابان ۲	رشته: ریاضی و فیزیک	ساعت شروع: ۸ صبح	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه												
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه			تاریخ امتحان: ۱۴۰۱/۰۶/۰۱												
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در شهریور سال ۱۴۰۱ مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی <a href="http://aee.medu.ir">http://aee.medu.ir</a>															
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره													
۱۵	مشابه تمرین صفحه ۱۱۰	۱	$\text{الف} \quad \frac{f(3) - f(0)}{3 - 0} = \frac{18 - 3}{3} = 5 \quad (0/5)$ $\text{ب} \quad f'(t) = 4t - 1 \Rightarrow f'(4) = 15 \quad (0/5)$												
۱۶	تمرین ۷ صفحه ۱۲۶	۱	$f(1) = 2 \Rightarrow a - b = 1 \quad (0/25)$ $\begin{cases} f'(x) = 3x^2 + a & (0/25) \Rightarrow 3 + a = 0 \Rightarrow a = -3 \quad (0/25), \\ f'(1) = 0 & b = -4 \quad (0/25) \end{cases}$												
۱۷	تمرین ۲ صفحه ۱۳۶	۱	$f'(x) = 3x^2 - 3 \Rightarrow f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x = 0 \quad (0/25)$ <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>+</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr> <tr> <td><math>f''</math></td><td>-</td><td>+</td><td></td></tr> <tr> <td><math>f</math></td><td>↑</td><td>↓</td><td>↑</td></tr> </table> <p>نقشه <math>(0, 0)</math> نقطه عطف تابع است. <math>(0/25)</math> جدول <math>(0/5)</math></p>	$x$	$-\infty$	$+$	$+\infty$	$f''$	-	+		$f$	↑	↓	↑
$x$	$-\infty$	$+$	$+\infty$												
$f''$	-	+													
$f$	↑	↓	↑												
۱۸	مشابه تمرین ۱ صفحه ۱۴۴	۲	$y = -1 \quad \text{مجاذب افقی} \quad (0/25) \quad , \quad x = 1 \quad \text{مجاذب قائم} \quad (0/25)$ <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>1</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr> <tr> <td><math>f'</math></td><td>+</td><td></td><td>+</td></tr> <tr> <td><math>f</math></td><td>-1</td><td><math>+\infty</math></td><td>-1</td></tr> </table> <p><math>f'(x) = \frac{4}{(1-x)^3}</math> نقطه بحرانی ندارد <math>(0/25)</math> جدول <math>(0/75)</math> نمودار <math>(0/5)</math></p>	$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$	$f'$	+		+	$f$	-1	$+\infty$	-1
$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$												
$f'$	+		+												
$f$	-1	$+\infty$	-1												
۲۰	در نهایت نظر همکاران محترم صائب است.														