

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ

## فیزیک (۳)

رشته‌های ریاضی و فیزیک – علوم تجربی

راهنمای معلم

پایه دوازدهم


دوره دوم متوسطه

## راهنمای پاسخ‌یابی پرسشی‌ها و مسئله‌های فصل ۱

### ۱-۱ شناخت حرکت

الف

۱-۱ شناخت حرکت  
 الف) با توجه به داده‌های نقشه شکل زیر،  
 ب) مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟  
 ج) در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشد؟




۱-۱ شناخت حرکت  
 الف) تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید.  
 ب) مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟  
 ج) در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشد؟



۱-۱ شناخت حرکت  
 الف) تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید.  
 ب) مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟  
 ج) در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشد؟

۱-۱ شناخت حرکت  
 الف) تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید.  
 ب) مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟  
 ج) در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشد؟

۱-۱ شناخت حرکت  
 الف) تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید.  
 ب) مفهوم فیزیکی این دو کمیت چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟  
 ج) در چه صورت تندی متوسط و اندازه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشد؟




$$s_{av} = \frac{l}{\Delta t} = \frac{188 \text{ km}}{\frac{4}{3} \text{ h}} = 66 \text{ km/h}$$

$$v_{av} = \frac{d}{\Delta d} = \frac{60 \text{ km}}{\frac{4}{3} \text{ h}} = 45 \text{ km/h}$$

ب) مفهوم فیزیکی تندی متوسط اشاره بر این دارد که خودرو به‌طور میانگین در هر ساعت چه مسافتی از مسیر را پیموده است. در حالی که مفهوم فیزیکی سرعت متوسط، اشاره بر این نکته دارد که خودرو به‌طور میانگین در هر ساعت چقدر به مقصد خود نزدیک‌تر شده است. (یعنی در جهت بردار جابه‌جایی حرکت کرده است.)

پ) اگر مسیر جاده بین مبدأ و مقصد تقریباً مستقیم باشد در این صورت تندی متوسط با اندازه سرعت متوسط تقریباً برابر خواهد شد. در ادامه این مسئله می‌توانید از دانش‌آموزان بخواهید تا مسیرهای دسترسی بین شهرهای استان محل اقامت خود را از این منظر بررسی کنند.

۲ الف) بردارهای مکان متحرک برای لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$  روی شکل زیر نشان داده شده است. (برای لحظه  $t_2$  نیز به‌طور مشابه می‌توانید رسم کنید.)



$$\vec{d}_1 = 2\vec{i} \quad , \quad \vec{d}_2 = -3\vec{i}$$

(در SI)

ب) بردار جابه‌جایی در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  برابر است با

(در SI)

$$\vec{d} = \vec{d}_2 - \vec{d}_1 = -3\vec{i} - 2\vec{i} = -5\vec{i}$$

۳ الف) متحرک B دارای حرکت با سرعت ثابت و در نتیجه بدون شتاب است. متحرک‌های A و C دارای حرکت شتابدار ثابت‌اند و با توجه به بیشتر بودن شیب نمودار سرعت-زمان متحرک C، شتاب این متحرک از شتاب متحرک A بزرگ‌تر است.  
 ب) مشابه مثال ۹-۱ و نتیجه‌گیری این مثال که در پایان اشاره شده است دانش‌آموزان به سادگی می‌توانند شتاب هر متحرک را به دست آورند.  
 پ) با استفاده از رابطه ۱-۴ به سادگی می‌توان جابه‌جایی این سه متحرک را در بازه زمانی داده شده پیدا کرد.

$$\Delta x_B = (v_{av})_B \Delta t = (2 \text{ m/s})(1 \text{ s}) = 2 \text{ m}$$


از آنجا که دانش‌آموزان در درس ریاضی پایه یاددهم با پیدا کردن نقطه وسط یک پاره خط آشنا شده‌اند به سادگی می‌توانند برای

متحرک‌های A و C، از رابطه  $v_{av} = \frac{v_0 + v}{2}$  استفاده کنند. به این ترتیب داریم :

$$\Delta x_A = (v_{av})_A \Delta t = \left( \frac{0 + 1 \text{ m/s}}{2} \right) (1 \text{ s}) = 0.5 \text{ m}$$

$$\Delta x_C = (v_{av})_C \Delta t = \left( \frac{0 + 2 \text{ m/s}}{2} \right) (1 \text{ s}) = 1.0 \text{ m}$$

### اثبات رابطه ۹-۱



نقطه M وسط پاره خط AB قرار دارد.

مثلث‌های BNM و BCA با یکدیگر مشابه‌اند. به این ترتیب داریم :

$$\frac{NM}{AC} = \frac{BM}{BA} = \frac{BM}{2BM} \Rightarrow \frac{NM}{v + v_0} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow NM = \frac{v + v_0}{2}$$

از طرفی NM برابر میانگین  $v_0$  تا  $v$  است.

۴ الف) مشابه مثال ۹-۱ است.

ب) با استفاده از رابطه ۹-۱ داریم :

$$a_{av} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1} = \frac{6 \text{ m/s} - 0}{2 \text{ s} - 0} = 3 \text{ m/s}^2$$

پ) مشابه مثال قبل قسمت پ).

۵ الف) با توجه به نمودار سرعت - زمان، شتاب متحرک را در بازه‌های

متفاوت پیدا می‌کنیم. دانش‌آموزان باید توجه کنند که در لحظه‌هایی که شتاب متحرک تغییر کرده است مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.

دربازه زمانی ۰ تا ۵s


$$a = \frac{(1 - 0) \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 0.2 \text{ m/s}^2$$

دربازه زمانی ۵s تا ۱۵s


$$a = \frac{(-1 - 1) \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = -0.2 \text{ m/s}^2$$

#### بررسی‌ها و مسئله‌های فصل ۱


۱-۱ شتاب حرکت  
با توجه به داده‌های نقشه شکل زیر.



۱-۲ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟  
۱-۳ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟  
۱-۴ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟




۱-۵ شتاب زیر نمودار مکان - زمان حرکت یک دودانه دوی



۱-۶ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟  
۱-۷ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟  
۱-۸ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟




۱-۹ شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟



دربازه زمانی ۱۵s تا ۲۵s

$$a = \frac{(1^{\circ} + 1^{\circ})m/s^2}{1^{\circ}s} = 2m/s^2$$



ب) از رابطه ۱-۴ و مشابه مسئله ۳ قسمت (پ)، جابه‌جایی متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی پیدا می‌کنیم.

دربازه صفر تا ۵s

$$\Delta x = v_{av} \Delta t = \left( \frac{0 + 1^{\circ} m/s}{2} \right) (5s) = 2.5m$$

چون  $x_0 = -1^{\circ}m$  فرض شده است، در پایان این بازه زمانی، یعنی در لحظه  $t=5s$ ، مکان متحرک در  $x=1.5m$  قرار دارد.

$$\Delta x = \left( \frac{1^{\circ} m/s + 0}{2} \right) (5s) = 2.5m$$

دربازه ۵s تا ۱۰s

به این ترتیب در لحظه  $t=10s$ ، مکان متحرک در  $x=4^{\circ}m$  قرار دارد.

$$\Delta x = \left( \frac{0 - 1^{\circ} m/s}{2} \right) (5s) = -2.5m$$

دربازه ۱۰s تا ۱۵s

به این ترتیب در لحظه  $t=15s$ ، مکان متحرک در  $x=1.5m$  قرار دارد.

$$\Delta x = \left( \frac{-1^{\circ} m/s + 0}{2} \right) (5s) = -2.5m$$

دربازه ۱۵s تا ۲۰s

به این ترتیب در لحظه  $t=20s$ ، مکان متحرک در  $x=-1^{\circ}m$  قرار دارد.

$$\Delta x = \left( \frac{0 + 1^{\circ} m/s}{2} \right) (5s) = 2.5m$$

دربازه ۲۰s تا ۲۵s

به این ترتیب در لحظه  $t=25s$ ، مکان متحرک در  $x=1.5m$  قرار دارد.

چون در تمامی بازه‌های ذکر شده، حرکت با شتاب است، لذا نمودار مکان - زمان آن مطابق شکل صفحه بعد است.

**بررسی ها و مسئله های فصل ۱**


**۱-۱- شناخت حرکت**  
 الف) با توجه به داده‌های نقشه شکل زیر، مقیاس نمودار سرعت متوسط خودروه را پیدا کنید.  
 ب) مفهوم فیزیکی این دو کسب چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟  
 ج) در چه صورت تندی متوسط و اعراضه سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشند؟

**۱-۲- شتاب در حرکت**  
 الف) شتاب در هر یک از مرحله‌های AB، BC و CD چقدر است؟  
 ب) شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟  
 ج) جابه‌جایی متحرک را در این بازه زمانی پیدا کنید.  
 د) نمودار سرعت - زمان متحرک مطابق شکل زیر است.  
 الف) نمودار شتاب - زمان این متحرک را رسم کنید.  
 ب) اگر  $x = -1^{\circ}m$  باشد نمودار مکان - زمان متحرک را رسم کنید.

**۱-۳- شتاب در حرکت**  
 الف) متحرک مطابق شکل در لحظه  $t_1$  در نقطه A، در لحظه  $t_2$  در نقطه B و در لحظه  $t_3$  در نقطه C قرار دارد.  
 الف) بردارهای مکان متحرک را در هر یک از این لحظه‌ها روی محور رسم کنید و بررسی بردار یک کنید.  
 ب) بردار جابه‌جایی متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی  $t_1$  تا  $t_2$ ،  $t_2$  تا  $t_3$  و  $t_1$  تا  $t_3$  به دست آورید.  
 ج) در شکل زیر نمودار سرعت - زمان سه متحرک نشان داده شده است.  
 الف) شتاب سه متحرک را به طور کیفی با یکدیگر مقایسه کنید.  
 ب) شتاب هر متحرک را به دست آورید.

برش‌ها و مسئله‌های فصل ۱


۱-۱. **مشاهدات حرکت**  
 الف) با توجه به داده‌های نقشه شکل زیر، (الف) تندی متوسط و اعزاز سرعت متوسط خودرو را پیدا کنید. (ب) مفهوم فیزیکی این دو کسب چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ (ب) در چه صورت تندی متوسط و اعزاز سرعت متوسط می‌توانست تقریباً با یکدیگر برابر باشند؟




۱-۲. **مشاهدات حرکت**  
 الف) در یک از مرحله‌های AB، BC، CD چقدر است؟ (ب) شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۸ ثانیه چقدر است؟ (ب) جاهای متحرک را در این بازه زمانی پیدا کنید. (ب) نمودار سرعت-زمان متحرک مطابق شکل زیر است. (الف) نمودار شتاب-زمان این متحرک را رسم کنید. (ب) اگر  $x = -10$  باشد نمودار مکان-زمان متحرک را رسم کنید.




۱-۳. **مشاهدات حرکت**  
 الف) برای راه‌های مکان متحرک را در هر یک از این لحظه‌ها روی محور رسم کنید و محاسبه برآورد کنید. (ب) برای جاهای متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی  $t_1$  تا  $t_2$ ،  $t_3$  تا  $t_4$  و  $t_5$  تا  $t_6$  با دست آورید. (ب) در شکل زیر نمودار سرعت-زمان سه متحرک نشان داده شده است. (الف) شتاب سه متحرک را به طور کیفی با یکدیگر مقایسه کنید. (ب) شتاب هر متحرک را به دست آورید.



۱-۴. **مشاهدات حرکت**  
 الف) در کدام بازه زمانی دوره سریع‌تر بوده است؟ (ب) در کدام بازه زمانی، دوره آهسته‌تر است؟ (ب) سرعت دوره را در بازه زمانی  $0 \leq t \leq 5$  حساب کنید. (ب) شتاب متوسط دوره را در بازه زمانی  $0 \leq t \leq 5$  حساب کنید. (ب) توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان-زمان شکل زیر می‌تواند نشان‌دهنده نمودار  $x-t$  یک متحرک باشد.





۱-۵. **مشاهدات حرکت**  
 الف) در چه لحظه‌هایی دو خودرو از یکدیگر می‌گذرند؟ (ب) در چه لحظه‌ای تندی دو خودرو تقریباً یکسان است؟ (ب) سرعت متوسط دو خودرو را در بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  مقایسه کنید. (ب) هر یک از شکل‌های زیر مکان یک خودرو را در لحظه‌های  $t=0$ ،  $t=T$ ،  $t=2T$ ، ...،  $t=7T$  نشان می‌دهد. هر دو خودرو در لحظه  $t=3T$  شتاب می‌گیرند. توضیح دهید.



۱-۶. **مشاهدات حرکت**  
 الف) توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان-زمان نشان داده شده، حرکت متحرکی را توصیف می‌کند که سرعت اولیه آن در جهت محور  $x$  و شتاب آن برخلاف جهت محور  $x$  است. (ب) توضیح دهید که در کدام نمودار شتاب بیشتر است. (ب) سرعت نهایی کدام خودرو بیشتر است. (ب) کدام خودرو شتاب بیشتری دارد.



۱-۷. **مشاهدات حرکت**  
 الف) متحرک مطابق شکل در لحظه  $t_1$  در نقطه A، در لحظه  $t_2$  در نقطه B و در لحظه  $t_3$  در نقطه C قرار دارد.



- ۶ الف) در بازه‌ای که شیب نمودار سرعت - زمان بیشتر است؛ یعنی بازه صفر تا  $2.5$  s.
- ب) در بازه‌ای که شیب نمودار سرعت - زمان صفر است؛ یعنی بازه  $2.5$  s تا  $5.0$  s.
- پ) مشابه مثال ۱-۵
- ت) مشابه مثال ۱-۵

۷ دانش‌آموزان باید توجه کنند که متحرک در هر لحظه از زمان صرفاً در یک مکان می‌تواند باشد. لذا نمودارهای مکان - زمان شکل‌های الف، ب و ث نمی‌توانند نشان‌دهنده نمودار  $x-t$  یک متحرک باشند. نکته دیگری که دانش‌آموزان باید دقت کنند این است که در هیچ لحظه، مماس بر منحنی  $x-t$  نباید موازی محور  $x$  شود، زیرا در این حالت سرعت متحرک بی‌نهایت می‌شود که از نظر فیزیکی بی‌معنا و قابل قبول نیست.

۸ در نمودار شکل (ب) شیب مماس بر منحنی  $x-t$ ، با گذشت زمان کاهش می‌یابد و در نمودار شکل (الف) با گذشت زمان شیب منحنی  $x-t$  ثابت مانده است. لذا نمودار  $x-t$  شکل‌های (پ) و (ت) حرکت متحرکی را توصیف می‌کند که به تدریج بر تندی آن افزوده شده است.

۹ برای آنکه سرعت اولیه متحرک در جهت محور  $x$  باشد، دانش‌آموزان باید به زاویه‌ای که خط مماس بر منحنی مکان - زمان در لحظه  $t=0$  با محور زمان می‌سازد توجه کنند. اگر این زاویه مثبت باشد (مانند شکل الف) در این صورت، سرعت اولیه متحرک در جهت محور  $x$  است.

همچنین برای آنکه شتاب متحرک در خلاف جهت محور  $x$  باشد، با توجه به توضیحی که در خصوص شکل ۱-۱۴ داده شد، باید گودی یا تقعر منحنی روبه پایین باشد (مانند شکل الف). البته دانش‌آموزان می‌توانند به چگونگی تغییرات سرعت متحرک در بازه زمانی مورد نظر نیز توجه کنند.

۱۰ الف) در لحظه‌های  $t_1$  و  $t_2$

ب) شیب خط مماس بر منحنی خودروی شتابدار در لحظه  $t_2$ ، تقریباً موازی نمودار خودرویی است که با سرعت ثابت در حرکت است.

پ) چون بازه زمانی  $t_1$  تا  $t_2$  برای دو خودرو  $\Delta x = x_2 - x_1$  یکسان است، لذا سرعت متوسط آنها نیز برابر است.

۱۱ ابتدا باید دانش آموزان توجه کنند که نمودارهای نشان داده شده، حرکت دو خودروی  $A$  و  $B$  را در جهت محور  $x$  نشان می‌دهد.

اگر مبدأ حرکت را در  $t = 0$  محلی در نظر بگیریم که خودرو  $A$  شروع به حرکت کرده است، در این صورت همان‌طور که دیده می‌شود خودروی  $B$ ، در فاصله دورتری از مبدأ شروع به حرکت کرده است.

الف) حرکت هر دو خودرو در بازه زمانی  $t = 0$  تا  $t = 3T$  با سرعت ثابت است. از آنجا که خودروی  $A$  در این بازه زمانی مسافت بیشتری را طی کرده است، در نتیجه سرعت اولیه خودروی  $A$  بیشتر از خودروی  $B$  است.

ب) در بازه زمانی  $t = 3T$  تا  $t = 7T$ ، خودروی  $B$  مسافت بیشتری را طی کرده است.

۳۱ الف) در کدام بازه زمانی دوطرفه سرعت بر دوطرفه است؟  
 ب) در کدام بازه زمانی، دوطرفه استاندارد است؟  
 ج) با سرعت دوطرفه را در بازه زمانی  $0 \leq t \leq 15$  حساب کنید.  
 د) با سرعت دوطرفه را در بازه زمانی  $0 \leq t \leq 50$  حساب کنید.  
 ه) با سرعت متوسط دوطرفه را در بازه زمانی  $0 \leq t \leq 100$  حساب کنید.  
 ۳۲ توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان-زمان شکل زیر می‌تواند نشان‌دهنده نمودار  $x = at + b$  یک متحرک باشد.

۳۳ الف) شکل زیر نمودار مکان-زمان دو خودرو را نشان می‌دهد که در جهت محور  $x$  در حرکت‌اند.

۳۴ الف) توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان-زمان شکل زیر کدام موارد حرکت متحرکی را توصیف می‌کند که در حال سکون شروع به حرکت کرده و متحرک بر تنه‌ی آن افزوده شده است.

۳۵ الف) توضیح دهید کدام یک از نمودارهای مکان-زمان نشان داده شده، حرکت متحرکی را توصیف می‌کند که در جهت محور  $x$  و شتاب آن بر خلاف جهت محور  $x$  است.

$$\Delta x_A = (v_{av})_A (\Delta T) = \left( \frac{v_{rA} + v_{vA}}{2} \right) (\Delta T)$$

$$\Delta x_B = (v_{av})_B (\Delta T) = \left( \frac{v_{rB} + v_{vB}}{2} \right) (\Delta T)$$

$$v_{rA} + v_{vA} < v_{rB} + v_{vB}$$

از طرفی چون  $v_{rA} > v_{rB}$  است (به قسمت الف توجه شود)، در این صورت باید  $v_{vB} > v_{vA}$  باشد. پ) چون تغییرات سرعت خودروی  $B$  بیشتر بوده است، لذا دارای شتاب بیشتری نیز هست.

۳۶ الف) معادله حرکت جسمی در SI صورت  $x = 4t^2 - 2t + 1$  است. الف) مکان متحرک را در  $t = 0$  و  $t = 2$  بدست آورید. ب) با سرعت متوسط جسم را در بازه زمانی صفر تا  $t_1$  پایه پیدا کنید. ۳۷ نمودار سرعت-زمان شکل زیر نشان داده شده است. همین‌گونه در کدام بازه‌های زمانی و در کدام جهت محور  $x$  و در کدام بازه‌های زمانی در خلاف جهت محور  $x$  است.

۳۸ الف) مکان متحرک را در  $t = 0$  و  $t = 2$  بدست آورید. ب) با سرعت متوسط جسم را در بازه زمانی صفر تا  $t_1$  پایه پیدا کنید. ۳۹ نمودار سرعت-زمان شکل زیر نشان داده شده است. همین‌گونه در کدام بازه‌های زمانی و در کدام جهت محور  $x$  و در کدام بازه‌های زمانی در خلاف جهت محور  $x$  است.

۴۰ الف) جاه‌جایی و مسافت پیموده شده توسط متحرک در کل زمان حرکت چقدر است؟ ب) با سرعت متوسط متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی  $0 \leq t \leq 1$ ،  $1 \leq t \leq 2$ ،  $2 \leq t \leq 3$ ،  $3 \leq t \leq 4$ ،  $4 \leq t \leq 5$  و  $5 \leq t \leq 6$  حساب کنید. ج) با سرعت متوسط متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی  $0 \leq t \leq 1$ ،  $1 \leq t \leq 2$ ،  $2 \leq t \leq 3$ ،  $3 \leq t \leq 4$ ،  $4 \leq t \leq 5$  و  $5 \leq t \leq 6$  حساب کنید. د) نمودار سرعت-زمان متحرک را رسم کنید.

۴۱ الف) با سرعت ثابت  $v_1$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ب) با سرعت ثابت  $v_2$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ج) با سرعت ثابت  $v_3$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. د) با سرعت ثابت  $v_4$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ه) با سرعت ثابت  $v_5$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ۴۲ الف) با سرعت ثابت  $v_1$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ب) با سرعت ثابت  $v_2$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ج) با سرعت ثابت  $v_3$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. د) با سرعت ثابت  $v_4$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند. ه) با سرعت ثابت  $v_5$  در جهت محور  $x$  حرکت می‌کند.

۱۲ الف) با جای‌گذاری لحظه‌های داده شده در معادله مکان-زمان، به سادگی مکان متحرک  $x_1 = 4m$  و  $x_2 = 0$  به دست می‌آید. ب) از رابطه  $a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$  استفاده شود.

همان‌طور که در کتاب درسی نیز تأکید شده است لازم است توجه شود که مشتق‌گیری از رابطه مکان-زمان به دست آمده و پیدا کردن سرعت در یک لحظه خاص، جزو برنامه درسی این کتاب و همچنین ارزشیابی آن نیست. این موضوع در خصوص دوبار مشتق‌گیری از معادله مکان-زمان یا یک بار مشتق‌گیری از معادله سرعت-زمان و پیدا کردن شتاب در هر لحظه دلخواه نیز صادق است.

۱۳ مشابه پرسش ۱-۶ است. کافی است دانش‌آموزان به شیب مماس بر منحنی سرعت-زمان در هر بازه دلخواه توجه کنند. برای مثال در بازه  $t_1$  تا  $t_2$ ، شیب منفی و در نتیجه شتاب در خلاف جهت محور  $x$  است.

## ۲-۱ حرکت با سرعت ثابت

**۱۴** معادله حرکت جسمی که با سرعت ثابت در امتداد محور  $x$  حرکت می کند در رابطه ۲-۱ داده شده است.

$$x = vt + x_0$$

در هر یک از لحظه های  $t_1$  و  $t_2$  داریم:

$$x_1 = vt_1 + x_0 \Rightarrow 6/0 \text{ m} = v(5/0 \text{ s}) + x_0$$


$$x_2 = vt_2 + x_0 \Rightarrow 36/0 \text{ m} = v(2/0 \text{ s}) + x_0$$

با حل دو معادله بالا داریم:

$$x_0 = -4/0 \text{ m}, \quad v = 2/0 \text{ m/s}$$



$$\Rightarrow x = 2t - 4$$

به این ترتیب معادله حرکت متحرک در SI به صورت زیر است:



شکل ۱-۱: حرکت با سرعت ثابت

**۱۱.** معادله حرکت جسمی در SI به صورت  $x = 4t^2 + 2t + 1$  است. (الف) مکان متحرک را در  $t = 0$  و  $t = 2$  s بدست آورید. (ب) سرعت متوسط جسم را در بازه زمانی صفر تا ۲ ثانیه پیدا کنید. **۱۲.** نمودار سرعت-زمان متحرکی در شکل زیر نشان داده شده است. همین کتب در کدام بازه های زمانی بردار شتاب در جهت محور  $x$  و در کدام بازه های زمانی در خلاف جهت محور  $x$  است.




شکل ۲-۱: حرکت با سرعت ثابت

**۱۳.** جسمی با سرعت ثابت بر مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظه  $t_1 = 5$  s در مکان  $x_1 = 20$  m و در لحظه  $t_2 = 10$  s در مکان  $x_2 = 30$  m باشد.

(الف) معادله مکان-زمان جسم را بنویسید.

(ب) نمودار مکان-زمان جسم را رسم کنید.

**۱۴.** شکل زیر نمودار مکان-زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور  $x$  حرکت می کند.



**۱۷.** داشتن محل قرارگیری یک ماهواره در ماهواره های فضایی و اطمینان از اینکه ماهواره در مدار پیش بینی شده قرار گرفته، یکی از مأموریت های کارشناسان فضایی است. چنین منظور ژئوهای الکترومغناطیسی را که با سرعت نور در فضا حرکت می کنند، به طرف ماهواره مورد نظر می فرستند و بازتاب آن توسط ایستگاه زمینی دریافت می شود. اگر زمان رفت و برگشت یک پب ۰.۲۴ ثانیه باشد، فاصله ماهواره از ایستگاه زمینی تقریباً چقدر است؟

شکل ۳-۱: حرکت با شتاب ثابت

**۱۸.** نمودار  $a-t$  متحرکی که در امتداد محور  $x$  حرکت می کند مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی  $0 \leq t \leq 5$  s تا  $4/0$  است؟



**۱۹.** معادله حرکت متحرک را در هر یک از بازه های زمانی  $0 \leq t \leq 1$  s تا  $1/0$  s،  $1/0 \leq t \leq 3/0$  s تا  $4/0$  s،  $3/0 \leq t \leq 4/0$  s تا  $4/0$  s،  $4/0 \leq t \leq 5/0$  s تا  $4/0$  s،  $4/0 \leq t \leq 5/0$  s تا  $4/0$  s بنویسید. (ب) نمودار سرعت-زمان متحرک را رسم کنید.

$$\Delta x_1 = 1/0 \text{ m} - 5/0 \text{ m} = 5/0 \text{ m}$$

$$\Delta x_2 = 1/0 \text{ m} - 1/0 \text{ m} = 0$$

$$\Delta x_3 = 0 - 1/0 \text{ m} = -1/0 \text{ m}$$

$$\Delta x = 5/0 \text{ m} + 0 + (-1/0 \text{ m}) = 5/0 \text{ m}$$

به جای این کار می توانستیم به طور ساده، مکان متحرک را در لحظه  $t = 1/0$  s از مکان متحرک در شروع حرکت ( $t = 0$ ) کم کنیم در این صورت

$$\Delta x = 0 - 5/0 \text{ m} = -5/0 \text{ m}$$

مسافت پیموده شده برای مجموع اندازه جابه جایی های متحرک در هر بازه زمانی است. به این ترتیب داریم:

$$l = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| = |5/0 \text{ m}| + |0| + |-1/0 \text{ m}| = 15/0 \text{ m}$$

(ب) از رابطه ۲-۱ استفاده شود. برای مثال در بازه  $1/0$  s تا  $8/0$  s داریم:

$$v_{av} = \frac{-1/0 \text{ m}}{1/0 \text{ s} - 8/0 \text{ s}} = -5 \text{ m/s}$$

**۱۵** (الف) در بازه صفر تا  $4/0$  s

در بازه  $4/0$  s تا  $8/0$  s

در بازه  $8/0$  s تا  $1/0$  s

به این ترتیب جابه جایی کل برابر است با


پ) مشابه قسمت الف تمرین ۱۴ است. برای مثال در بازه صفر تا  $4/s$  داریم :

$$1/s \cdot m = v(4/s) + 5/s \cdot m \Rightarrow v = 1/2 m/s$$

از آنجا که هنگام آموزش و ارزشیابی، توجه به تعداد ارقام با معنا جزو اهداف کتاب نیست، لذا می توانیم  $v = 1/25 m/s$  بگیریم. همچنین به طور مشابه در بازه  $8/s$  تا  $10/s$  ، داریم :  $v = -5/s$ . به این ترتیب معادله حرکت جسم در بازه های زمانی داده شده عبارت است از (در SI) :

$$\begin{cases} x = 1/25t + 5 \\ x = 1 \\ x = -5t + 1 \end{cases}$$

ت)



۱۶ الف) مشابه قسمت پ مسئله ۱۵ است. معادله حرکت این دو متحرک در SI به صورت زیر است

$$x_A = 3 \cdot t - 300$$

$$x_B = 15t + 300$$



ب) با توجه به شرط  $x_A = x_B$ ، زمان هم رسی در متحرک را به سادگی می توان به دست آورد ( $t = 4/s$ ). با قراردادن زمان هم رسی در یکی از معادله های حرکت، مکان هم رسی به دست می آید ( $x = 900 m$ ).

۱۷ اگر تندی نور را  $3 \times 10^8 m/s$  در نظر بگیریم، در این صورت با توجه به اینکه زمان رفت  $1/2 s$  است، داریم :

$$\Delta x = v \Delta t = (3 \times 10^8 m/s)(1/2 s) = 3/6 \times 10^7 m$$

فصل ۱ حرکت و مکان


۱۱. معادله حرکت جسی در SI به صورت  $x = 4 - 2t + t^2$  است. الف) مکان متحرک را در  $t = 8$  و  $t = 4$  به دست آورید. ب) سرعت متوسط جسو را در بازه زمانی صفر تا  $2$  ثانیه پیدا کنید. ۱۲. نمودار سرعت - زمان متحرکی در شکل زیر نشان داده شده است. همین کنید در کدام بازه های زمانی بردار شتاب در جهت محور  $x$  و در کدام بازه های زمانی در خلاف جهت محور  $x$  است.



۱۳. جسی با سرعت ثابت و مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظه  $t = 0$  در مکان  $x = 20$  و در لحظه  $t = 3$  در مکان  $x = 36$  باشد.


۱۴. معادله مکان - زمان جسم را رسم کنید.

۱۵. شکل زیر نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور  $x$  حرکت می کند.



۱۶. جاهایی و مسافت طی شده توسط متحرک در کل زمان حرکت جقدر است؟

۱۷. نمودار  $x-t$  متحرکی که در امتداد محور  $x$  حرکت می کند مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی  $0/s$  تا  $5/s$  چند برابر سرعت متوسط آن در بازه زمانی  $5/s$  تا  $10/s$  است؟





### ۱-۳- حرکت با شتاب ثابت

قبل از بررسی مسئله‌های این بخش، خوب است راهبردهای حل مسئله در حرکت با شتاب ثابت را با دانش‌آموزان در میان بگذارید.

#### راهبردهای حل مسئله در حرکت با شتاب ثابت

- ۱) نخست تصمیم بگیرید که مبدأ مختصات کجاست و جهت مثبت محور کدام است. ساده‌ترین گزینه اغلب آن است که ذره را در زمان  $t=0$  در مبدأ بگذارید. آنگاه  $x_0=0$  است. رسم نمودار حرکت که مختصات و بعضی از مکان‌های بعدی متحرک را نشان می‌دهد سودمند است.
- ۲) به خاطر آورید که گزینش جهت مثبت محور خود به خود جهت‌های مثبت سرعت و شتاب را نیز تعیین می‌کند. اگر  $x$  در طرف راست مبدأ مثبت باشد، در این صورت اگر  $v$  و  $x$  به سوی راست باشند، مثبت اند.
- ۳) فهرستی از کمیت‌هایی نظیر  $x_0, v_0, x, v, a, t$  بنویسید. به‌طور کلی بعضی از این کمیت‌ها معلوم و بعضی‌ها نامعلوم اند. کمیت‌های معلوم را بنویسید و کمیت‌های نامعلوم را مشخص کنید.
- ۴) یکی از معادله‌های ۱-۸ تا ۱-۱۱ را که فقط شامل یکی از کمیت‌های نامعلوم است را انتخاب کنید. این معادله را برای پیدا کردن کمیت نامعلوم حل کنید. گاهی مجبورید که دو معادله هم‌زمان را برای دو کمیت نامعلوم حل کنید.
- ۵) در پایان نتیجه کمیت‌های نامعلوم را که به‌دست آوردید و ارسای کنید که آیا منطقی‌اند یا خیر. آیا آنها در گستره کلی مقادارهایی که شما انتظار دارید قرار دارند؟

۱۸ در هر یک از بازه‌های زمانی صفر تا  $10/s$  و همچنین  $10/s$  تا  $40/s$  حرکت دارای شتاب ثابت است. لذا با استفاده از معادله ۱-۹ داریم.

در بازه صفر تا  $10/s$

$$v_{av} = \frac{0 + 50 \text{ m/s}}{2} = 25 \text{ m/s}$$


در بازه  $10/s$  تا  $40/s$

$$v_{av} = \frac{50 \text{ m/s} + 0}{2} = 25 \text{ m/s}$$



به این ترتیب نسبت سرعت متوسط متحرک در بازه‌های داده شده برابر ۱ است.

شکل ۱-۱ حرکت با شتاب ثابت


۱۸. معادله حرکت جسمی در  $t=0$  بصورت  $x = 2t^2 + 4t - 3$  است. الف) مکان متحرک را در  $t = 10$  و  $t = 20$  s بدست آورید. ب) سرعت متوسط جسم را در بازه زمانی صفر تا ۲ ثانیه پیدا کنید. ج) نمودار سرعت-زمان متحرک در شکل زیر نشان داده شده است. تعیین کنید در کدام بازه‌های زمانی بردار شتاب در جهت محور  $x$  و در کدام بازه‌های زمانی در خلاف جهت محور  $x$  است.



۱۹. داشتن محل قرارگیری یک ماهواره در موقعیت‌های فضایی و اطمینان از اینکه ماهواره در مدار پیش‌بینی شده قرار گرفته، یکی از مأموریت‌های کارشناسان فضایی است. بین منظور تپه‌های الکتریکی نشان داده شده در شکل زیر در فضا حرکت می‌کند، به طرف ماهواره نمودار می‌کشند و بازتاب آن توسط ایستگاه زمینی دریافت می‌شود. اگر زمان رفت و برگشت یک تپه ۰.۲۴ ثانیه باشد، فاصله ماهواره از ایستگاه زمینی تقریباً چقدر است؟



۲۰-۱ حرکت با سرعت ثابت  
۱۸. جسمی با سرعت ثابت و مسیری مستقیم در حرکت است. اگر جسم در لحظه  $t_1 = 20$  s در مکان  $x_1 = 20$  m و در لحظه  $t_2 = 40$  s در مکان  $x_2 = 40$  m باشد، الف) معادله مکان-زمان جسم را بنویسید. ب) نمودار مکان-زمان جسم را رسم کنید. ج) شکل زیر نمودار مکان-زمان متحرک را نشان می‌دهد که در امتداد محور  $x$  حرکت می‌کند.



۲۰-۲ حرکت با شتاب ثابت  
۱۸. نمودار  $x-t$  متحرکی که در امتداد محور  $x$  حرکت می‌کند مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = 2$  s چند برابر سرعت متوسط آن در بازه زمانی  $t_1 = 2$  s تا  $t_2 = 4$  s است؟  
الف) چاه جایی و مسافت پیموده شده توسط متحرک در کل زمان حرکت چقدر است؟  
ب) سرعت متوسط متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = 2$  s و  $t_1 = 2$  تا  $t_2 = 4$  s و همچنین در کل زمان حرکت بدست آورید.  
ج) معادله حرکت متحرک را در هر یک از بازه‌های زمانی  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = 2$  s و  $t_1 = 2$  تا  $t_2 = 4$  s و همچنین  $t_1 = 0$  تا  $t_2 = 4$  s بنویسید.  
د) نمودار سرعت-زمان متحرک را رسم کنید.

۱۹ الف) از رابطه ۴-۱ داریم :

$$v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(6/0-0)m}{3/s} = 2/0 m/s$$

ب) با توجه به اینکه در  $t=1/0s$  شیب خط مماس بر منحنی صفر است، لذا سرعت متحرک در این لحظه برابر صفر است. در نتیجه داریم :

$$v = at + v_0 \Rightarrow 0 = a(1/0s) + v_0 \Rightarrow v_0 = -a$$

از طرفی در همین لحظه داریم  $x = -2/0m$  و  $t = 1/0s$ . با جای گذاری در معادله مکان زمان داریم (در SI) :

$$x = \frac{1}{2} at^2 + v_0 t + x_0$$

$$-2/0m = \frac{1}{2} a(1/0s)^2 - a(1/0s) + 0 \Rightarrow a = 4/0m/s^2$$

$$x = 2t^2 - 4t$$

پ) از رابطه ۴-۴  $v = 4t - 4$  ، داریم (در SI) :

$$v = 4 \times 3 - 4 = 8m/s$$

ت)


۳۷. الف) نشان می‌دهد که روی سری مستقیم حرکت می‌کند. در امتداد محور x با شتاب ثابت در حرکت است.

الف) شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی صفر تا ۳/۰ ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟  
 ب) معادله مکان - زمان متحرک را بنویسید.  
 ج) سرعت متحرک را در لحظه  $t = 3/0s$  پیدا کنید.  
 د) نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم کنید.

۳۸. الف) شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی صفر تا ۳/۰ ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟  
 ب) معادله مکان - زمان متحرک را بنویسید.  
 ج) سرعت متحرک را در لحظه  $t = 3/0s$  پیدا کنید.  
 د) نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم کنید.

۳۹. الف) شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی صفر تا ۳/۰ ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟  
 ب) معادله مکان - زمان متحرک را بنویسید.  
 ج) سرعت متحرک را در لحظه  $t = 3/0s$  پیدا کنید.  
 د) نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم کنید.

۴۰. الف) شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی صفر تا ۳/۰ ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟  
 ب) معادله مکان - زمان متحرک را بنویسید.  
 ج) سرعت متحرک را در لحظه  $t = 3/0s$  پیدا کنید.  
 د) نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم کنید.



۲۰ الف) با توجه به داده‌های مسئله، مناسب‌ترین معادله برای حل این قسمت، استفاده از رابطه ۱-۱۱ است  $(a = 0/5m/s^2)$ .

ب) با استفاده از رابطه ۱-۸، مدت ۲s پس از شروع حرکت، سرعت متحرک به  $18km/h$  می‌رسد.

۲۱ الف) حرکت خودرو با شتاب ثابت و حرکت کامیون با سرعت ثابت است. با نوشتن معادله‌های حرکت خودرو و کامیون داریم (در SI) :

$$x_1 = \frac{1}{2} at^2 + v_1 t + x_0 = t^2$$

$$x_2 = vt + x_0 = 1 t$$

(مبدأ حرکت را، محل چراغ قرمز در نظر گرفته ایم  $(x_0 = 0)$ .)

$$x_1 = x_2 \Rightarrow t = 1/0s$$

زمان هم‌رسی

مکان هم‌رسی  $x_p = 10 \times 10 = 100 \text{ m}$


۲۱. نشان می‌دهد که روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند. در امتداد محور x با شتاب ثابت در حرکت است.

۲۲. شکل زیر نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که در امتداد محور x با شتاب ثابت در حرکت است.


۲۳. نشان می‌دهد که روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند. در امتداد محور x با شتاب ثابت در حرکت است.

۲۴. نشان می‌دهد که روی مسیری مستقیم حرکت می‌کند. در امتداد محور x با شتاب ثابت در حرکت است.

(ب)



(پ)



۲۲ شتاب متحرک در لحظه‌های  $t=3\text{s}$ ،  $t=11\text{s}$ ،  $t=15\text{s}$  به دلیل ثابت بودن سرعت متحرک، صفر است. شتاب متحرک در لحظه  $t=8\text{s}$  با شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی  $5\text{s}$  تا  $10\text{s}$  برابر است. به این ترتیب داریم:

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(15-5)\text{m/s}}{5\text{s}} = 2\text{m/s}^2$$

(ب)

$$a_{av} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(15-5)\text{m/s}}{10\text{s}} = 1\text{m/s}^2$$

(پ) با توجه به آنچه در مثال ۱-۱۲ اشاره شد، سطح بین نمودار سرعت - زمان و محور زمان در هر بازه زمانی برابر جابه‌جایی در آن بازه است. لذا

در بازه  $5\text{s}$  تا  $11\text{s}$   $\Delta x = 65\text{m}$

در بازه  $10\text{s}$  تا  $11\text{s}$   $\Delta x = 135\text{m}$

(ت) با توجه به نتایج قسمت پ و رابطه ۱-۴، سرعت متوسط به دست می‌آید.

### ۱-۴ حرکت سقوط آزاد

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{1}{2}(9.8\text{m/s}^2)(4\text{s})^2 = -78.4\text{m}$$

۲۳ مبدأ حرکت، محل رها شدن جسم و جهت رو به بالا مثبت انتخاب شده است.

در نیمه راه :

$$v^2 = -2gy = -2(9/8 \text{ m/s}^2)(-34/2 \text{ m})$$

دانش آموزان باید توجه کنند چون

$$\Rightarrow v = -25/9 \text{ m/s}$$

جهت رو به بالا مثبت انتخاب شده است، لذا وقتی جسم رو به پایین می آید، جهت سرعت آن خلاف محور  $y$  است و علامت منفی در سرعت نشان دهنده همین موضوع است.

لحظه برخورد به زمین :

$$v^2 = -2gy = -2(9/8 \text{ m/s}^2)(-78/4 \text{ m}) \Rightarrow v = -39/2 \text{ m/s}$$

۲۴ مختصات دو گلوله را در معادله مکان - زمان قرار می دهیم :

$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + y_0$$

گلوله اول :

$$h = -\frac{1}{2}gt^2$$

گلوله دوم :

۳۱. شکل زیر نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور  $y$  با شتاب ثابت در حرکت است.

۳۲. نشان می دهد که روی مسیری مستقیم حرکت می کند.

۳۳. شتاب متوسط خورده را در هر یک از لحظه های  $t=0s$  ،  $t=1s$  و  $t=2s$  بدست آورید.

۳۴. شتاب متوسط در بازه زمانی  $t=0s$  تا  $t=2s$  را بدست آورید.

۳۵. در هر یک از بازه های زمانی  $t=0s$  تا  $t=1s$  و  $t=1s$  تا  $t=2s$  خورده چقدر جابه جا شده است.

۳۶. شتاب متوسط خورده در بازه های  $t=0s$  تا  $t=1s$  و  $t=1s$  تا  $t=2s$  را بدست آورید.

۳۷. شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی صفر تا  $3s$  باشد.

۳۸. چقدر متر می تانه است؟

۳۹. با معادله مکان - زمان متحرک را بنویسید.

۴۰. با سرعت متحرک را در لحظه  $t=3s$  پیدا کنید.

۴۱. با نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم کنید.

۴۲. متحرکی در امتداد محور  $y$  و با شتاب ثابت در حرکت است. در مکان  $+1 \text{ m}$  با سرعت متحرک  $+2 \text{ m/s}$  و در مکان  $+19 \text{ m}$  با سرعت متحرک  $+1 \text{ km/h}$  است.

۴۳. شتاب حرکت آن چقدر است؟

۴۴. با پس از چه مدتی سرعت متحرک از  $+2 \text{ m/s}$  به سرعت  $+1 \text{ km/h}$  می رسد؟


۴۵. خورده ی پشت چراغ قرمز ایستاده است. با سبز شدن چراغ، خورده با شتاب  $1 \text{ m/s}^2$  شروع به حرکت می کند. در همین لحظه، کامیونی با سرعت ثابت  $36 \text{ km/h}$  از آن سبقت می گیرد.

۴۶. الف) در چه لحظه و در چه مکانی خورده به کامیون می رسد؟

ب) نمودار مکان - زمان را برای خورده و کامیون در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

ج) نمودار سرعت - زمان را برای خورده و کامیون در یک دستگاه مختصات رسم کنید.

۴۷. شکل نشان داده نمودار سرعت - زمان خورده ی را



$$v^2 = -2g(y - y_0)$$

از رابطه ۱-۴ داریم :

$$\begin{cases} v_A^2 = -2g(-h - 0) = 2gh \\ v_B^2 = -2g[-h - (-\frac{3}{4}h)] = \frac{2gh}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \frac{\sqrt{2gh}}{\sqrt{2gh/4}} = 2$$

(ب) معادله مکان - زمان هر دو گلوله به ترتیب برابر است با

$$y_A = -\frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow -h = -\frac{1}{2}gt^2$$

$$y_B = -\frac{1}{2}g(t-3s)^2 - \frac{3}{4}h \Rightarrow -h = -\frac{1}{2}g(t-3)^2 - \frac{3}{4}h$$

$$\Rightarrow -\frac{h}{4} = -\frac{1}{2}g(t-3)^2 \Rightarrow -h = -2g(t-3)^2$$

شکل زیر نمودار مکان - زمان متحرکی را نشان می‌دهد که در امتداد محور  $x$  با شتاب ثابت در حرکت است.

الف) شتاب خودرو را در هر یک از لحظه‌های  $t=3s$ ،  $t=4s$  و  $t=5s$  به دست آورید.  
 ب) شتاب متوسط در بازه زمانی  $t=0s$  تا  $t=3s$  را به دست آورید.  
 ج) در هر یک از بازه‌های زمانی  $t=0s$  تا  $t=1s$  و  $t=1s$  تا  $t=2s$  تا  $t=2s$  تا  $t=3s$  خودرو چقدر جاها شده است؟  
 د) شتاب متوسط خودرو در بازه‌های  $t=0s$  تا  $t=1s$  و  $t=1s$  تا  $t=2s$  تا  $t=2s$  تا  $t=3s$  را به دست آورید.

۲۴. حرکت متوسط متحرک در بازه زمانی صفر تا  $3s$  تا چه متر بر ثانیه است؟  
 ب) معادله مکان - زمان متحرک را بنویسید.  
 ج) سرعت متحرک را در لحظه  $t=3s$  پیدا کنید.  
 د) نمودار سرعت - زمان متحرک را رسم کنید.

۲۵. متحرکی در امتداد محور  $x$  و با شتاب ثابت در حرکت است. در مکان  $x=+1m$  سرعت متحرک  $v=+1km/h$  است.  
 الف) شتاب حرکت آن چقدر است؟  
 ب) پس از چه مدتی سرعت متحرک از  $v=2m/s$  به سرعت  $v=1km/h$  می‌رسد؟  
 ج) چراغ خودروی پشت چراغ قرمز ایستاده است. با سبز شدن چراغ، خودرو با شتاب  $2m/s^2$  شروع به حرکت می‌کند. در همین لحظه، کامیونی با سرعت ثابت  $3km/h$  از آن سبقت می‌گیرد.  
 الف) در چه لحظه و در چه مکانی خودرو به کامیون می‌رسد؟  
 ب) نمودار مکان - زمان را برای خودرو و کامیون در یک دستگاه مختصات رسم کنید.  
 ج) نمودار سرعت - زمان را برای خودرو و کامیون در یک دستگاه مختصات رسم کنید.  
 د) شکل نشان داده شده نمودار سرعت - زمان خودروی را بنویسید.


به این ترتیب مدت زمانی که گلوله  $A$  در راه بوده است برابر است با

$$-\frac{1}{2}gt^2 = -2g(t-3)^2 \Rightarrow t = 6s$$

چون گلوله  $B$  با  $3$  ثانیه تأخیر رها شده است، به این ترتیب این گلوله پس از  $3$  ثانیه به زمین می‌رسد.

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9.8m/s^2)(6s)^2 = 176.4m$$

۲۵ الف) ارتفاع ساختمان را  $h$  و زمان کل حرکت سنگ را  $T$  فرض می‌کنیم. اگر مبدأ مختصات را محل رها شدن سنگ بگیریم ( $y_0=0$ ) در این صورت معادله حرکت ۱-۱۳ را برای هر یک از نقاط  $A$  و  $B$  به‌طور جداگانه می‌نویسیم. مختصات مکان و زمان نقطه  $A$  عبارت است از



$$y_A = -h + 6.0m, t = T - 2s$$

همچنین مختصات مکان و زمان سنگ در نقطه  $B$  عبارت است از به این ترتیب با جای‌گذاری در معادله ۱-۱۳ داریم:

$$y_B = -h, t = T$$

$$\begin{cases} -h + 6.0 = -\frac{1}{2}g(T-2)^2 & (1) \\ -h = -\frac{1}{2}gT^2 & (2) \end{cases}$$

با جای‌گذاری (۲) در (۱) داریم

$$-h + 6.0 = -h - 2g + 2g\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$6.0 + g = 2g\sqrt{\frac{2h}{g}}$$

$$(6.0 + g)^2 = 4gh$$

$$h = \frac{(6.0 + 9.8)^2}{4 \times 9.8} \approx 10.0m$$


$$v_B^2 = -2 \times 9.8 \times (-10.0 - 6.0) = 156.8$$

$$v_B \approx -39.6m/s$$


ب) از رابطه ۱-۱۴ داریم:

## راهنمای پاسخ‌یابی پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۲

**۱ الف)** وقتی سیب به شاخه آویزان است، نیرویی از طرف شاخه به طرف بالا به سیب وارد می‌شود و نیروی وزن که از طرف زمین به سیب وارد می‌شود به طرف پایین است. در این حالت این دو نیرو هم اندازه بوده و متوازن اند. وقتی سیب از درخت جدا می‌شود و در حال سقوط کردن است، نیروی وزن به طرف پایین و نیروی مقاومت هوا به طرف بالا بر سیب وارد می‌شود.



**ب)** در حالتی که سیب به درخت آویزان است: واکنش نیروی شاخه  $\vec{F}$  نیرویی است که از طرف سیب به شاخه وارد می‌شود و شاخه را به طرف پایین می‌کشد (شاخه  $\vec{W}$ ).




واکنش وزن سیب، نیروی گرانشی است که از طرف سیب به زمین وارد شده و آن را به طرف بالا می‌کشد ( $\vec{W}'$ ).  
در حالتی که سیب در حال سقوط کردن است:

**۱-۳** قوانین حرکت نیوتون و معرفی برخی از نیروهای خاص

**۱.** سیب را در نظر بگیرید که به شاخه درختی آویزان است و سپس از درخت جدا می‌شود.  
الف) با رسم شکل نیروهای وارد بر سیب را قبل و بعد از جدا شدن از درخت نشان دهید. (با هر حالت واکنش این نیروها بر چه اجسامی وارد می‌شود؟)  
ب) دانش‌آموزی به جرم  $50\text{ kg}$  روی یک ترازوی فنری در آسانسور ایستاده است. در هر یک از حالت‌های زیر این ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟ (با  $g=9.8\text{ N/kg}$ )  
الف) آسانسور ساکن است.  
ب) آسانسور با سرعت ثابت حرکت می‌کند.  
پ) آسانسور با شتاب  $1\text{ m/s}^2$  به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند.  
ت) آسانسور با شتاب  $1\text{ m/s}^2$  به طرف پایین شروع به حرکت می‌کند.  
۲. در شکل نشان داده شده، نخس با نیروی  $20\text{ N}$  جسم  $4\text{ kg}$  کیلوگرمی را هل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. ولی وقتی با نیروی  $30\text{ N}$  جسم را هل می‌دهد، جسم در آستانه حرکت قرار می‌گیرد.  
الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح در هر حالت چقدر است؟  
ب) ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟  
پ) اگر پس از حرکت، نخس با نیروی  $20\text{ N}$  جسم را هل دهد، ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.2$  باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد شد؟

**۱-۴** در شکل رویبر روی وزنه  $2\text{ kg}$  را به فر آویزان می‌کنیم، طول فنر  $12\text{ cm}$  می‌شود، و وقتی وزنه  $5\text{ kg}$  را به فر آویزان می‌کنیم، طول فنر  $15\text{ cm}$  می‌شود.  
الف) ثابت فنر چقدر است؟ (با طول عادی فنر (بدون وزنه) چند سانتی‌متر است؟)  
ب) در هر یک از موارد زیر، نیروهای وارد بر جسم را مشخص کنید. واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می‌شود؟  
الف) خودرویی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم افقی در حال حرکت است.  
ب) کشتی‌ای با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
پ) قایقی در حال بارو زدن است.  
ت) چرخزای در هوای آرام و در امتداد قائم در حال سقوط است.  
ث) هواپیمایی در یک سطح و زاویه افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
ج) بی‌بی در راستای قائم به زمین برخورد می‌کند و برمی‌گردد.  
ح) دانشمند خودرویی که با سرعت  $120\text{ km/h}$  در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دینامی اقدام به ترمز می‌کند و خودرو پس از طی مسافت  $200\text{ m}$  متوقف می‌شود.  
الف) شتاب خودرو در مدت ترمز چقدر است؟  
ب) از لحظه ترمز تا توقف کامل خودرو، چقدر طول می‌کشد؟  
پ) نیروی اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح چقدر است؟  
حجم خودرو را  $1200\text{ kg}$  فرض کنید.  
ج) چرخزای از یک پالتور تقریباً ساکن که در ارتفاع نسبتاً زیادی قرار دارد، به بیرون می‌برد و پس از مدتی چتر خود را باز می‌کند و در امتداد قائم سقوط می‌کند. حرکت چرخزای را از لحظه پرتی تا رسیدن به زمین تحلیل کنید و نموداری تقریبی از تندی آن بر حسب زمان رسم کنید.

واکنش نیروی  $f_D$  نیرویی است که از طرف سیب به هوا به طرف پایین وارد می‌شود ( $f_N$ ). واکنش وزن سیب، نیروی گرانشی است که از طرف سیب به زمین وارد شده و آن را به طرف بالا می‌کشد ( $\vec{W}'$ ).



**۲** جهت محور را رو به بالا انتخاب می‌کنیم و نیروهای وارد بر شخص را تعیین و از قانون دوم برای حل مسئله استفاده می‌کنیم.

$$F_N - W = ma \rightarrow F_N = W + ma = mg + ma \quad \text{الف)}$$

$$a = 0$$

$$F_N = mg + 0 = (50\text{ kg})(9.8\text{ N/kg}) = 490\text{ N}$$

ب) وقتی آسانسور با سرعت ثابت حرکت می‌کند باز هم شتاب صفر است ( $a=0$ )

$$F_N = mg + 0 = (50\text{ kg})(9.8\text{ N/kg}) = 490\text{ N}$$

$$a = +1/2\text{ m/s}^2 \quad \text{پ)}$$

$$F_N = mg + ma = (50\text{ kg})(9.8\text{ N/kg}) + (50\text{ kg})(1/2\text{ m/s}^2) = 550\text{ N}$$

$$a = -1/2\text{ m/s}^2 \quad \text{ت)}$$

$$F_N = mg + ma = (50\text{ kg})(9.8\text{ N/kg}) + (50\text{ kg})(-1/2\text{ m/s}^2) = 430\text{ N}$$

۳ الف) در هر دو حالت جسم ساکن است و نیروی اصطکاک ایستایی در خلاف جهت نیروی  $\vec{F}$  بر جسم وارد می‌شود.

$$F_N = 200 \text{ N}, a = 0, v = 0$$

$$F - f_s = ma \rightarrow f_s = F = 200 \text{ N}$$

$$F_T = 300 \text{ N}, a = 0, v = 0$$

$$F_T - f_{s, \max} = ma \rightarrow f_{s, \max} = F_T = 300 \text{ N}$$

(ب)

$$f_{s, \max} = \mu_s F_N, F_N = mg \rightarrow 300 \text{ N} = \mu_s (90 \text{ kg}) \times (9.8 \text{ N/kg})$$

$$\mu_s = \frac{300 \text{ N}}{(90 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg})} = 0.34$$

(پ)

$$f_k = \mu_k F_N = \mu_k (mg) = (0.20)(90 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg}) = 176.4 \text{ N}$$

جهت محور افقی را به طرف راست انتخاب می‌کنیم :

پرستش‌ها و مسئله‌های فصل ۲



۱. یک فنر در حالت تعادل با طول  $1.50 \text{ m}$  است. وقتی یک جسم  $2.00 \text{ kg}$  به آن آویزان می‌کنیم، طول فنر  $1.40 \text{ m}$  می‌شود. وقتی فنر را به طول  $1.30 \text{ m}$  می‌کشیم، طول فنر  $1.50 \text{ m}$  می‌شود. (الف) ثابت فنر چقدر است؟ (ب) طول عادی فنر (یعنی وقتی هیچ نیروی خارجی بر آن اعمال نمی‌شود) چقدر است؟ (ج) اگر فنر را به طول  $1.20 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (د) اگر فنر را به طول  $1.30 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ه) اگر فنر را به طول  $1.40 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (و) اگر فنر را به طول  $1.50 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ز) اگر فنر را به طول  $1.60 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ح) اگر فنر را به طول  $1.70 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ط) اگر فنر را به طول  $1.80 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ی) اگر فنر را به طول  $1.90 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ک) اگر فنر را به طول  $2.00 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟

۲. یک فنر در حالت تعادل با طول  $1.50 \text{ m}$  است. وقتی یک جسم  $2.00 \text{ kg}$  به آن آویزان می‌کنیم، طول فنر  $1.40 \text{ m}$  می‌شود. وقتی فنر را به طول  $1.30 \text{ m}$  می‌کشیم، طول فنر  $1.50 \text{ m}$  می‌شود. (الف) ثابت فنر چقدر است؟ (ب) طول عادی فنر (یعنی وقتی هیچ نیروی خارجی بر آن اعمال نمی‌شود) چقدر است؟ (ج) اگر فنر را به طول  $1.20 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (د) اگر فنر را به طول  $1.30 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ه) اگر فنر را به طول  $1.40 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (و) اگر فنر را به طول  $1.50 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ز) اگر فنر را به طول  $1.60 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ح) اگر فنر را به طول  $1.70 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ط) اگر فنر را به طول  $1.80 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ی) اگر فنر را به طول  $1.90 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟ (ک) اگر فنر را به طول  $2.00 \text{ m}$  بکشیم، نیروی فنر چقدر است؟

۳. در شکل نیروی کشش  $200 \text{ N}$  را به یک جسم  $90 \text{ kg}$  وارد می‌کنیم. اما جسم ساکن می‌ماند. (الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟ (ب) اگر پس از حرکت، نخ را به نیروی  $300 \text{ N}$  بکشیم، جسم را هل می‌دهد و ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.20$  باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد بود؟

۴. در شکل نشان داده شده، نخ به نیروی  $200 \text{ N}$  جسم  $90 \text{ kg}$  را هل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. (الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟ (ب) اگر پس از حرکت، نخ را به نیروی  $300 \text{ N}$  بکشیم، جسم را هل می‌دهد و ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.20$  باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد بود؟

۵. در شکل نشان داده شده، نخ به نیروی  $200 \text{ N}$  جسم  $90 \text{ kg}$  را هل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. (الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟ (ب) اگر پس از حرکت، نخ را به نیروی  $300 \text{ N}$  بکشیم، جسم را هل می‌دهد و ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.20$  باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد بود؟



۴

$$F - f_k = ma \rightarrow a = \frac{F - f_k}{m} = \frac{200 \text{ N} - 176.4 \text{ N}}{90 \text{ kg}} = 0.26 \text{ m/s}^2$$

$$F_e - mg = ma, a = 0 \Rightarrow F_e = mg$$

$$F_e = kx, x = l_f - l_0 \Rightarrow k(l - l_0) = mg$$

الف)

$$k(1.40 \text{ m} - 1.50 \text{ m}) = (2.00 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg})$$

$$k(1.50 \text{ m} - 1.50 \text{ m}) = (2.00 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg})$$

$$k(1.50 \text{ m} - 1.40 \text{ m}) = (2.00 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg}) \rightarrow k = 980 \text{ N/m}$$

(ب) مقدار به دست آمده را در یکی از روابط بالا قرار می‌دهیم :

$$(980 \text{ N/m})(1.40 \text{ m} - 1.50 \text{ m}) = (2.00 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg})$$

$$l_0 = 1.00 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

۵ الف) فرض می‌کنیم خودرو گیربکس جلو بوده، یعنی انتقال قدرت موتور به چرخ‌های جلو صورت می‌گیرد؛ در این صورت چرخ‌های جلو هنگام شروع به حرکت و در طول حرکت می‌خواهند روی زمین بچرخند. در نتیجه زمین را به طرف عقب هل می‌دهند (به علت برهم کنش بین لاستیک و سطح زمین نیروی اصطکاک ایستایی بین آنها به وجود می‌آید؛  $\vec{f}_s$  از زمین نیز چرخ‌ها را به جلو هل می‌دهد که به این نیرو، نیروی پیشران می‌گویند (پیشران  $\vec{F}$ )).

وقتی خودرو شروع به حرکت می‌کند نیروی مقاومت هوا به خودرو نیروی در خلاف جهت حرکت نیروی  $\vec{f}_s$  وارد می‌کند. خودرو نیز نیروی  $\vec{f}_D$  را به هوا و در خلاف جهت  $\vec{f}_D$  وارد می‌کند. به لاستیک‌های عقب خودرو که به تبع حرکت خودرو می‌چرخند، نیروی اصطکاک در


**پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۲**

**۱-۳ و ۲-۳ قوانین حرکت نیوتون و معرفی برخی از نیروهای خاص**  
 ۱. سسی را در نظر بگیرید که به شاخه درختی آویزان است و سپس از درخت جدا می‌شود.  
 الف) با رسم شکل نیروهای وارد بر سسی را قبل و بعد از جدا شدن از درخت نشان دهید. (با هر حالت واکنش این نیروها بر چه اجسامی وارد می‌شود؟)  
 ۲. دالتن آموزی به جرم  $5000 \text{ kg}$  روی یک ترازوی فیزی در آسانسور ایستاده است. در هر یک از حالت‌های زیر این ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟ (با  $g=9.8 \text{ m/s}^2$ )  
 الف) آسانسور ساکن است.  
 ب) آسانسور با سرعت ثابت حرکت می‌کند.  
 ج) آسانسور با شتاب  $1.7 \text{ m/s}^2$  به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند.  
 د) آسانسور با شتاب  $1.7 \text{ m/s}^2$  به طرف پایین شروع به حرکت می‌کند.  
 ۳. در شکل نشان داده شده، شخص با نیروی  $200 \text{ N}$  جسم  $100 \text{ kg}$  را هل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. وی وقتی با نیروی  $300 \text{ N}$  جسم را هل می‌دهد، جسم در آنساز حرکت قرار می‌گیرد.  
 الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح در هر حالت چقدر است؟  
 ب) ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟  
 ج) اگر پس از حرکت، شخص با نیروی  $200 \text{ N}$  جسم را هل دهد و ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.20$  باشد، شتاب حرکت جسم خواهد بود؟

**۴.** در شکل روبه‌رو وقتی وزنه  $200 \text{ kg}$  را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر  $140 \text{ cm}$  می‌شود، و وقتی وزنه  $500 \text{ kg}$  را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر  $150 \text{ cm}$  می‌شود.  
 الف) ثابت فنر چقدر است؟ (با طول عادی فنر بدون وزنه) چند سانتی‌متر است؟  
 ۵. در هر یک از موارد زیر، نیروهای وارد بر جسم را مشخص کنید. واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می‌شود؟  
 الف) خودرویی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم افقی در حال حرکت است.  
 ب) کشتی‌ای با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
 ج) قایق‌رانی در حال پارو زدن است.  
 د) چرخزایی در هوای آرام و در امتداد قائم در حال سقوط است.  
 ه) هواپیمایی در یک سطح ورازی افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
 ۶. اج  $100 \text{ kg}$  در راستای قائم به زمین برخورد می‌کند و برمی‌گردد. راننده خودرویی که با سرعت  $10 \text{ km/h}$  در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دیدن مایل انجام به تیز می‌کند و خودرو پس از طی مسافت  $200 \text{ m}$  متوقف می‌شود.  
 الف) شتاب خودرو در مدت ترمز چقدر است؟  
 ب) از لحظه ترمز تا توقف کامل خودرو، چقدر طول می‌کشد؟  
 ج) نیروی اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح چقدر است؟  
 د) جرم خودرو را  $1400 \text{ kg}$  فرض کنید.  
 ۷. چرخزایی از یک بانگر تقریباً ساکن که در ارتفاع نسبتاً زیادی قرار دارد، به بیرون می‌رود و پس از مدتی چتر خود را باز می‌کند و در امتداد قائم سقوط می‌کند. حرکت چرخزایی را از لحظه روشن تا رسیدن به زمین تحلیل کنید و نموداری تقریبی از تندی آن بر حسب زمان رسم کنید.

برخلاف جهت حرکت خودرو از طرف زمین وارد می‌شود ( $\vec{f}$ ). لاستیک‌ها نیز نیرویی در خلاف جهت  $\vec{f}$  به زمین وارد می‌کنند ( $\vec{f}'$ ).

از طرف سطح زمین نیروی عمودی سطح  $\vec{F}_N$  روبه بالا بر خودرو وارد می‌شود که واکنش آن از طرف خودرو به طرف پایین به سطح زمین وارد می‌شود. همچنین وزن خودرو از طرف زمین بر آن به طرف مرکز زمین وارد می‌شود ( $\vec{W}$ ) و واکنش وزن از طرف خودرو به زمین رو به بالا وارد می‌شود ( $\vec{W}'$ ).





ب)  $\vec{f}_D$ : نیروی مقاومت شاره (آب) در خلاف جهت حرکت از طرف شاره بر کشتی وارد می‌شود.

شناوری  $\vec{F}$ : نیروی شناوری که از طرف شاره (آب) به طرف بالا بر کشتی وارد می‌شود.

$\vec{W}$ : نیروی وزن که از طرف زمین به جسم به طرف پایین وارد می‌شود.


پیشران  $\vec{F}$ : نیرویی که از طرف شاره به کشتی به طرف جلو وارد می‌شود. این نیرو به علت مثلاً چرخش پروانه‌ها و هل دادن آب به طرف عقب حاصل می‌شود یعنی وقتی موتور کشتی سبب چرخش پره‌ها می‌شود، در چرخش پره‌ها، آب دریا به طرف عقب هل داده می‌شود و آب نیز پره‌ها را به طرف جلو هل می‌دهد که به این نیرو، نیروی پیشران می‌گوییم. واکنش این نیروها در شکل مشخص شده است. ضمناً از نیروی مقاومت هوا می‌توانیم صرف نظر کنیم.



پ) قایقران با پارو آب را به طرف عقب هل می‌دهد، آب نیز به پارو نیرویی رو به جلو وارد می‌کند که می‌توانیم نام آن را نیروی پیشران ( $F$ ) بگذاریم. نیروی وزن، شناوری و نیروی مقاومت شاره نیروهای دیگری هستند که به قایق وارد می‌شوند. این نیروها و واکنش آنها روی شکل نشان داده شده است.





ت) بر چتر باز (شخص و چتر) دو نیروی وزن و مقاومت هوا وارد می‌شود که روی شکل این نیروها و واکنش آنها رسم شده است.



ث) علاوه بر وزن و مقاومت هوا، دو نیروی دیگر نیز بر هواپیما وارد می‌شود. نیروی بالابری (بالبری  $\vec{F}$ ) که به علت اختلاف فشار لایه هوایی زیر بال و بالای بال به وجود می‌آید و نیروی پیشران وقتی موتور هواپیما روشن بوده و کار می‌کند، مخلوط سوخت و هوا با شدت زیادی به طرف عقب هل داده می‌شود (رانده می‌شود) و در نتیجه این مخلوط نیز به هواپیما به طرف جلو نیرو وارد می‌کند که به آن نیروی پیشران هواپیما گویند و با پیشران  $\vec{F}$  نشان می‌دهند. در مورد هواپیماهای ملخی هوا به عقب هل داده می‌شود و نیروی واکنش مربوط به هوای هل داده شده سبب حرکت هواپیما به سمت جلو می‌شود. این نیروها و واکنش آنها روی شکل نشان داده شده است.

ج) هنگام برخورد توپ با زمین، بر توپ دو نیروی وزن و نیروی زمین وارد می‌شود. این نیروها و واکنش آنها روی شکل نشان داده شده است.

**۳-۱ و ۳-۲ قوانین حرکت نیوتون و معرفی برخی از نیروهای خاص**  
 ۱. کسی را در نظر بگیرید که به شناخته‌شده‌ترین آوزان است و سپس از درخت جدا می‌شود.  
 الف) با رسم شکل نیروهای وارد بر سبب را قبل و بعد از جدا شدن از درخت نشان دهید. (با در هر حالت واکنش این نیروها بر چه اجسامی وارد می‌شود؟)  
 ب) دانش‌آموزی به جرم  $50\text{ kg}$  روی یک ترازوی فنری در آسانسور ایستاده است. در هر یک از حالت‌های زیر این ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟ ( $g = 9.8\text{ N/kg}$ )  
 الف) آسانسور ساکن است.  
 ب) آسانسور با سرعت ثابت حرکت می‌کند.  
 ج) آسانسور با شتاب  $1\text{ m/s}^2$  به طرف بالا تیراج به حرکت می‌کند.  
 د) آسانسور با شتاب  $1\text{ m/s}^2$  به طرف پایین تیراج به حرکت می‌کند.  
 ۲. در شکل نشان داده شده، شخص با نیروی  $200\text{ N}$  جسم  $100\text{ kg}$  کلوزگرمی را هل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. ولی وقتی با نیروی  $300\text{ N}$  جسم را هل می‌دهد، جسم در آنسأله حرکت قرار می‌گیرد.  
 الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح در هر حالت چقدر است؟  
 ب) اگر پس از حرکت، شخص با نیروی  $200\text{ N}$  جسم را هل دهد و ضرب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.2$  باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد شد؟  
 ۳. در شکل رویه‌برقی وزنی  $20\text{ kg}$  را به فنر آوزان می‌کنیم، طول فنر  $10\text{ cm}$  می‌شود، و وقتی وزنه  $50\text{ kg}$  را به فنر آوزان می‌کنیم، طول فنر  $150\text{ cm}$  می‌شود.  
 الف) ثابت فنر چقدر است؟ (با طول عادی فنر بدون وزنه) چند سانتی‌متر است؟  
 ب) در هر یک از موارد زیر، نیروهای وارد بر جسم را مشخص کنید. واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می‌شود؟  
 الف) خودرویی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم افقی در حال حرکت است.  
 ب) کشتی‌ای با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
 ج) قایق‌ای در حال پارو زدن است.  
 د) جریزایی در هوای آرام و در امتداد قائم در حال سقوط است.  
 ه) هواپیمایی در یک سطح افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
 ج) آبی در راستای قائم به زمین برخورد می‌کند و برمی‌گردد.  
 د) راننده خودرویی که با سرعت  $72\text{ km/h}$  در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دین ماهی اقدام به تیرز می‌کند و خودرو پس از طی مسافت  $200\text{ m}$  متوقف می‌شود.  
 الف) شتاب خودرو در مدت تیرز چقدر است؟  
 ب) از لحظه تیرز تا توقف کامل خودرو، چقدر طول می‌کشد؟  
 ج) نیروی اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح چقدر است؟  
 د) جرم خودرو را  $1200\text{ kg}$  فرض کنید.  
 ه) جریزایی از یک پلنگه تقریباً ساکن که در ارتفاع نسبتاً زیادی قرار دارد، به بیرون می‌برد و پس از مدتی چتر خود را باز می‌کند و در امتداد قائم سقوط می‌کند. حرکت جریزایی را از لحظه روشن تا رسیدن به زمین تحلیل کنید و نموداری تقریبی از شدت آن بر حسب زمان رسم کنید.



$$v^{\ddot{x}} = v_0^{\ddot{x}} + \ddot{a}\Delta x \rightarrow \ddot{a} = \frac{v^{\ddot{x}} - v_0^{\ddot{x}}}{\ddot{a}\Delta x} = \frac{-(20\text{ m/s})^{\ddot{x}}}{2(20\text{ m})} = -10\text{ m/s}^{\ddot{x}}$$

الف)

$$\Delta x = \frac{v + v_0}{2} t \rightarrow t = \frac{v + v_0}{\ddot{a}\Delta x} = \frac{0 + (20\text{ m/s})}{2(20\text{ m})} = 0.5\text{ s}$$

ب)

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۲

۱. در شکل روبرو، وقتی وزنه  $1\text{ kg}$  را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر  $14\text{ cm}$  می‌شود، و وقتی وزنه  $5\text{ kg}$  را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر  $15\text{ cm}$  می‌شود. الف) ثابت فنر چقدر است؟ (با طول عادی فنر بدون وزنه) چند سانتی‌متر است؟  
ب) در هر یک از موارد زیر، نیروهای وارد بر جسم را مشخص کنید. واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می‌شود؟  
الف) خودرویی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم افقی در حال حرکت است.  
ب) کشتی‌ای با سرعت ثابت در حال حرکت است.  
ج) تانکرایی در حال پارو زدن است.  
د) چترپازی در هوای آرام و در امداد قائم در حال سقوط است.  
ه) هواپیمایی در یک سطح پرواز افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است.


۲. در شکل نشان داده شده، شخص با نیروی  $200\text{ N}$  جسم  $100\text{ kg}$  را هل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. وقتی با نیروی  $300\text{ N}$  جسم را هل می‌دهد، جسم در مسأله حرکت قرار می‌گیرد.  
الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح در هر حالت چقدر است؟  
ب) اگر پس از حرکت، شخص با نیروی  $200\text{ N}$  جسم را هل دهد و ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم  $0.2$  باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد شد؟



پ) جرم خودرو را  $1200\text{ kg}$  در نظر می‌گیریم. پس از ترمز در راستای افقی، فقط نیروی اصطکاک در خلاف جهت حرکت بر خودرو وارد می‌شود. بنابراین قانون دوم را در این راستا می‌نویسیم:


$$-f_{\text{اصطکاک}} = ma \rightarrow -f_{\text{اصطکاک}} = (1200\text{ kg})(-10\text{ m/s}^2)$$

$$f_{\text{اصطکاک}} = 1/20 \times 10^4\text{ N}$$



۷ حرکت چترباز را در سه حالت بحث می‌کنیم. در همه حالت‌ها فرض می‌کنیم چترباز روی مسیر مستقیم حرکت می‌کند و اثر باد و عوامل دیگر را در نظر نمی‌گیریم.

الف) چترباز بلافاصله پس از پرش، چتر خود را باز می‌کند. در این حالت نیروی مقاومت هوا در ابتدا ناچیز است. با افزایش تندی چتر باز این نیرو افزایش پیدا می‌کند تا اینکه اندازه این نیرو با اندازه وزن برابر شود. در این حالت شتاب چترباز صفر شده و چترباز با تندی حدی به حرکت خود ادامه می‌دهد تا به زمین برسد.



فیزیک ۳

۱. در شکل زیر، نیروی  $F_1$  به بزرگی  $200\text{ N}$  و جرم راننده  $100\text{ kg}$  است. اما همه همان‌سان ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی نیروی قائم  $F_2$  که جرمه را به زمین می‌فشارد از صفر شروع به افزایش کند، کیت‌های زیر چگونه تغییر می‌کنند؟


الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جبهه (ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جبهه (ب) اندازه پیشینی نیروی اصطکاک ایستایی (ب) نیروی خالص وارد بر جسم

۲. می‌خواهیم جسمی  $100\text{ kg}$  را  $50\text{ cm}$  شتاب  $200\text{ m/s}^2$  بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیرویی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید. از مقاومت هوا صرف‌نظر می‌نمود.  
الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند.  
ب) جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک  $0.2$  به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد.  
ب) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند.  
د) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پایین شروع به حرکت کند.  
۳. قطعه چوبی را با سرعت افقی  $10\text{ m/s}$  روی سطحی افقی برتاب می‌کنیم. ضریب اصطکاک جنبشی بین چوب و سطح  $0.2$  است.  
الف) چوب پس از بیرون‌شدن چه مسافتی می‌پیماید؟  
ب) اگر از یک قطعه چوب دیگر استفاده کنیم که جرم آن دو برابر جرم قطعه چوب اول و ضریب اصطکاک جنبشی آن با سطح افقی با اولی یکسان باشد و با همان سرعت برتاب شود، مسافت پیوسته شده آن چند برابر می‌شود؟

۱. وزنه‌ای با جرم  $20\text{ kg}$  را به انتهای فنری به طول  $11\text{ cm}$  که ثابت آن  $20\text{ N/cm}$  است می‌نویسیم و فنر را از سقف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. طول فنر در حالت‌های زیر محاسبه کنید. الف) آسانسور ساکن است. ب) آسانسور با سرعت ثابت  $2\text{ m/s}$  رو به پایین در حرکت است. ب) آسانسور با شتاب ثابت  $2\text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به پایین شروع به حرکت کند. د) آسانسور با شتاب ثابت  $2\text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند.  
۲. برای یک راننده داستین کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، کل مسافت توقف دو قسمت دارد: مسافت واکنش (مسافتی که خودرو از لحظه دیدن مانع تا ترمز گرفتن طی می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظه ترمز گرفتن تا توقف کامل طی می‌کند).

الف) دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید. ب) زمان واکنش راننده‌ای  $0.6\text{ s}$  است. در طی این زمان، خودرو مسافت  $18\text{ m}$  را طی می‌کند. با فرض ثابت بودن سرعت در این مدت، اندازه آن را حساب کنید. ب) اگر در این سرعت راننده ترمز کند و خودرو پس از  $5\text{ m}$  متوقف شود، مسافت ترمز و شتاب خودرو را حساب کنید. د) وقتی خودرو ترمز می‌کند، نیروی خالص وارد بر آن چقدر است؟ جرم خودرو را  $1500\text{ kg}$  فرض کنید. الف) یک خودروی باری با قطب افقی محکم، یک خودروی سواری به جرم  $1500\text{ kg}$  را می‌کشد. نیروی اصطکاک مقاومت هوا در مقابل حرکت خودروی سواری  $22\text{ N}$  و

ب) چتر باز مدتی پس از پرش، چترش را باز می‌کند. در این حالت تندی چتر باز زیاد و زیادتر می‌شود و نیروی مقاومت هوا در تندی‌های خیلی زیاد با وزن هم اندازه می‌شود (تندی حدی اولیه). پس از باز کردن چتر، ناگهان نیروی مقاومت هوا به علت افزایش مساحت در آن تندی زیاد به شدت زیاد می‌شود و حرکت چتر باز کند خواهد شد و نیروی مقاومت هوا آن قدر کاهش پیدا می‌کند تا با وزن هم اندازه شود، در این حالت به تندی حدی ثانویه می‌رسد.



۱. در شکل زیر، نیروی  $F_1$  به بزرگی  $20\text{ N}$  بر جعبه وارد شده است، اما جعبه همچنان ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی نیروی قائم  $F_2$  که جعبه را به زمین می‌فشارد از صفر شروع به افزایش کند، کنت‌های زیر چگونه تغییر می‌کنند؟

۲. وزنه‌ای به جرم  $2\text{ kg}$  را به انتهای تری به طول  $11\text{ cm}$  ثابت آن  $20\text{ N}$  است می‌بندیم و قدری آن را از سقف یک آسانسور آروان می‌کنیم. طول تری را در حالت‌های زیر محاسبه کنید.


الف) آسانسور ساکن است.

ب) آسانسور با سرعت ثابت  $2\text{ m/s}$  رو به پایین در حرکت است.

ب) آسانسور با شتاب ثابت  $2\text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به پایین شروع به حرکت کند.

ت) آسانسور با شتاب ثابت  $2\text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند.

۳. برای یک راننده داستان کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، کل مسافت توقف، دو قسمت دارد: مسافت واکنش (مسافتی که خودرو از لحظه دیدن مانع تا بریز گرفتن پدال می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظه ترمز گرفتن تا توقف کامل طی می‌کند).




الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه  
ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جعبه  
ب) اندازه شیبی نیروی اصطکاک ایستایی  
ت) نیروی حاصل وارد بر جعبه

۴. می‌خواهیم به جسمی که جرم آن  $10\text{ kg}$  است شتاب  $2\text{ m/s}^2$  بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیروی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید. از مقاومت هوا صرف‌نظر می‌نماید.


الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند.  
ب) جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک  $0.2$  به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد.  
ب) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند.  
ت) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پایین شروع به حرکت کند.



۵. دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید.  
ب) زمان واکنش راننده‌ای  $0.4\text{ s}$  است. در طی این زمان، خودرو مسافت  $18\text{ m}$  را طی می‌کند. با فرض ثابت بودن سرعت در این مدت، اندازه آن را حساب کنید.  
ب) اگر در این سرعت راننده ترمز کند و خودرو پس از  $0.4\text{ s}$  متوقف شود، مسافت ترمز و شتاب خودرو را حساب کنید.  
ت) وقتی خودرو ترمز می‌کند، نیروی حاصل وارد بر آن چقدر است؟ جرم خودرو را  $1500\text{ kg}$  فرض کنید.  
۶. یک خودروی باری با شتاب افقی محکم، یک خودروی سواری به جرم  $1500\text{ kg}$  را می‌کشد. نیروی اصطکاک و مقاومت هوا در مقابل حرکت خودروی سواری  $22\text{ N}$  و



اگر چتر باز قبل از رسیدن به تندی حدی اولیه چترش را باز کند، نمودار به صورت شکل روبه‌رو خواهد شد.



۸ نیروهای وارد بر جسم متوازن اند. بنابراین  $a = 0$  است و داریم:

$$F_N = W + F_1, F_1 = f_s$$

$$\hat{\uparrow} (F_N = F_1 + W)$$

$$\text{ب) ثابت می‌ماند (ثابت) } (f_s = F_1)$$

$$\text{پ) افزایش می‌یابد } (f_{s, \max} = \mu_s F_N = \mu_s (F_1 + W))$$

ت) ثابت می‌ماند (نیروی خالص در همه حالت‌ها صفر باقی می‌ماند)

$$F - f_k = ma \rightarrow F = ma = (5/0 \cdot \text{kg})(2/0 \cdot \text{m/s}^2) = 10 \text{ N} \quad \text{الف)}$$


$$F_N = mg = (5/0 \cdot \text{kg})(9/8 \cdot \text{N/kg}) = 49 \text{ N} \quad \text{ب)}$$

$$f_k = \mu_k F_N = (0/2 \cdot 0)(49 \text{ N}) = 9/8 \text{ N}$$

فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره‌ای ۱۰۷

فیزیک ۳

۱. در شکل زیر، نیروی  $F_1$  به بزرگی  $20\text{ N}$  بر جعبه وارد شده است، اما جعبه همچنان ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی نیروی قائم  $F_2$  که جعبه را به زمین می‌فشارد از صفر تریغ به افزایش کند، کمیت‌های زیر چگونه تغییر می‌کنند؟



الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه  
ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جعبه  
ج) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی  
د) نیروی خالص وارد بر جعبه

۲. می‌خواهیم به جسمی که جرم آن  $5\text{ kg}$  است شتاب  $2\text{ m/s}^2$  بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیروی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید. از مقاومت هوا صرف‌نظر می‌نماید.  
الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند.  
ب) جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک  $0.2$  به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد.  
ج) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند.  
د) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پایین شروع به حرکت کند.

۳. قطعه چوبی را با سرعت افقی  $10\text{ m/s}$  روی سطحی افقی برتاب می‌کنیم. ضریب اصطکاک جنبشی بین چوب و سطح  $0.2$  است.  
الف) چوب پس از بیودن چه مسافتی می‌پیماید؟  
ب) اگر از یک قطعه چوب دیگر استفاده کنیم که جرم آن دو برابر جرم قطعه چوب اول و ضریب اصطکاک جنبشی آن با سطح افقی با اولی یکسان باشد و با همان سرعت برتاب شود، مسافت بیوده شده آن چند برابر می‌شود؟

۴. وزنه‌ای به جرم  $2\text{ kg}$  را به انتهای تری به طول  $11\text{ cm}$  ثابت آن  $20\text{ Ncm}$  است می‌نیم و فترا از سقف یک آسانسور آروان می‌کنیم. طول فترا در حالت‌های زیر محاسبه کنید. الف) آسانسور ساکن است.

ب) آسانسور با سرعت ثابت  $2\text{ m/s}$  رو به پایین در حرکت است.

ج) آسانسور با شتاب ثابت  $2\text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به پایین شروع به حرکت کند.

د) آسانسور با شتاب ثابت  $2\text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند.

۵. برای یک راننده داشتن کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، کل مسافت توقف، دو قسمت دارد: مسافت واکنش (مسافتی که خودرو از لحظه دیدن مانع تا بزرگرفتن طی می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظه بزرگرفتن تا توقف کامل طی می‌کند).



الف) دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید.

ب) زمان واکنش راننده‌ای  $0.75\text{ s}$  است. در طی این زمان، خودرو مسافت  $18\text{ m}$  را طی می‌کند. با فرض ثابت بودن سرعت در این مدت، اندازه آن را حساب کنید.

ج) اگر در این سرعت راننده ترمز کند و خودرو پس از  $50\text{ m}$  متوقف شود، مسافت ترمز و شتاب خودرو را حساب کنید.

د) وقتی خودرو ترمز می‌کند، نیروی خالص وارد بر آن چقدر است؟ جرم خودرو را  $1500\text{ kg}$  فرض کنید.

۶. یک خودروی باری با شتاب افقی محکم، یک خودروی سواری به جرم  $1500\text{ kg}$  را می‌کشد. نیروی اصطکاک و مقاومت هوا در مقابل حرکت خودروی سواری  $220\text{ N}$

$$F - f_k = ma \rightarrow F = f_k + ma = (9/8\text{ N}) + (5/0\text{ kg})(2/0\text{ m/s}^2) = 19/8\text{ N}$$

(پ)

$$F - mg = ma \rightarrow F = mg + ma = m(g + a) = (5/0\text{ kg})(9/8\text{ m/s}^2 + 2/0\text{ m/s}^2) = 59\text{ N}$$

(ت)

$$F - mg = ma, a = -2/0\text{ m/s}^2$$

$$F = m(g + a) = (5/0\text{ kg})(9/8\text{ m/s}^2 + (-2/0\text{ m/s}^2)) = 39\text{ N}$$

خوب است پس از حل این مسئله، از دانش آموزان بخواهیم که بگویند از حل آن چه نتیجه‌ای گرفتند؟

۱۰

الف) نیروها در راستای قائم متوازن اند:

$$F_N - mg = 0 \rightarrow F_N = mg$$

قانون دوم را در راستای حرکت به کار می‌بریم:

$$-f_k = ma \rightarrow -\mu_k F_N = ma \rightarrow -\mu_k mg = ma \rightarrow a = -\mu_k g$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، شتاب حرکت مستقل از جرم است.

$$a = 0.2 \times (9/8\text{ m/s}^2) = -1/96\text{ m/s}^2$$

$$v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \rightarrow \Delta x = \frac{v^2 - v_0^2}{2a} = \frac{0 - v_0^2}{-2\mu_k g} = \frac{v_0^2}{2\mu_k g}$$

همان‌طور که ملاحظه می‌شود مسافت طی شده نیز مستقل از جرم است.

ب) همان‌طور که در قسمت الف گفته شد، شتاب و جابه‌جایی مستقل از جرم هستند.

۱۱

الف و ب) برای سادگی  $g$  را  $10\text{ m/s}^2$  فرض می‌کنیم.


$$F_e - W = ma, a = 0$$

$$F_e = W \rightarrow k(l - l_0) = mg$$

$$(20 \times 10^3\text{ N/m})(l - 12 \times 10^{-2}\text{ m}) = (2/0\text{ kg})(10\text{ m/s}^2)$$

$$l - 12 \times 10^{-2}\text{ m} = 1/0 \times 10^{-2}\text{ m} \rightarrow l = 13 \times 10^{-2}\text{ m}$$

$$l = 13\text{ cm}$$



(پ)

۱. وزنه‌ای به جرم  $2 \text{ kg}$  را به انتهای تری به طول  $11 \text{ cm}$  که ثابت آن  $20 \text{ N/cm}$  است می‌بندیم و فنر را از سلف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. طول فنر در حالت‌های زیر محاسبه کنید.

(الف) آسانسور ساکن است.

(ب) آسانسور با سرعت ثابت  $2 \text{ m/s}$  رو به پایین در حرکت است.

(ج) آسانسور با شتاب ثابت  $2 \text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به پایین شروع به حرکت کند.

(د) آسانسور با شتاب ثابت  $2 \text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند.

۲. برای یک راننده داشتن کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، کل مسافت توقف، دو قسمت دارد: مسافت واکنش (مسافتی که خودرو از لحظه دیدن ماع تا بزرگرفتن طی می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظه ترمز گرفتن تا توقف کامل طی می‌کند).



(الف) دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید.


(ب) زمان واکنش راننده‌ای  $0.4 \text{ s}$  است. در طی این زمان، خودرو مسافت  $10 \text{ m}$  را طی می‌کند. با فرض ثابت بودن سرعت در این مدت، اندازه آن را حساب کنید.

(ج) اگر در این سرعت راننده ترمز کند و خودرو پس از  $0.5 \text{ s}$  متوقف شود، مسافت ترمز و شتاب خودرو را حساب کنید.

(د) وقتی خودرو ترمز می‌کند، نیروی خالص وارد بر آن چقدر است؟ جرم خودرو را  $1500 \text{ kg}$  فرض کنید.

(ه) یک خودروی باری با شتاب افقی محکمی، یک خودروی سواری به جرم  $1500 \text{ kg}$  را می‌کشد. نیروی اصطکاک و مقاومت هوا در مقابل حرکت خودروی سواری  $22 \text{ N}$  و

۳. در شکل زیر، نیروی  $F_1$  به بزرگی  $20 \text{ N}$  بر جعبه وارد شده است، اما جعبه همچنان ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی نیروی قائم  $F_2$  که جعبه را به زمین می‌فشارد از صفر شروع به افزایش کند، کمیت‌های زیر چگونه تغییر می‌کنند؟



(الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه

(ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جعبه

(ج) نیروی خالص وارد بر جعبه

۴. می‌خواهیم به جسمی که جرم آن  $10 \text{ kg}$  است، شتاب  $2 \text{ m/s}^2$  بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیروی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید. از مقاومت هوا صرف‌نظر می‌نماید.

(الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند.

(ب) جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک  $0.2$  به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد.

(ج) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند.

(د) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پایین شروع به حرکت کند.

۵. قطعه چوبی را با سرعت افقی  $10 \text{ m/s}$  روی سطحی افقی رها می‌کنیم. ضریب اصطکاک جنبشی بین چوب و سطح  $0.2$  است.

(الف) چوب پس از بیودن چه مسافتی می‌اندازد؟

(ب) اگر از یک قطعه چوب دیگر استفاده کنیم که جرم آن دو برابر جرم قطعه چوب اول و ضریب اصطکاک جنبشی آن با سطح افقی یا اولی یکسان باشد و با همان سرعت رها شود، مسافت بیودن آن چند برابر می‌شود؟

مسئله ۳۱

$$a = -2 \text{ m/s}^2$$

$$F_e - mg = ma \rightarrow F_e = mg + ma = m(g + a)$$

$$k(l - l_0) = m(g + a) \rightarrow (200 \times 10^3 \text{ N/m})(l - 12 \times 10^{-2} \text{ m}) =$$

$$(200 \text{ kg})(10 \text{ m/s}^2 - 2 \text{ m/s}^2)$$

$$l - 12 \times 10^{-2} \text{ m} = \frac{16 \text{ N}}{200 \times 10^3 \text{ N/m}} = 8 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$l = 12.8 \times 10^{-2} \text{ m} = 12.8 \text{ cm}$$

(ت)

$$a = +2 \text{ m/s}^2$$

$$F_e = m(g + a) \rightarrow k(l - 12 \times 10^{-2} \text{ m}) = (200 \text{ kg})(10 \text{ m/s}^2 + 2 \text{ m/s}^2)$$

$$l - 12 \times 10^{-2} \text{ m} = \frac{24 \text{ N}}{200 \times 10^3 \text{ N/m}} \rightarrow l = 13.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 13.2 \text{ cm}$$

۱۲

(الف) اندازه سرعت خودرو و زمان واکنش (طبق رابطه  $\Delta x = v\Delta t$ )

(ب)

$$\Delta x = v\Delta t \rightarrow v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{18 \text{ m}}{0.6 \text{ s}} = 30 \text{ m/s} = 108 \text{ km/h}$$

(پ)

$$\Delta x = \left(\frac{v + v_0}{2}\right)\Delta t = \left(\frac{0 + 30 \text{ m/s}}{2}\right)(0.6 \text{ s}) = 9 \text{ m}$$


$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{0 - 30 \text{ m/s}}{0.6 \text{ s}} = -50 \text{ m/s}^2$$

(ت)

$$F_{net} = ma = (1500 \text{ kg})(-50 \text{ m/s}^2) = -75000 \text{ N}$$

علامت منفی نشان می‌دهد جهت نیروی خالص در خلاف جهت حرکت خودرو است.

۱۳



(الف)

$$T - (f + f_D) = ma, a = 0$$

(ب)

$$T = f + f_D = 2200 \text{ N} + 3800 \text{ N} = 6000 \text{ N}$$

$$T - (f + f_D) = ma \rightarrow T - 6000 \text{ N} = (1500 \text{ kg})(2 \text{ m/s}^2)$$

$$T = 7000 \text{ N}$$

۱. وزنه‌ای به جرم  $2 \text{ kg}$  را به انتهای تری به طول  $11 \text{ cm}$  ثابت آن  $20 \text{ N/cm}$  است می‌بندیم و فنرا از سقف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. طول فنرا در حالت‌های زیر محاسبه کنید.

(الف) آسانسور ساکن است.

(ب) آسانسور با سرعت ثابت  $2 \text{ m/s}$  رو به پایین در حرکت است.

(ج) آسانسور با شتاب ثابت  $2 \text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به پایین شروع به حرکت کند.

(د) آسانسور با شتاب ثابت  $2 \text{ m/s}^2$  از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند.

۲. برای یک راننده داشتن کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد، کل مسافت توقف، دو قسمت دارد: مسافت واکنش (مسافتی که خودرو از لحظه دیدن مانع تا بزرگرفتن فنی می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظه بزرگرفتن فنی تا توقف کامل طی می‌کند).



۳. دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید.


(الف) زمان واکنش راننده‌ی  $0.4 \text{ s}$  است. در طی این زمان، خودرو مسافت  $18 \text{ m}$  را طی می‌کند. فرض ثابت بودن سرعت در این مدت، اندازه آن را حساب کنید.

(ب) اگر در این سرعت راننده ترمز کند و خودرو پس از  $0.8 \text{ s}$  متوقف شود، مسافت ترمز و شتاب خودرو را حساب کنید.

(ج) وقتی خودرو ترمز می‌کند، نیروی خاکی وارد بر آن چقدر است؟ مهر خودرو را  $10^4 \text{ kg}$  فرض کنید.

(د) یک خودروی باری با شتاب افقی محکم، یک خودروی سواری به جرم  $1500 \text{ kg}$  را می‌کشد. نیروی اصطکاک و مقاومت هوا در مقابل حرکت خودروی سواری  $22 \text{ N}$  و

۴. در شکل زیر، نیروی  $F$  به بزرگی  $20 \text{ N}$  بر جعبه وارد شده است، اما جعبه همچنان ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی نیروی قائم  $F_N$  که جعبه را به زمین می‌فشارد از صفر شروع به افزایش کند، گسنت‌های زیر چگونه تغییر می‌کنند؟



الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه (ب) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی وارد بر جعبه (ج) اندازه نیروی اصطکاک ایستایی (د) نیروی خالص وارد بر جعبه

۵. می‌خواهیم به جسمی که جرم آن  $0.5 \text{ kg}$  است، شتاب  $2 \text{ m/s}^2$  بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیروی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید. از مقاومت هوا صرف‌نظر می‌نماید.

الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند.

(ب) جسم روی سطح افقی با ضریب اصطکاک  $0.4$  به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد.


(ج) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند.

(د) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پایین شروع به حرکت کند.

۶. قطعه‌چوبی را با سرعت افقی  $10 \text{ m/s}$  روی سطحی افقی تریاب می‌کنیم. ضریب اصطکاک جنبشی بین چوب و سطح  $0.2$  است.

الف) چوب پس از بیرون چه مسافتی می‌پیماید؟

(ب) اگر از یک قطعه‌چوب دیگر استفاده کنیم که جرم آن دو برابر جرم قطعه‌چوب اول و ضریب اصطکاک جنبشی آن با سطح افقی یا اولی یکسان باشد و با همان سرعت تریاب شود، مسافت پیموده شده آن چند برابر می‌شود؟



(ب)

$$f_s - W = ma, a = 0$$

$$f_s = W = mg = (2/5 \text{ kg})(9/80 \text{ m/s}^2) = 24/5 \text{ N}$$

(پ) خیر تغییر نمی‌کند زیرا  $f_s$  هم اندازه‌ای با وزن است. بنابراین با افزایش  $F$  فقط  $F_N$  زیاد می‌شود زیرا  $F_N = F$  است.

۱۵ (الف) علت این پدیده‌ها، ویژگی لختی است. یعنی در حالت اول که خودرو شروع به حرکت می‌کند، شما تمایل دارید همچنان حالت سکون خود را حفظ کنید و به همین علت به صندلی فشرده می‌شوید. در حالت دوم شما تمایل دارید همچنان به حرکت خود ادامه دهید و به همین علت به جلو پرتاب می‌شوید.

(ب) کمربند ایمنی دو نقش دارد؛ اول آنکه از پرت شدن شما (جدا شدن از صندلی) به جلو، جلوگیری می‌کند. دوم آنکه زمان برخورد را (حدود  $10^\circ$  برابر) افزایش می‌دهد. کیسه هوا نیز دو نقش دارد؛ اول آنکه زمان برخورد شما را افزایش می‌دهد (حدود  $10^\circ$  برابر) و دوم آنکه سطح برخورد شما را با جلوی خودرو زیاد می‌کند (به مساحت حدود  $0.5 \text{ m}^2$  می‌رساند).

با توجه به رابطه  $F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$  اگر  $\Delta t$  افزایش پیدا کند، نیروی وارد بر سرنشین کاهش پیدا می‌کند. مثلاً اگر کمربند ایمنی و کیسه هوا سبب افزایش  $10^\circ$  برابری زمان برخورد شوند، نیروی وارد بر سرنشین،  $2^\circ$  برابر کاهش پیدا می‌کند و این سبب کاهش شدید آسیب به سرنشین می‌شود. (البته این افزایش زمان در کنار افزایش مساحت برخورد جراحات‌های ناشی از برخورد را کاهش می‌دهد)

$$\Delta p = m\Delta v, v_1 = 15/0 \text{ m/s}, v_2 = -22/0 \text{ m/s}$$

$$\Delta p = (0/280 \text{ kg})(-22/0 \text{ m/s} - (15/0 \text{ m/s})) = -10/36 \text{ kg.m/s} = -10/4 \text{ kg.m/s} \Rightarrow |\Delta p| = 10/4 \text{ kg.m/s}$$

$$F_{av} = \frac{|\Delta p|}{\Delta t} = \frac{10/36 \text{ kg.m/s}}{0/060 \text{ s}} = 172/6 \text{ N} \approx 173 \text{ N}$$

(ب)

۱۷ تغییر تکانه توپ برابر با مساحت سطح زیر نمودار  $F-t$  است:

$$\Delta p = S = \frac{(2/5 \times 10^{-3} \text{ s} - 1/0 \times 10^{-3} \text{ s})(20/0 \times 10^3 \text{ N})}{2} = 15 \text{ kg.m/s}$$

$$F_{av} = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{15 \text{ kg.m/s}}{1/5 \times 10^{-3} \text{ s}} = 1/0 \times 10^4 \text{ N}$$

$$T = \frac{t}{n} = \frac{60 \cdot 60 \text{ s}}{1000} = 3.6 \text{ s}$$

$$v_{\text{وسط}} = \frac{2\pi r_{\text{وسط}}}{T} = \frac{2\pi(2 \cdot 10^3 \text{ m})}{3.6 \text{ s}} = \frac{2 \cdot 10^3 \pi}{3.6} \text{ m/s} \approx 175 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{نوک}} = \frac{2\pi r_{\text{نوک}}}{T} = \frac{2\pi(4 \cdot 10^3 \text{ m})}{3.6 \text{ s}} = \frac{4 \cdot 10^3 \pi}{3.6} \text{ m/s} \approx 350 \text{ m/s}$$

$$a_c = \frac{v^2}{r_{\text{وسط}}} = \frac{4\pi^2 r_{\text{وسط}}}{T^2} = \frac{4(3/14)^2 (2 \cdot 10^3 \text{ m})}{(0.06 \text{ s})^2} = 4382 \text{ m/s}^2 \quad \times 4 \times 10^4$$

$$\approx 4/4 \times 10^4 \text{ m/s}^2$$

$$a_c = \frac{4\pi^2 r_{\text{نوک}}}{T^2} = \frac{4(3/14)^2 (4 \cdot 10^3 \text{ m})}{(0.06 \text{ s})^2} = 8764 \quad \times$$

$$\approx 8/8 \times 10^4 \text{ m/s}^2$$

فصل ۱۱: حرکت دایره‌ای

الف) علت این پدیده‌ها را توضیح دهید. (ب) نقش گرانش اجسی و کسب‌ها در کربندن اسپیدها در تصادف‌ها را بیان کنید.

۱۷. جرم  $2 \text{ kg}$  با سرعت  $15 \text{ m/s}$  به پارکینگ نزدیک می‌شود. پارکینگ با شیب به توب ضربه می‌زند و باعث می‌شود توب با سرعت  $22 \text{ m/s}$  در جهت مخالف برگردد.

الف) انرژی تغییر شکله توب را محاسبه کنید.

ب) اگر شیب پارکینگ  $30^\circ$  باشد، توب در تماس با شیب، انرژی توبی متوسط وارد بر شیب پارکینگ از طرف توب را به دست آورید.

۱۸. شکل زیر، معنی تیری خالص بر حسب زمان را برای توب بیسبالی که با جوب بیسبال به آن ضربه زده شده است، نشان می‌دهد. تغییر شکله توب و تیری خالص متوسط وارد بر آن را به دست آورید.

۳-۲ نکته و قانون دوم نیوتون

۱۹. وقتی در خودروی سالتی تسلا ایستاده و خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، به صندلی فشارده می‌شود. همین‌طور اگر در خودروی در حال حرکت ایستاده باشید، در توقف ناگهانی به جلو برتاب می‌شوید.

۳-۲ حرکت دایره‌ای یکپارچه

۱۹. بروهای یک بالگرد در هر دقیقه،  $1000$  دور می‌چرخند. طول پرواز  $2000 \text{ m}$  فرض کنید و کمیت‌های زیر را برای پرواز محاسبه کنید.

الف) دوره تناوب پرواز

ب) سرعت در وسط و نوک پرواز

ب) شتاب مرکز گرا در وسط و نوک پرواز

۲۰. حداقل ضرب اصطکاک استاتیکی بین چرخ‌های خودرو و سطح جاده، جقدر باشد تا خودرو بتواند با سرعت  $57 \text{ km/h}$  پیچ افقی مسطحی را که شعاع آن  $50 \text{ m}$  است، دور بزند؟

$$f_s = m \frac{v^2}{r} \rightarrow f_{s, \text{max}} = m \frac{v^2}{r} \rightarrow \mu_s F_N = m \frac{v^2}{r} \rightarrow \mu_s (mg) = m \frac{v^2}{r} \rightarrow \mu_s = \frac{v^2}{rg}$$

$$\mu_s = \frac{(15 \text{ m/s})^2}{(50 \text{ m})(10 \text{ m/s}^2)} = 0.45$$

۳-۲ نیرو گرانشی

۲۰. دو جسم در فاصله  $2 \cdot 10^8 \text{ m}$  از هم، یکدیگر را با نیروی گرانشی کوچک  $1 \cdot 10^{-10} \text{ N}$  جذب می‌کنند. اگر جرم یکی از اجسام  $5 \cdot 10^3 \text{ kg}$  باشد، جرم جسم دیگر جقدر است؟

۲۱. ماهواره‌ای به جرم  $600 \text{ kg}$  در مدار دایره‌ای به ارتفاع  $2800$  کیلومتر از سطح زمین، به دور آن می‌چرخد.

الف) نیروی گرانشی وارد بر ماهواره

ب) شتاب ماهواره

ب) سرعت ماهواره

ت) دوره تناوب ماهواره را در این ارتفاع بدست آورید. ( $M_E = 5.98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  و  $R_E = 6400 \text{ km}$ )

۲۲. الف) در چه ارتفاعی از سطح زمین، وزن یک شخص به نصف مقدار خود در سطح زمین می‌رسد؟

ب) اگر جرم ماهواره‌ای  $5 \cdot 10^3 \text{ kg}$  باشد، وزن آن در ارتفاع  $36000$  کیلومتری از سطح زمین خواهد شد؟

۳-۲ حرکت دایره‌ای یکپارچه

۲۰. الف) شتاب گرانشی ناشی از خوردنید در سطح زمین جقدر است؟

ب) شتاب گرانشی ناشی از ماه در سطح زمین جقدر است؟

$M_E = 5.98 \cdot 10^{24} \text{ kg}$  و  $M_M = 7.36 \cdot 10^{22} \text{ kg}$  و  $R_M = 1785 \cdot 10^3 \text{ km}$  فاصله زمین تا خوردنید  $384000 \text{ km}$  فاصله زمین تا ماه  $384000 \text{ km}$

۲۱. الف) سینه‌ای به جرم  $10 \text{ kg}$  در وسط فاصله بین زمین و ماه قرار دارد. نیروی گرانشی خالصی را که از طرف زمین و ماه به این سینه در این مکان وارد می‌شود بدست آورید (از داده‌های مسئله‌های قبل استفاده کنید).

ب) در چه فاصله‌ای از زمین، نیروی گرانشی ماه و زمین بر سینه، یکدیگر را خنثی می‌کنند؟

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \Rightarrow m_1 = \frac{F r^2}{G m_2} = \frac{(1 \cdot 10^{-10} \text{ N})(2 \cdot 10^8 \text{ m})^2}{(6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2)(5 \cdot 10^3 \text{ kg})}$$

$$= 1199/4 \text{ kg} \approx 1/2 \times 10^3 \text{ kg}$$

$$F = G \frac{M_e m}{r^2}, r = R_e + h$$

$$F = (6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2) \frac{(5.98 \times 10^{24} \text{ kg})(600 \text{ kg})}{(9200 \times 10^3 \text{ m})^2}$$

$$= 2/8275 \times 10^3 \text{ N} \approx 2/83 \times 10^3 \text{ N}$$

په‌رود

**۵-۲ نیروی گرانشی**  
 دو جسم در فاصله  $2 \times 10^3 \text{ m}$  از هم، یکدیگر را با نیروی گرانشی کوچک  $1 \times 10^{-10} \text{ N}$  جذب می‌کنند. اگر جرم یکی از اجسام  $50 \text{ kg}$  باشد، جرم جسم دیگر چقدر است؟  
**پ** ماهواره‌ای به جرم  $600 \text{ kg}$  در مدار دایره‌ای به ارتفاع  $2800$  کیلومتر از سطح زمین، به دور آن می‌چرخد.  
 الف) نیروی گرانشی وارده بر ماهواره  
 ب) شتاب ماهواره  
 ت) دوره تناوب ماهواره را در این ارتفاع بدست آورید.  
**پ** الف) شتابی ای به جرم  $3000 \text{ kg}$  در وسط فاصله بین زمین و ماه قرار دارد. نیروی گرانشی حالتی را که از طرف زمین و ماه به این سفینه در این مکان وارده می‌شود بدست آورید.  
 ب) در چه فاصله‌ای از زمین، نیروی گرانشی ماه و زمین بر سفینه، یکدیگر را خنثی می‌کنند؟  
**پ** الف) در چه ارتفاعی از سطح زمین، وزن یک نخ‌بند به نصف مقدار خود در سطح زمین می‌رسد؟  
 ب) اگر جرم ماهواره‌ای  $25 \text{ kg}$  باشد، وزن آن در ارتفاع  $36000$  کیلومتری از سطح زمین چقدر خواهد شد؟

(ب)

$$a = \frac{F}{m} = \frac{2 / 8275 \times 10^{-3} \text{ N}}{600 \text{ kg}} = 4 / 71 \text{ m/s}^2$$

(پ)

$$F = m \frac{v^2}{r} \rightarrow G \frac{M_e m}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \rightarrow v = \sqrt{\frac{GM_e}{r}}$$

$$\sqrt{\frac{(6 / 67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2})(5 / 98 \times 10^{24} \text{ kg})}{(9200 \times 10^3 \text{ m})}} = 6 / 58 \times 10^3 \text{ m/s}$$

(ت)

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2(3 / 14)(9200 \times 10^3 \text{ m})}{6 / 58 \times 10^3 \text{ m/s}} = 878 \text{ s} = 8 / 78 \times 10^2 \text{ s}$$

۶۰

۲۲

$$\frac{W_2}{W_1} = \frac{GM_e m}{(R_e + h)^2} = \left(\frac{R_e}{R_e + h}\right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{R_e}{R_e + h}\right)^2 \rightarrow \sqrt{2} R_e = R_e + h \rightarrow h = (\sqrt{2} - 1) R_e \approx 2651 \text{ km}$$

(الف)

$$\frac{W_2}{W_1} = \left(\frac{R_e}{R_e + h}\right)^2 \Rightarrow \frac{W_2}{(250 \text{ kg})(9 / 8 \text{ N/kg})} = \left(\frac{6400 \text{ km}}{6400 \text{ km} + 36000 \text{ km}}\right)^2 \Rightarrow W_2 = 55 / 8 \text{ N}$$

(ب)

۲۳

$$g_s = G \frac{M_s}{r^2} = (6 / 67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}) \frac{(1 / 99 \times 10^{30} \text{ kg})}{(149 / 6 \times 10^9 \text{ m})^2} = 5 / 9 \times 10^{-3} \text{ N/kg}$$

(الف)

همان گونه که ملاحظه می‌شود این مقدار در مقابل شتاب گرانش زمین در سطح آن بسیار ناچیز است.

$$g_m = G \frac{M_m}{r^2} = (6 / 67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}) \frac{(7 / 36 \times 10^{22} \text{ kg})}{(3 / 84 \times 10^8 \text{ m})^2} = 3 / 33 \times 10^{-5} \text{ N/kg}$$

(ب)

همان گونه که ملاحظه می‌شود این مقدار در مقابل شتاب گرانش زمین در سطح آن بسیار ناچیز است.



پهروز، ۳۳

۳۳. الف) شتاب گرانشی ناشی از خورشید در سطح زمین چقدر است؟

ب) شتاب گرانشی ناشی از ماه در سطح زمین چقدر است؟

۳۴. الف) سفینه‌ای به جرم  $2 \times 10^4 \text{ kg}$  در وسط فاصله بین

زمین و ماه قرار دارد. نیروی گرانشی خالصی را که از طرف

زمین و ماه به این سفینه در این مکان وارد می‌شود به دست آورید

(از داده‌های مسئله‌های قبل استفاده کنید).

ب) در چه فاصله‌ای از زمین، نیروی گرانشی ماه و زمین بر

سفینه، یکدیگر را خنثی می‌کنند؟

۳۵. الف) در چه ارتفاعی از سطح زمین، وزن یک شخص به

نصف مقدار خود در سطح زمین می‌رسد؟

ب) اگر جرم ماهواره‌ای  $250 \text{ kg}$  باشد، وزن آن در ارتفاع

$26000$  کیلومتری از سطح زمین چقدر خواهد شد؟

۳۲. الف) نیروی گرانشی

ب) دو جسم در فاصله  $200 \text{ m}$  از هم، یکدیگر را با نیروی

گرانشی کوچک  $10^{-10} \text{ N}$  جذب می‌کنند. اگر جرم یکی

از اجسام  $500 \text{ kg}$  باشد، جرم جسم دیگر چقدر است؟

۳۱. ماهواره‌ای به جرم  $600 \text{ kg}$  در مدار ی دایره‌ای به ارتفاع


$28000$  کیلومتر از سطح زمین، به دور آن می‌چرخد.

الف) نیروی گرانشی وارده بر ماهواره

ب) شتاب ماهواره

ج) دوره تناوب ماهواره را در این ارتفاع به دست آورید.

۳۰. الف)  $r = 4200 \text{ km}$  و  $M = 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}$



(الف)

$$F_{net} = F_{\text{زمین}} - F_{\text{ماه}} = G \frac{M_m m}{r^2} - G \frac{M_e m}{r^2} = G \frac{m}{r^2} (M_e - M_m)$$

$$= (6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{kg}^2}) \frac{(3/0 \times 10^4 \text{ kg})}{(3.84 \times 10^8 \text{ m})^2} (5.98 \times 10^{24} \text{ kg} - 7.36 \times 10^{22} \text{ kg})$$

$$= 7.36 \times 10^{22} \text{ kg} = 3/2 \times 10^2 \text{ N}$$

(ب)

$$F_{\text{زمین}} = F_{\text{ماه}} \rightarrow G \frac{M_e m}{x^2} = G \frac{M_m m}{(r-x)^2} \rightarrow \frac{M_e}{x^2} = \frac{M_m}{(r-x)^2} \rightarrow \frac{x^2}{(r-x)^2} = \frac{M_e}{M_m}$$


$$\frac{x}{3.84 \times 10^8 \text{ km} - x} = \sqrt{\frac{M_e}{M_m}} = \sqrt{\frac{5.98 \times 10^{24} \text{ kg}}{7.36 \times 10^{22} \text{ kg}}} = 9/0.1$$

$$x = \frac{9/0.1 \times 3.84 \times 10^8 \text{ km}}{10} = 3.46 \times 10^8 \text{ km}$$

## راهنمای پاسخ‌یابی پرسشی‌ها و مسئله‌های فصل ۳

### پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۳

**۱-۳ و ۲-۳ نیوسان دوره‌ای و حرکت هماهنگ ساده**  
 ۱. یک وزنه ۲۰ N را از انتهای یک فنر قائم می‌آوریم. فنر ۲۰ cm کشیده می‌شود. سپس این فنر را در حالی که به یک وزنه ۵۰ N متصل است روی میز بدون اصطکاک به نوسان درمی‌آوریم. دوره تناوب این نوسان چقدر است؟  
 ۲. هرگاه جسی به جرم ۳۳ به فنری متصل شود و به نوسان درآید، با دوره تناوب ۲/۱۵ نوسان می‌کند. اگر جرم این جسم ۲/۱۰ kg افزایش یابد، دوره تناوب ۲/۱۵ می‌شود. مقدار  $m$  چقدر است؟  
 ۳. جرم خودروی همراه با سرنشینان آن ۱۶۰۰ kg است. این خودرو روی چهار فنر با ثابت  $۲۰۰ \times ۱۰^۴ \text{ N/m}$  قرار شده است. دوره تناوب، بسامد و بسامد زاویه‌ای ارتعاش خودرو وقتی از جاده‌ای می‌گذرد چقدر است؟ فرض کنید وزن خودرو به‌طور یکساخت روی فنرهای چهارجریج توزیع شده است.  
 ۴. دامنه نوسان یک حرکت هماهنگ ساده  $۳ \times ۱۰^{-۲} \text{ m}$  و بسامد آن  $۵۰ \text{ Hz}$  هر ثانیه است. معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید و نمودار مکان-زمان آن را در یک دوره رسم کنید.  
 ۵. نمودار مکان-زمان نوسانگری مطابق شکل زیر است: (الف) معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید. (ب) مقدار  $x$  را بدست آورید. (ج) با افزایش شتاب نوسانگر را در لحظه  $t$  محاسبه کنید.



**۲-۴ تشدید**  
 ۱. هر فرد معمولاً با عرض اندک بدنتش به جیب و راسته، راه می‌رود و بدین ترتیب نیروهای کوچکی به زمین زیر پایش وارد می‌کند. این نیروها بسامدی در حدود ۱-۵ Hz دارند. لرزش تشدید پل هوایی ملبورن در آغاز طغرای جدید را به عبور منظر گروهی از افراد از این پل ربط داده‌اند. چگونه ممکن است نوسان‌های بدن این افراد موجب تشدید لرزشی شده باشد؟



Millennium bridge  
۵۵

۱ از رابطه  $T = 2\pi\sqrt{m/k}$  استفاده می‌کنیم. در این رابطه به جای  $m$  از  $W/g$  استفاده می‌کنیم که در آن  $W$  وزن جسم است. همچنین ثابت فنر را از قانون هوک به دست می‌آوریم

$$k = \frac{|F|}{x} = \frac{20 \text{ N}}{0.02 \text{ m}} = 1000 \text{ N/m}$$

در نتیجه :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{W/g}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{(50/9.8 \text{ N/kg})}{1000 \text{ N/m}}} = 0.44 \text{ s}$$

۲ از رابطه  $T = 2\pi\sqrt{m/k}$  استفاده می‌کنیم. بنابراین داریم :

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}} = \sqrt{\frac{(m + 20)}{m}} = \frac{3}{2}$$

از آنجا  $m = ۱/۶ \text{ kg}$  به دست می‌آید.

۳ چون وزن (و در نتیجه جرم) به‌طور یکنواخت توزیع شده است، روی هر فنر  $\frac{1}{4}$  جرم کل قرار می‌گیرد. بنابراین  $m = M/4 = 400 \text{ kg}$  و در نتیجه :

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{400 \text{ kg}}{2000 \times 10^4 \text{ N/m}}} = 0.888 \text{ s}$$

و از آنجا

$$f = \frac{1}{T} = 1/0.888 \text{ s}^{-1} \approx 1.12 \text{ Hz}$$

و

$$\omega = 2\pi f = 2\pi(1.12 \text{ s}^{-1}) = 7.07 \text{ rad/s}$$

۴ معادله حرکت نوسانگر با رابطه  $x = A \cos \omega t$  داده می‌شود. که در اینجا

$$A = 3.0 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad \omega = 2\pi f = 2\pi(5/0.5) = 10\pi \text{ rad/s}$$


در نتیجه

$$x = (3.0 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(10\pi t)$$

برای رسم نمودار مکان-زمان خوب است دوره تناوب را محاسبه کنیم :

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5/0.5} = 0.2 \text{ s}$$

بنابراین شکلی شبیه زیر خواهیم داشت



۵ الف) معادله حرکت نوسانگر با رابطه  $x = A \cos \omega t$  داده می شود. اگر در شکل دقت کنیم داریم:

$$\frac{\Delta T}{4} = 0.05 \text{ s} \Rightarrow T = 0.2 \text{ s}$$

در نتیجه

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.2 \text{ s}} = 10\pi \text{ rad/s}$$

بنابراین معادله حرکت نوسانگر چنین می شود

ب) در زمان  $t_1$ ،  $x = A/2$  است و در نتیجه

در نتیجه




Millennium bridge

۸۵

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۳

- ۱-۳ و ۳-۳ نوسان دوره‌ای و حرکت هماهنگ ساده  
۱. یک وزنه ۲۰ N را از انتهای یک فن قائم می‌آویزم. فن ۲۰ cm کشیده می‌شود. سپس این فن را در حالی که به یک وزنه ۵۰ N متصل است روی میز بدون اصطکاک به نوسان درمی‌آوریم. دوره تناوب این نوسان چقدر است؟  
۲. هرگاه جرم به جرم ۱۱۱ به فنری متصل شود و به نوسان درآید، با دوره تناوب ۲۰۰ s نوسان می‌کند. اگر جرم این جسم ۲۰ kg افزایش یابد، دوره تناوب ۲۰۰ s می‌شود. مقدار  $k$  چقدر است؟  
۳. جرم خودروی همره با سرشتیان آن ۱۶۰۰ kg است. این خودرو روی چهار فنر با ثابت  $2.0 \times 10^7 \text{ N/m}$  سوار شده است. دوره تناوب، بسامد، و بسامد زاویه‌ای ارتعاش خودرو وقتی از جاده‌ای می‌گذرد چقدر است؟ فرض کنید وزن خودرو به طور یکواخت روی فنرهای چهارچرخ توزیع شده است.
- ۴-۳ دامنه نوسان یک حرکت هماهنگ ساده  $3.0 \times 10^{-2} \text{ m}$  و بسامد آن  $50 \text{ Hz}$  هرتز است. معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید و نمودار مکان-زمان آن را در یک دوره رسم کنید.
- ۵-۳ نمودار مکان-زمان نوسانگری مطابق شکل زیر است: الف) معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید. ب) مقدار  $k$  را بدست آورید. ب) با اندازه ثابت نوسانگر را در لحظه  $t_1$  محاسبه کنید.



- ۶-۳ تقارن در حرکت هماهنگ ساده  
۱. هر فرد معمولاً با چرخش کمک هتس به چپ و راست، راه می‌رود و بدون ترتیب نیروهای کوچک و زمین نرم تابش وارد می‌کند. این نیروها بسامدی در حدود ۱-۲ Hz دارند. ارتعاش شدید بی‌هرای ملبیوم در آغاز هزاره جدید را در عبور مطلق گروهی از افراد از این بی‌طرح داده‌اند. چگونه ممکن است نوسان‌های چنین این افراد موجب چنین ارتعاشی شده باشد؟



Millennium bridge

۸۵

$$x = A \cos \omega t$$

$$\frac{A}{2} = A \cos \omega t_1$$

$$\cos \omega t_1 = \frac{1}{2}$$

چون  $t_1$  نخستین زمانی است که  $x = A/2$  است، در رابطه بالا  $\omega t_1 = \pi/3$  را برابر  $\pi/3$  می‌گذاریم. در نتیجه  $t_1 = \frac{1}{10} \text{ s}$  می‌شود.

پ) با فرض آنکه نوسانگر این مسئله، دستگاه جرم-فنر باشد، از قانون هوک به صورت  $|F| = k|x|$  استفاده می‌کنیم. بنابراین داریم:

$$m|a| = k|x|$$

و در نتیجه

$$|a| = \frac{k}{m}|x| = \omega^2|x| = (\omega t_1)^2|x|$$

که در آن از  $\omega = \sqrt{k/m}$  استفاده کردیم.

بنابراین باید  $x$  را در زمان  $t_1$  محاسبه کنیم، که البته از روی شکل می‌دانیم برابر با  $2/0 \text{ cm}$  است. اگر  $x$  را در لحظه  $t_1$  نداشته‌ایم، باید از محاسبه‌ای نظیر محاسبه زیر آن را به دست می‌آوردیم:

$$x(t_1) = A \cos \omega t_1$$

$$= (0.04 \text{ m}) \cos \left( \omega \frac{1}{10} \right) = (0.04 \text{ m}) \cos \frac{\pi}{3}$$

$$= 0.02 \text{ m} = 2/0 \text{ cm}$$

در نتیجه

$$|a| = (\omega t_1)^2 (0.02 \text{ m}) = 4/93 \text{ m/s}^2 \approx 4/9 \text{ m/s}^2$$

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} (74 \text{ N/m}) (0.08 \text{ m})^2 = 0.2368 \text{ J} \approx 0.24 \text{ J}$$

۶ الف) انرژی کل نوسانگر برابر است با

ب)  $E = K + U$  است و بنابراین

$$K = E - U = 0.2368 \text{ J} - 0.18 \text{ J} = 0.0568 \text{ J}$$

الف) بدیهی است دامنه نوسان  $A = 9 \text{ cm}$  است و برای انرژی جنبشی

بیشینه داریم:

$$K_{\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2 = \frac{1}{2} k A^2$$

بنابراین تندی بیشینه  $v_{\max}$  چنین می شود

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{k}{m}} A = \sqrt{\frac{6 \times 10^3 \text{ N/m}}{1 \text{ kg}}} (0.09 \text{ m}) = 2.2 \text{ m/s}$$

ب) از  $E = K + U$  استفاده می کنیم.  $E = \frac{1}{2} k A^2$  قرار می دهیم و از آنجا

درمی یابیم:

$$U = E - K = \frac{1}{2} k A^2 - \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} (6 \times 10^3 \text{ N/m}) (0.09 \text{ m})^2 - \frac{1}{2} (1 \text{ kg}) (1.6 \text{ m/s})^2 = 24.3 \text{ J} - 0.8 \text{ J} = 23.5 \text{ J}$$

الف) وقتی  $x = 0$  است، یعنی در زمانی که نوسانگر از نقطه تعادل می گذرد،

تندی آن بیشینه است.

$$A \cos \omega t = 0, \quad A \neq 0 \Rightarrow \omega t = (2n+1) \frac{\pi}{2}$$

$$\omega t = \pi/2 \Rightarrow 2 \cdot \pi t = \frac{\pi}{2}$$

چون نخستین بار را خواسته است،  $n = 0$  می گذاریم:

و از آنجا  $t = \frac{1}{4} \text{ s}$  به دست می آید. (این نتیجه را می توانستیم به طور ساده ای با رسم یک نمودار کسینوسی نیز به دست آوریم، به طوری که در لحظه  $t = T/4$  در می یابیم برای نخستین بار  $x = 0$  می شود.)

ب) تندی نوسانگر وقتی صفر است که  $x = -A$  باشد که این منظر با زمان  $t = \frac{2}{\omega} \text{ s}$  است. این را می شود به طور ریاضی نیز نشان داد:

$$A \cos \omega t = -A \Rightarrow \cos \omega t = -1 \Rightarrow \omega t = n\pi$$

بنابراین برای نخستین بار  $\omega t = \pi$  و از آنجا  $t = \frac{2}{\omega} \text{ s}$  می شود.

پ) در  $K = 2U = 2K = 2U$  قرار دهیم. در نتیجه  $E = 2U = 2K$  می شود. از طرفی  $E = K_{\max} = \frac{1}{2} m v_{\max}^2$  است.

بنابراین

$$K = \frac{E}{2} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} m v_{\max}^2 \right)$$

$$\frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{4} m v_{\max}^2 \Rightarrow |v| = \frac{1}{\sqrt{2}} v_{\max}$$


از طرفی  $v_{\max} = A\omega$  است. بنابراین

$$|v| = \frac{1}{\sqrt{2}} A\omega = \frac{1}{\sqrt{2}} (0.05 \text{ m}) (2 \cdot \pi)$$

$$= 2.2 \text{ m/s}$$

پستی ها و مسئله های فصل ۳

- ۳-۱. یک وزنه  $2 \text{ N}$  را از انتهای یک فنر قائم می آوریم. فنر  $2 \text{ cm}$  کشیده می شود. سپس این فنر را در حالی که به یک وزنه  $5 \text{ N}$  متصل است روی میز بدون اصطکاک به نوسان درمی آوریم. دوره تناوب این نوسان چقدر است؟
- ۳-۲. هرگاه جسی به جرم  $m$  به فنری متصل شود و به نوسان درآید، با دوره تناوب  $T_1$  نوسان می کند. اگر جرم این جسم  $4k$  افزایش یابد، دوره تناوب  $T_2$  می شود. مقدار  $k$  چقدر است؟
- ۳-۳. جرم خودروی همراه با سرنشینان آن  $1600 \text{ kg}$  است. این خودرو روی چهار فنر با ثابت  $20000 \text{ N/m}$  قرار داده است. دوره تناوب، سیاهمه، و سیاهمه زاویه ای از انحراف خودرو وقتی از جاده ای می گذرد چقدر است؟ فرض کنید وزن خودرو به طور یکواخت روی فنرهای چهارچرخ توزیع شده است.
- ۳-۴. دامنه نوسان یک حرکت هماهنگ ساده  $3 \times 10^{-2} \text{ m}$  و بسامد آن  $500 \text{ Hz}$  است. معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید و نمودار مکان-زمان آن را در یک دوره رسم کنید.
- ۳-۵. نمودار مکان-زمان نوسانگری مطابق شکل زیر است. الف) معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید. ب) مقدار  $A$  را بدست آورید. ج) با اندازه شتاب نوسانگر در لحظه  $t$  محاسبه کنید.



- ۳-۶. هر فرد معمولاً با چرخش انگشتش به چپ و راست، راه می رود و بدن نزدیک نوبه ای کوچک و زمین در پایش وارد می کند. این فرکانس بسامدی در حدود  $2 \text{ Hz}$  دارد. لرزش شدید بی هوای ممتد در آغاز هزاره جدید را به عبور منظر گروهی از افراد از این بی ربط داده اند. چگونه ممکن است نوسان های بین این افراد موجب چنین لرزشی شده باشد؟



Millenium bridge  
۸۵

پوشش‌ها و مسئله‌های فصل ۳

۱۷. جسی به جرم  $1/4 \text{ kg}$  به تری افقی با ثابت  $9/8 \text{ N/cm}$  متصل است. فتر به اندازه  $1 \text{ cm}$  فشرده و سپس رها می‌شود و جسم روی سطح افقی شروع به نوسان می‌کند. با چسبندگی از اصطکاک (الف) دامنه نوسان و تندی بیشینه جسم جفتی است؟ (ب) وقتی تندی جسم  $1/8 \text{ m/s}$  است، انرژی پتانسیل کشسانی آن جفتی است؟
۱۸. معادله حرکت هماهنگ ساده یک نوسانگر در SI به صورت  $x = 0.10 \sin(2\pi t)$  است. (الف) در چه زمانی، پس از لحظه صفر، برای نخستین بار تندی نوسانگر به بیشترین مقدار خود می‌رسد؟ (ب) در چه زمانی، پس از لحظه صفر، برای نخستین بار تندی نوسانگر به صفر می‌رسد؟ (ج) تندی نوسانگر جفتی باشد تا انرژی جنبشی نوسانگر برابر با انرژی پتانسیل آن شود؟
۱۹. (الف) سائینی آونگدار (آ آونگ ساده) در تهران تنظیم شده است. اگر این ساعت به منطقه‌ای در استوا برده شود، عقب می‌افتد یا جلو؟ مقدار این عقب یا جلوفراوان در یک ساعته روز جفتی است؟ (ب)  $g = 9.8 \text{ m/s}^2$  و  $g = 9.81 \text{ m/s}^2$  در استوا و قطب است؟ (ج) با تغییر نسبت  $g$  با افزایش  $g$ ، یک ساعت آونگدار جلو می‌افتد یا عقب؟

۲۰. تندی

۲۰. هر فرد معمولاً با چرخش کمک هتس به چپ و راست، راه می‌رود و بدن تندی نبردهای کوچکی به زمین زیر پایش وارد می‌کند. این نبردها بسامدی در حدود  $2 \text{ Hz}$  دارند. ارزش تندی پل های مسیلمبر در آغاز هزاره جدید را به عبور گروهی از افراد از این پل نظر داشته‌اند. چگونه ممکن است نوسان‌های پل این افراد موجب چنین لرزشی شده باشد؟



Millennium bridge ۸۵

- ۳۱ و ۳۲. نوسان دوره‌ای و حرکت هماهنگ ساده
۳۱. یک وزنه  $2 \text{ N}$  را از انتهای یک فن قاش می‌آویزم. فتر  $2 \text{ cm}$  کشیده می‌شود. سپس این فن را در حالی که به یک وزنه  $5 \text{ N}$  متصل است روی میز بدون اصطکاک به نوسان درمی‌آوریم. دورتاریب این نوسان جفتی است؟
۳۲. هرگاه جسی به جرم  $1 \text{ kg}$  به تری متصل شود و به نوسان درآید، با دوره تاروب  $2 \text{ s}$  نوسان می‌کند. اگر جرم این جسم  $2 \text{ kg}$  افزایش یابد، دوره تاروب  $2 \text{ s}$  می‌شود. مقدار  $m$  جفتی است؟ جرم خودروی هیمره با سرشتیان آن  $1600 \text{ kg}$  است. این خودرو روی چهار فن با ثابت  $2.0 \times 10^8 \text{ N/m}$  سوار شده است. دوره تاروب، بسامد، و بسامد زاویه‌ای ارتعاش خودرو وقتی از جاهای می‌گذرد جفتی است؟ فرض کنید وزن خودرو به طور یکواخت روی چهارفن توزیع شده است.
۳۳. دامنه نوسان یک حرکت هماهنگ ساده  $3 \text{ cm}$  است. و بسامد آن  $50 \text{ Hz}$  هرتز است. معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید و نمودار مکان-زمان آن را در یک دوره رسم کنید. (الف) معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید. (ب) مقدار  $x$  را بدست آورید. (ج) با اندازه‌گیری نوسانگر را در لحظه  $t=0$  محاسبه کنید.



۳۴. انرژی در حرکت هماهنگ ساده
۳۴. دامنه نوسان وزنه‌ای که به یک فن با ثابت  $27 \text{ N/m}$  متصل است و در راستای افقی نوسان می‌کند، برابر با  $1 \text{ cm}$  است. اگر انرژی پتانسیل این نوسانگر در نقطه‌ای از مسیر نوسان  $1/8$  انرژی کل آن در آن نقطه باشد، انرژی پتانسیل آن در آن مکان جفتی است؟ (از نبردهای افقی جنبشی‌تندی خود.)

۹ الف) زمانی که ساعت نشان می‌دهد متناسب با عکس دوره نوسان آونگ است. با استفاده از رابطه  $T = 2\pi\sqrt{L/g}$  درمی‌یابیم که چون نهران  $g < g_0$  است، بنابراین ساعت در استوا عقب می‌افتد. میزان این عقب‌افتادگی را می‌توانیم محاسبه کنیم. چون  $t_1/t_2 = T_1/T_2$  است، داریم

$$t_2 - t_1 = (\sqrt{g_2/g_1} - 1)t_1$$

که اگر  $t_1 = 86400 \text{ s}$  قرار دهیم به  $|\Delta t| = 88/25 \text{ s}$  می‌رسیم.

ب) با افزایش دما، طول آونگ زیاد می‌شود و بنا به رابطه  $T = 2\pi\sqrt{L/g}$  درمی‌یابیم که دوره تناوب زیاد و بسامد کم شده است و بنابراین ساعت عقب می‌افتد.

۱۰ یقیناً بسامد ناشی از چرخش (تاب خوردن) بدن هر فرد تقریباً برابر بسامدی بود که پل با آن می‌توانست به چپ و راست تاب بخورد (بسامد طبیعی پل) و همین باعث پدیده تشدید پل شد. ولی تا هنگامی که راه رفتن عابران به طور منظم رخ نداده بود، لرزش پل آنقدر شدید نبود که به حادثه‌ای بیانجامد. این نوسان‌ها سبب شد که عابران برای حفظ تعادل خود گام‌های خود را با نوسان‌های پل هم‌گام کنند که این موجب شدیدتر شدن لرزش پل و وقوع این حادثه شد.

۱۱ با به نوسان درآمدن آونگ  $X$ ، آونگ  $B$  با دامنه بزرگی به نوسان درمی‌آید. البته سایر آونگ‌ها نیز ممکن است به نوسان درآیند اما دامنه نوسان آنها کوچک است. در حالی که آونگ  $B$  که دوره نوسان (و در نتیجه بسامد) آن با آونگ  $X$  یکسان است، با دامنه بزرگی به نوسان ادامه می‌دهد. به عبارتی، به آونگ‌های دیگر هم انرژی منتقل می‌شود ولی بیشترین انرژی در حالت تشدید به نوسانگر  $B$  انتقال می‌یابد.

۱۲ الف) با افزایش بسامد نوسان‌ساز، بدیهی است که بسامد موج حاصل نیز افزایش می‌یابد. ولی تندی موج تغییر نمی‌کند زیرا ویژگی‌های محیط تغییری نکرده است. با توجه به رابطه  $\lambda = v/f$  درمی‌یابیم طول موج کم می‌شود. ب) چون  $v = \sqrt{F/\mu}$  است، با افزایش کشش ریسمان تندی موج زیاد می‌شود. ولی چون بسامد نوسان‌ساز تغییر نکرده است، بسامد موج نیز تغییری نمی‌کند و طبق رابطه  $\lambda = v/f$  طول موج زیاد می‌شود.

۱۳ الف) وقتی موج به سمت چپ می‌رود، پس از گذشت زمان  $T/4$  دره نشان داده شده در شکل به اندازه  $\lambda/4$  به سمت چپ می‌رود و این به معنی آن است که  $M$  رو به پایین حرکت کرده است. دامنه و طول موج نیز با نمادهای  $A$  و  $\lambda$  در شکل نشان داده شده‌اند.

۱۱. در نمودار جاهای - مکان موج عرضی شکل زیر چشمه  $10 \text{ Hz}$  است. طول موج، دامنه، تندی و دوره تناوب موج جفتی است؟

۱۲. شکل زیر موجی عرضی در یک ریسمان را نشان می‌دهد که با تندی  $1 \text{ m/s}$  به سمت راست حرکت می‌کند. درحالی که تندی ذره نشان داده شده ریسمان  $3 \text{ cm}$  است. آیا این دو تندی با هم برابرند؟ توضیح دهید.

۱۳. شکل زیر یک موج سینوسی را در لحظه‌ای از زمان نشان می‌دهد که در جهت محور  $x$  در طول ریسمان کشیده شده‌ای حرکت می‌کند. چهار جزء از این ریسمان روی شکل نشان داده شده‌اند. در این لحظه هر یک از این چهار جزء  $\lambda/4$  می‌روند یا  $\lambda/2$  یا  $3\lambda/4$  یا  $5\lambda/4$  است؟


۱۴. سیمی با چگالی  $7/8 \text{ g/cm}^3$  و سطح مقطع  $0.5 \text{ mm}^2$  بین دو نقطه با تری  $156 \text{ N}$  کشیده شده است. تندی انتشار موج عرضی را در این سیم محاسبه کنید.

۱۵. یک نوسان‌ساز موج‌های دورهای در یک ریسمان کشیده ایجاد می‌کند. (الف) با افزایش بسامد نوسان‌ساز کدام یک از کمیت‌های زیر تغییر نمی‌کند؟ بسامد موج، طول موج، کشش ریسمان را افزایش دهید. هر یک از کمیت‌های زیر چه تغییری می‌کند؟ بسامد موج، تندی موج، طول موج، کشش ریسمان کشیده شده را نشان می‌دهد. موج به سمت چپ حرکت می‌کند. (الف) با رسم این موج در زمان  $T/2$  بعد نشان دهید جزء  $M$  ریسمان در این مدت در چه جهتی حرکت کرده است. همچنین روی این موج دامنه موج و طول موج را نشان دهید. (ب) اگر طول موج  $50 \text{ cm}$  است و تندی موج  $1 \text{ cm/s}$  باشد، بسامد موج را بدست آورید. (ج) همین کمیت موج در مدت  $T/2$  چه مسافتی را پیموده است؟


۱۶. جهت حرکت موج

۸۶


۱۱۰. در نمودار جابه‌جایی - مکان موج عرضی شکل زیر  
 $\Delta y = 15^\circ \text{ cm}$  و  $\Delta x = 4^\circ \text{ cm}$  است. اگر بسامد نوسان‌های  
 چشمه  $100 \text{ Hz}$  باشد، طول موج، دامنه، تندی و دوره تناوب  
 موج چقدر است؟



۱۱۱. شکل زیر موجی عرضی در یک ریسمان را نشان می‌دهد که  
 با تندی  $100 \text{ Hz}$  به سمت راست حرکت می‌کند. در حالی که تندی ذره  
 نشان داده شده ریسمان  $10 \text{ cm/s}$  است. آیا این دو تندی با هم برابرند؟  
 توضیح دهید.




۱۱۲. شکل زیر یک موج سینوسی را در لحظه‌ای از زمان نشان  
 می‌دهد که در جهت محور  $x$  در طول ریسمان کشیده شده‌ای  
 حرکت می‌کند. چهار جزء از این ریسمان روی شکل نشان داده  
 شده‌اند. در این لحظه هر یک از این چهار جزء بالا می‌روند یا  
 پایین؟





۱۱۳. سیمی با چگالی  $7.8 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$  و سطح مقطع  $0.5 \text{ cm}^2$   
 بین دو نقطه با نیروی  $156 \text{ N}$  کشیده شده است. تندی انتشار  
 موج عرضی را در این سیم محاسبه کنید.

۱۱۴. معادله شکل جده آونگ را از سیمی آویخته‌ایم. توضیح دهید به چه  
 نوسان درآوردن آونگ  $\Delta x$ ، آونگ‌های دیگر چگونه نوسان می‌کنند؟



۱۱۵ و ۱۱۶. موج  $P$  و انواع آن و مشخصه‌های موج

۱۱۵. یک نوسان‌ساز موج‌های دورهای در یک ریسمان کشیده  
 ایجاد می‌کند.  
 ابتدا با افزایش بسامد نوسان‌ساز گذاریم از کیت‌های زیر تغییر  
 نمی‌کند: بسامد موج، تندی موج، طول موج.  
 ب) حال اگر به جای افزایش بسامد، کشش ریسمان را افزایش  
 دهیم، هر یک از کیت‌های زیر چه تغییری می‌کند: بسامد موج،  
 تندی موج، طول موج.  
 ۱۱۶. شکل زیر یک تصویر لحظه‌ای از موجی عرضی در یک  
 ریسمان کشیده شده را نشان می‌دهد. موج به سمت چپ حرکت  
 می‌کند.  
 ابتدا با رسم این موج در زمان  $T/4$  بعد، نشان دهید جزء  $M$   
 ریسمان در این مدت در چه جهتی حرکت کرده است. همچنین  
 روی این موج، دامنه موج و طول موج را نشان دهید.  
 ب) اگر طول موج  $5^\circ \text{ cm}$  و تندی موج  $10 \text{ cm/s}$  باشد، بسامد موج  
 را بدست آورید.  
 ب) همین کیت موج در مدت  $T/4$  چه مسافتی را پیموده است؟



ب) بسامد موج برابر است با

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{10 \text{ cm/s}}{5 \text{ cm}} = 2 \text{ s}^{-1} = 2 \text{ Hz}$$

پ) از رابطه  $x = vt$  استفاده می‌کنیم:

$$x = vt = v \left( \frac{T}{4} \right) = v \left( \frac{1}{4f} \right) = (10 \text{ cm/s}) \left( \frac{1}{\lambda \cdot 2 \text{ s}^{-1}} \right) = 1/25 \text{ cm} \approx 1/2 \text{ cm}$$

که این همان معادل  $\lambda/4 = (5^\circ \text{ cm})/4 = 1/25 \text{ cm}$  است.

۱۱۴. از روی شکل درمی‌یابیم طول موج  $\lambda = \Delta x = 4^\circ \text{ cm}$  و دامنه  $A = \Delta y = 15^\circ \text{ cm}$  است. با استفاده از رابطه  $v = \lambda f$  می‌توانیم  
 تندی انتشار موج را به دست آوریم:

$$v = \lambda f = (4^\circ \text{ cm}) (100 \text{ s}^{-1}) = 400 \text{ cm/s} = 4 \text{ m/s}$$


دوره تناوب نیز وارون بسامد است:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100 \text{ s}^{-1}} = 0.01 \text{ s}$$


۱۱۵. خیر؛ این دو تندی متفاوت‌اند. تندی موج  $v$  همان تندی انتشار موج است که با مشخصه‌های ریسمان تعیین می‌شود و همیشه مقدار  
 ثابتی در هر جای ریسمان دارد. ولی هر ذره روی ریسمان به طور هماهنگ ساده‌ای با نوسان چشمه حرکت می‌کند. بنابراین هر ذره  
 ریسمان تندی ذره  $v$  را دارد که با زمان تغییر می‌کند. تندی ذره وقتی از موضع تعادل می‌گذرد، بیشینه و در نقطه‌های اوج و حضیض  
 صفر است. در حالی که تندی موج همواره مقدار ثابتی دارد که از مشخصه‌های ریسمان تعیین می‌شود.

۱۱۶. با استدلالی مشابه آنچه در حل مسئله ۱۱۳ ارائه کردیم (و نیز با واریسی شکل ۱۱۳-۱۹ کتاب) درمی‌یابیم  $a$  و  $b$  رو به بالا، و  $c$  و  $d$  رو  
 به پایین حرکت می‌کنند.


(پرسش جالب دیگری هم که می‌شد مطرح کرد در مورد جابه‌جایی یک جزء ریسمان برحسب زمان، مطابق شکل زیر، است.)




۱۳. مطابق شکل چند آونگ را از رسیس آویخته‌اند. توضیح دهید با چه نوسان درآوردن آونگ X، آونگ‌های دیگر چگونه نوسان می‌کنند؟




۱۴. موج ۶۰۰ Hz، طول موج ۱۰۰ cm، دامنه ۱۰۰ Hz، تندی و دورا تناوب چیست؟




۱۵. شکل زیر موجی عرضی در یک ریسمان را نشان می‌دهد که با تندی ۲۰۰ Hz به سمت راست حرکت می‌کند. در حالی که تندی ذره نشان داده شده ریسمان ۱۰ است. آیا این دو تندی با هم برابرند؟ توضیح دهید.



۱۶. شکل زیر یک موج سینوسی را در لحظه‌ای از زمان نشان می‌دهد که در جهت محور x در طول ریسمان کشیده شده‌ای حرکت می‌کند. چهار جزء از این ریسمان روی شکل نشان داده شده‌اند. در این لحظه هر یک از این چهار جزء بالا می‌روند یا پایین؟



۱۷. سیمی با چگالی ۷۸۰۰ kg/cm<sup>۳</sup> و سطح مقطع ۰.۵۰ mm<sup>۲</sup> موج عرضی را در این سیم محاسبه کنید.



در این صورت در شکل صفحه قبل، در زمان‌های  $e$  و  $f$  جزء ریسمان رو به پایین و در لحظه‌های  $g$  و  $h$  جزء ریسمان حرکت می‌کند.

۱۷ باید از رابطه  $v = \sqrt{F/\mu}$  استفاده کنیم. ولی توجه کنید که  $\mu$  چگالی خطی جرم است و در اینجا چگالی حجمی داده شده است. اگر چگالی حجمی داده شده را در مساحت مقطع سیم ضرب کنیم، چگالی خطی جرم به دست می‌آید:

$$\mu = \rho A = (7000 \text{ kg/cm}^3)(0.5 \times 10^{-2} \text{ cm}^2) = 0.175 \text{ kg/cm} = 17.5 \text{ kg/m}$$

از آنجا تندی انتشار موج چنین می‌شود:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{156 \text{ N}}{17.5 \text{ kg/m}}} = 2.96 \text{ m/s} = 2.96 \times 10^3 \text{ cm/s}$$

۱۸ در واقع این شکل بر اساس افزایش طول موج (یا کاهش بسامد) از چپ به راست مرتب شده است و بنابراین در مقایسه با شکل ۳-۲۲ کتاب که طیف امواج الکترومغناطیسی را نشان می‌دهد درمی‌یابیم  $P, Q, R, S$  و  $T$  به ترتیب معادل ناحیه‌های فرابنفش، مرئی، فروسرخ، میکروموج و امواج رادیویی است.

۱۹ از قاعده دست راست برای تعیین جهت میدان مغناطیسی استفاده می‌کنیم (شکل ۳-۲۱ کتاب). جهت انتقال انرژی همان جهت انتشار موج و در سوی  $-\hat{k}$  است. سوی میدان الکتریکی نیز در جهت  $\hat{j} + \hat{k}$  است. بنابراین جهت میدان مغناطیسی در سوی  $\hat{i} + \hat{j}$  (سوی مثبت محور  $z$ ) می‌شود.

۲۰ الف) از رابطه  $f = c/\lambda$  استفاده می‌کنیم:

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{6 \times 10^{-7} \text{ m}} = 5 \times 10^{14} \text{ Hz} = 5 \times 10^{14} \times 10^3 \text{ kHz} = 5 \times 10^{17} \text{ kHz}$$

ب) طول موج در هوا چنین می‌شود:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{5 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}} = 6 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.6 \text{ nm}$$

و در آب

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{2 \times 10^8 \text{ m/s}}{5 \times 10^{17} \text{ s}^{-1}} = 4 \times 10^{-10} \text{ m} = 0.4 \text{ nm}$$

شکل ۳۱-۱: ریسمان و موج

که در سطح مسطح منتشر می‌شوند. و دو نوع اند: امواج عرضی یا تندی  $v_y = 5 \text{ m/s}$  و امواج طولی یا تندی  $v_x = 10 \text{ m/s}$ . هر یک ممانعی می‌تواند با استفاده از اختلاف زمانی بین زمان رسیدن این امواج به نزدیک‌ترین پای خود، فاصله خود از طعمه را تعیین کند. اگر این اختلاف زمان برابر  $\Delta t = 4 \text{ ms}$  باشد، طعمه در چه فاصله‌ای از طرف قرار دارد؟



برونمای	S	R	Q	P	S
---------	---	---	---	---	---

۱۳. شکل زیر میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی سینوسی را در نقطه‌ای معین و دور از چشمه، در یک لحظه نشان می‌دهد. موج از روی  $x$  در خلاف جهت محور  $z$  انتقال می‌دهد. جهت میدان مغناطیسی موج را در این نقطه و این لحظه تعیین کنید.



۱۴. الف) طول موج نور نارنجی در هوا حدود  $6 \times 10^{-7} \text{ m}$  است. بسامد این نور چقدر است؟

ب) بسامد نور قرمز در حدود  $4.3 \times 10^{14} \text{ Hz}$  است. طول موج این نور را در هوا و در آب حساب کنید. (سرعت نور را در هوا  $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$  و در آب  $2.25 \times 10^8 \text{ m/s}$  فرض کنید).

۱۵. چشمه موجی با بسامد  $10 \text{ Hz}$  در یک محیط که تندی انتشار موج در آن  $10 \text{ cm/s}$  است، نوسان طولی ایجاد می‌کند. اگر داده نوسان  $10 \text{ cm}$  باشد،

الف) فاصله بین دو تراکم متوالی این موج چقدر است؟

ب) فاصله بین یک تراکم و یک انبساط متوالی چقدر است؟

۱۶. طرف‌های ممانعی وجود طعمه را با امواجی که بر اثر حرکت طعمه در ساحل نشی ایجاد می‌شود، احساس می‌کنند. این امواج

۱- بسامد

۲- Ultrasonic Transducer



۲۱ از رابطه  $\lambda = v/f$ ، طول موج را به دست می آوریم :

$$\lambda = \frac{10^0 \text{ m/s}}{10^1 \text{ s}^{-1}} = 10^0 \text{ m}$$

(الف) فاصله بین دو تراکم متوالی همان طول موج است.

(ب) فاصله بین یک تراکم و یک انبساط متوالی  $\lambda/2 = 5^0 \text{ m}$  می شود.

۲۲ براساس آنچه در شکل آمده است درمی یابیم مسافت  $d$  برابر است با

$$d = v_L t_L = v_T t_T$$

که در آن  $v_L$  و  $v_T$  به ترتیب تندی امواج طولی و عرضی، و  $t_L$  و  $t_T$  به ترتیب زمان رسیدن امواج طولی و عرضی است. از هر کدام از فرمول های سمت راست می توانیم مسافت  $d$  را تعیین کنیم. اما  $t_L$  یا  $t_T$  را نداریم. با توجه به اینکه  $\Delta t = t_T - t_L$  داده شده است، می توانیم  $t_L$  یا  $t_T$  را به دست آوریم :

$$\Delta t = t_T - t_L = t_T - t_T \frac{v_T}{v_L} = t_T \left(1 - \frac{v_T}{v_L}\right)$$

$$= t_T \left(1 - \frac{5^0 \text{ m/s}}{15^0 \text{ m/s}}\right) = \frac{2}{3} t_T = 4^0 \text{ ms}$$

و از آنجا  $t_T = 6^0 \text{ ms}$  می شود و در نتیجه

$$d = v_T t_T = (5^0 \text{ m/s})(6^0 \times 10^{-3} \text{ s}) = 3^0 \text{ m} = 3^0 \text{ cm}$$

۲۳ همان طور که در متن درس آمده است، از گزینه های داده شده تنها دمای هوا بر تندی صوت تأثیر می گذارد. البته در حالت کلی عوامل مؤثر بر تندی صوت، تراکم پذیری و چگالی محیط است که این برای گازهای کامل که هوا نیز با تقریب خوبی چنین است، متناسب با جذر دمای گاز در مقیاس کلوین می شود.

۲۴ (الف) بسامد زاویه ای برابر است با

$$\omega = 2\pi f = 2\pi (6/7 \times 10^6 \text{ s}^{-1}) = 4/21 \times 10^7 \text{ rad/s} \approx 4/2 \times 10^7 \text{ rad/s}$$

توجه کنید که مقدار  $\omega$  بسیار زیاد است و این به معنای نوسان های بسیار سریع کاوه است. در حالی که برای یک نوسانگر کند، مانند آونگ یک ساعت پاندولی، ماجرا برعکس است و دوره تناوب زیاد و بسامد پایین است.

(ب) از رابطه  $\lambda = v/f$  داریم :

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{15^0 \text{ m/s}}{6/7 \times 10^6 \text{ s}^{-1}} = 2/23 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 2/2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

شکل ۳۳- انتقال و موج

۱۸ شکل زیر طیف موج های الکترومغناطیسی را با یک مقیاس تقریبی نشان می دهد. مقیاس نام قسمت های از طیف را که با حرف علامت گذاری شده اند، بنویسید. (با اگر در طول طیف از جبهه به راست حرکت کنیم، مقدار کدام مشخصه های موج افزایش یا کاهش می یابد و کدام ثابت می ماند؟)


طول موج	فرکانس	سرعت	انرژی
↑	↑	↑	↑

۱۹ شکل زیر میدان الکتریکی یک موج الکترومغناطیسی سینوسی را در نقطه ای معین و دور از چشمه، در یک لحظه نشان می دهد. موج از روی را در خلاف جهت محور  $z$  انتقال می دهد. جهت میدان مغناطیسی موج را در این نقطه و این لحظه تعیین کنید.



۲۰ (الف) طول موج نور نارنجی در هوا حدود  $6/2 \times 10^{-7} \text{ m}$  است. بسامد این نور چند هرتز است؟ (ب) بسامد نور فرمز در حدود  $4/3 \times 10^{14} \text{ Hz}$  است. طول موج این نور را در هوا و آب حساب کنید. (سرعت نور را در هوا  $3^0 \times 10^8 \text{ m/s}$  و در آب  $2/25 \times 10^8 \text{ m/s}$  فرض کنید.) (ج) چشمه مرئی با بسامد  $10^6 \text{ Hz}$  در یک محیط که تندی انتشار موج در آن  $10^4 \text{ m/s}$  است، نوسان های طولی ایجاد می کند. اگر داده نوسان ها  $2^0 \text{ cm}$  باشد.

(الف) فاصله بین دو تراکم متوالی این موج چند است؟ (ب) فاصله بین یک تراکم و یک انبساط متوالی چند است؟ (ج) غرض های مسمی وجود طعمه را با امواجی که بر اثر حرکت طعمه در ساحل ناشی ایجاد می شود، احساس می کنند. این امواج



۲۱ توضیح دهید کدام یک از عامل های زیر بر تندی صوت در هوا مؤثر است.

(الف) شکل موج (ب) دامنه موج (ج) بسامد موج (د) تندی امواج (ه) در سونوگرافی معمولاً از کاوه ای دینی موسوم به تراکنار فرانسوی برای تشخیص پزشکی استفاده می شود که دقیقاً روی ناحیه مودنظر از من پیمار گامشته و حرکت داده می شود. این کاوه در بسامد  $9 \text{ MHz}$  عمل می کند.

(الف) بسامد زاویه ای در این کاوه نوسان چند است؟ (ب) اگر تندی موج صوتی در باقی نرم از بین  $15^0 \text{ m/s}$  باشد، طول موج این موج در این بافت چند است؟



۱- سونوگرافی  
۲- Ultrasonic Transducer

AV



۲۵ الف) برای  $\Delta t$  داریم:

$$\Delta t = t_{\text{هوا}} - t_{\text{فلز}} = \frac{L}{v_{\text{هوا}}} - \frac{L}{v_{\text{فلز}}} = L \left( \frac{v_{\text{هوا}} - v_{\text{فلز}}}{v_{\text{هوا}} v_{\text{فلز}}} \right)$$

ب) از رابطه به دست آمده در قسمت الف،  $L$  را به دست می آوریم:

$$L = \frac{\Delta t (v_{\text{هوا}} v_{\text{فلز}})}{v_{\text{هوا}} - v_{\text{فلز}}}$$

که در آن  $v_{\text{فلز}}$  همان تندی صوت در فولاد است. از جدول ۱-۳ کتاب، این تندی را برابر  $5941 \text{ m/s}$  در می یابیم. در نتیجه برای  $L$  داریم:

$$L = \frac{(1/0 \cdot 0 \text{ s})(5941 \text{ m/s})(340 \text{ m/s})}{5941 \text{ m/s} - 340 \text{ m/s}} = 360/3 \text{ m} \approx 361 \text{ m}$$

۲۶ از رابطه  $I = \bar{P} / A$  استفاده می کنیم. به ترتیب در محل صفحه ها داریم:

$$I_1 = \frac{\bar{P}}{A_1} = \frac{1/2 \times 10^{-4} \text{ W}}{4/0 \text{ m}^2} = 3/0 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2$$

$$I_2 = \frac{\bar{P}}{A_2} = \frac{1/2 \times 10^{-4} \text{ W}}{12 \text{ m}^2} = 1/0 \times 10^{-5} \text{ W/m}^2$$

گرچه توان عبوری از سطوح برابر است، ولی شنونده دوم توان بر واحد سطح کمتری از شنونده اول دریافت می کند.

۲۷ تراز شدت صوت از رابطه زیر به دست می آید:

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

که در آن  $I_0 = 1/0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2$  است. بنابراین  $\beta$  به ازای  $I = 1/0 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$  چنین می شود

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \left( \frac{1/0 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2}{1/0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2} \right) = 1/0 \times 10^2 \text{ dB}$$

۲۸ اهمیت این مسئله، بیش از حل آن، به محتوای آن بازمی گردد. در واقع اگر مدتی طولانی در معرض صدایی با تراز شدت بالایی قرار گیریم، آستانه شنوایی ما ممکن است به طور دائم افزایش یابد. در هر حال، حل مسئله که نیاز به مائشین حساسی با قابلیت چنین محاسباتی دارد چنین است:

$$\beta = (10 \text{ dB}) \log \left( \frac{I}{I_0} \right)$$

و از آنجا

$$I = I_0 \cdot 10^{\left( \frac{\beta}{10 \text{ dB}} \right)}$$


که به ترتیب به ازای  $\beta_1 = 28 \text{ dB}$  و  $\beta_2 = 92 \text{ dB}$  چنین به دست می دهد:

$$I_1 = (1/0 \times 10^{-12} \text{ W/m}^2) \cdot 10^{\left( \frac{28 \text{ dB}}{10 \text{ dB}} \right)} = 6/31 \times 10^{-10} \text{ W/m}^2$$

#ادبیات

۲۵ می شود. فرض کنید صوت به طور یکساخت در تمام جهت ها منتشر شود. از جذب انرژی صوتی در محیط و نیز از بازتابی که ممکن است امواج صوتی از زمین پیدا کند چشم پوشی کنید. با فرض اینکه صوت با شدت  $I = 1 \cdot 10^{-4} \text{ W/m}^2$  به شنونده ای برسد که به فاصله  $r_1 = 40 \text{ m}$  از محل انفجار قرار دارد. این صوت به شنونده ای که در فاصله  $r_2 = 160 \text{ m}$  از محل انفجار قرار دارد یا چه شدتی می رسد؟

۲۶ نمودار جابجایی مکان دو موج صوتی A و B که در یک محیط منتشر شده اند، بصورت زیر است. دانه، طول موج، بسامد و شدت این دو موج صوتی را با هم مقایسه کنید.



۲۷ شکل زیر جهت های حرکت یک جبهه صوتی و یک فاصه (شنونده) را در وضعیت های مختلف نشان می دهد.

جهت	فاصله (شنونده)
•	•
→	•
←	•
•	→
•	←
→	←
←	→

۲۸ بسامدی را که بافر در حالت های مختلف می شود با حالت الف مقایسه کنید.

۸۸

$$\approx 6/3 \times 10^{-1} \text{ W/m}^2$$

$$I_T = (10^0 \times 10^{-11} \text{ W/m}^2) 10^{9.2 \text{ dB}} = 1/58 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$$

$$\approx 1/6 \times 10^{-2} \text{ W/m}^2$$

۲۹ نخست تفاضل  $\beta$  ها را محاسبه می کنیم.

$$\beta_T - \beta_1 = (10 \text{ dB}) \log\left(\frac{I_T}{I_0}\right) - (10 \text{ dB}) \log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$$

$$= (10 \text{ dB}) \log\left(\frac{I_T}{I_1}\right)$$

و از آنجا

$$\frac{I_T}{I_1} = 10^{0.5} = 3/1.6 \approx 3/2$$


۳۰ از رابطه  $I = \bar{P}/A$  استفاده می کنیم که در اینجا  $A = 4\pi r^2$  است.

بنابراین داریم:

$$\frac{I_T}{I_1} = \frac{\bar{P}}{4\pi r_1^2} = \frac{r_1^2}{r_2^2} = \left(\frac{1.6 \text{ m}}{64 \text{ m}}\right)^2 = \left(\frac{1}{4}\right)^2$$

و در نتیجه

۲۸ فرض کنید صوت به طور یکواخت در تمام جهات منتشر شود. از جذب انرژی صوتی در محیط و نیز از بازتابی که ممکن است امواج صوتی از زمین پیدا کند چشمپوشی کنید. با فرض اینکه صوت با شدت  $I = 10^{-11} \text{ W/m}^2$  به شونده‌ای برسد که به فاصله  $r_1 = 44 \text{ m}$  از محل انفجار قرار دارد، این صوت به شونده‌ای که در فاصله  $r_2 = 140 \text{ m}$  از محل انفجار قرار دارد یا چه شدتی می‌رسد؟



۲۷ شکل زیر جهت‌های حرکت یک جنبه صوتی و یک ناظر (شونده) را در وضعیت‌های مختلف نشان می‌دهد.

جنبه	ناظر (شونده)	وضعیت
•	•	(الف)
•	•	(ب)
•	•	(ج)
•	•	(د)
•	•	(ه)
•	•	(و)
•	•	(ز)
•	•	(ح)

۲۶ بسامدی را که ناظر در حالت‌های مختلف می‌شنود با حالت الف مقایسه کنید.

۲۵ تندی صوت در یک فلز خاص، برابر  $v$  است. به یک سر لوله توخالی بلندی از جنس این فلز به طول  $L$  ضربه محکمی می‌زنیم. شونده‌ای که در سر دیگر این لوله قرار دارد دو صدا را می‌شنود. یکی ناشی از توجی است که از دیواره لوله می‌گذرد و دیگری از موجی است که از طریق هوای داخل لوله عبور می‌کند.

۲۴ اگر تندی صوت در هوا  $v$  باشد، بازه زمانی  $\Delta t$  بین دریافت این دو صدا در گوش شونده چقدر خواهد بود؟

۲۳ بیا اگر  $v_1 = 330 \text{ m/s}$  و  $\Delta t = 1/10 \text{ s}$  باشد، طول  $L$  لوله چقدر است؟ ( $v_2 = 344 \text{ m/s}$ )

۲۲ موجی صوتی با توان  $1.2 \times 10^{-3} \text{ W}$  از دو صفحه فرضی شکل ۲۶-۳ می‌گذرد. با فرض اینکه مساحت صفحه‌ها به ترتیب  $A_1 = 4 \text{ m}^2$  و  $A_2 = 1 \text{ m}^2$  باشد، شدت صوت در دو سطح را تعیین کنید و توضیح دهید چرا شونده در محل صفحه دوم صدا را آهسته‌تر می‌شنود.

۲۱ شدت صدای حاصل از یک مژه سنگ‌تکن در فاصله  $1 \text{ m}$  از آن  $10^{-11} \text{ W/m}^2$  است. تراز شدت صوتی آن بر حسب dB چقدر می‌شود؟

۲۰ اگر به مدت  $10$  دقیقه در معرض صوتی با تراز شدت  $140 \text{ dB}$  باشیم، آستانه شنوایی به طور موقت از  $10 \text{ dB}$  به  $120 \text{ dB}$  افزایش می‌یابد. مطالعات نشان داده است که به طور متوسط اگر به مدت  $10$  سال در معرض صدای با تراز شدت  $140 \text{ dB}$  قرار گیریم، آستانه شنوایی به طور دائم به  $120 \text{ dB}$  افزایش می‌یابد. شدت‌های صوت مربوط به  $140 \text{ dB}$  و  $120 \text{ dB}$  چقدر است؟ (راهنمایی: برای پاسخ دادن لازم است از نامنس حساب مناسب استفاده کنید.)

۱۹ یک دستگاه صوتی، صدای با تراز شدت  $100 \text{ dB}$  و  $10$  دستگاه صوتی دیگر، صدای با تراز شدت  $100 \text{ dB}$  ایجاد می‌کنند. شدت‌های مربوط به این دو تراز (بر حسب  $\text{W/m}^2$ ) به ترتیب  $I_1$  و  $I_2$  هستند. نسبت  $I_1$  را با  $I_2$  تعیین کنید.

۱۸ در یک آنتن‌یابی، موسیقی در بالای آسمان منجر

$$I_T = 1/6 I_1 = 1/6 (10^{-11} \text{ W/m}^2) = 1/6 \text{ W/m}^2$$

۳۱ همان طور که از شکل مشخص است دامنه  $A$  دو برابر دامنه  $B$  است. همچنین طول موج  $B$  دو برابر طول موج  $A$  است. از طرفی،

طبق رابطه  $f = v/\lambda$  درمی‌یابیم که بسامد  $B$  نصف بسامد  $A$  است. در مورد شدت نیز با توجه به اینکه طبق رابطه  $I = \bar{P}/A$ ، شدت با توان متوسط متناسب است و نیز همان طور که در متن درس اشاره کردیم توان متوسط با مربع بسامد و دامنه متناسب است، بنابراین

داریم:

$$\frac{I_B}{I_A} = \left(\frac{A_B f_B}{A_A f_A}\right)^2 = \left(\frac{A_B}{A_A}\right)^2 \left(\frac{f_B}{f_A}\right)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}$$

یعنی شدت موج صوتی  $A$ ،  $16$  برابر شدت موج صوتی  $B$  است.

۳۲ در حالت‌های (ب) و (پ) ناظر ساکن و چشمه متحرک است که این حالتی است که در وضعیت الف اثر دوپلر در متن درس آن

را بررسی کردیم. بنابراین همان استدلال را به کار می‌گیریم. اگر چشمه به طرف ناظر حرکت کند (حالت ب)، تجمع جبهه‌های موج در جلوی آن بیشتر خواهد شد و بنابراین ناظر ساکن روبه‌روی آن طول موج کوتاه‌تری نسبت به وضعیتی که چشمه ساکن بود اندازه


می‌گیرد که این به معنی افزایش بسامد برای این ناظر است. با استدلالی مشابه درمی‌یابیم که با دور شدن چشمه، از بسامدی که ناظر اندازه می‌گیرد کم می‌شود و بنابراین در حالت (پ) کاهش بسامد داریم. حالت‌های (ت) و (ث) نیز همان وضعیتی هستند که در

حالت ب اثر دوپلر در متن درس آن را بررسی کردیم. در این وضعیت‌ها تجمع جبهه‌های موج تغییر نمی‌کند، و اگر مانند حالت (ث) ناظر به هدف چشمه حرکت کند با جبهه‌های موج بیشتری مواجه می‌شود که به معنی افزایش بسامد است. ولی اگر ناظر مانند حالت

مشاوره

می‌شود. فرض کنید صوت به‌طور یکجوار در تمام جهت‌ها منتشر شود. از جذب انرژی صوتی در محیط و نیز از بازتابی که ممکن است امواج صوتی از زمین پیدا کند چشم‌پوشی کنید. با فرض اینکه صوت با شدت  $I = 0.1 \text{ W/m}^2$  به شونده‌ای برسد که به فاصله  $r_1 = 40 \text{ m}$  از محل انفجار قرار دارد. این صوت به شونده‌ای که در فاصله  $r_2 = 160 \text{ m}$  از

محل انفجار قرار دارد یا چه شدتی می‌رسد؟  
**پ۱۱.** نمودار جابجایی مکان دو موج صوتی A و B که در یک محیط منتشر شده‌اند، به‌صورت زیر است. دامنه طول موج بسامد و شدت این دو موج صوتی را با هم مقایسه کنید.



**پ۱۲.** شکل زیر جهت‌های حرکت یک جبهه صوتی و یک ناظر (شونده) را در وضعیت‌های مختلف نشان می‌دهد.

جهت ناظر (شونده)	جهت
(الف)	•
(ب)	•
(پ)	•
(ت)	•
(ث)	•
(ج)	•
(ح)	•

بسامدی را که ناظر در حالت‌های مختلف می‌شنود با حالت الف مقایسه کنید.

**پ۱۳.** شدت صوت در یک فتر خاص، برابر  $10^{-10}$  است. به یک سر لوله توخالی بلندی از جنس این فلز به طول  $L$  ضرباً محکمی می‌زنیم. شونده‌ای که در سر دیگر این لوله قرار دارد دو صدا را می‌شنود. یکی ناشی از موجی است که از دیواره لوله می‌گذرد و دیگری از موجی است که از طریق هوای داخل لوله عبور می‌کند.

الف) اگر شدت صوت در هوا  $10^{-10}$  باشد، بازه زمانی  $\Delta t$  بین دریافت این دو صدا در گوش شونده چقدر خواهد بود؟  
 ب) اگر  $\Delta t = 1.0 \times 10^{-3}$  و فلز از جنس فولاد باشد، طول  $L$  لوله چقدر است؟ ( $v = 340 \text{ m/s}$ )

**پ۱۴.** موجی صوتی با توان  $1.7 \times 10^{-3} \text{ W}$  از دو صفحه فرضی شکل ۲۶-۳ می‌گذرد. با فرض اینکه مساحت صفحه‌ها به ترتیب  $A_1 = 4.0 \text{ m}^2$  و  $A_2 = 1.2 \text{ m}^2$  باشد، شدت صوت در دو سطح را تعیین کنید و توضیح دهید چرا شونده در محل صفحه دوم صدا را آهسته‌تر می‌شنود.

**پ۱۵.** شدت صدای حاصل از یک مژه سنگ‌سنگی در فاصله  $1.0 \text{ m}$  از آن  $1.0 \times 10^{-10} \text{ W/m}^2$  است. تراز شدت صوتی آن بر حسب dB چقدر می‌شود؟

**پ۱۶.** اگر به مدت  $1.0$  دقیقه در معرض صوتی با تراز شدت  $120 \text{ dB}$  باشید، آستانه شنوایی به‌طور موقت از  $10 \text{ dB}$  به  $140 \text{ dB}$  افزایش می‌یابد. اطلاعات نشان داده است که به‌طور متوسط اگر به مدت  $1.0$  سال در معرض صدایی با تراز شدت  $120 \text{ dB}$  قرار گیریم، آستانه شنوایی به‌طور دائم به  $140 \text{ dB}$  افزایش می‌یابد. شدت‌های صوت مربوط به  $120 \text{ dB}$  و  $140 \text{ dB}$  چقدر است؟ (راحتی؛ برای پاسخ دادن لازم است از مانسین حساب مناسب استفاده کنید.)


**پ۱۷.** یک دستگاه صوتی، صدایی با تراز شدت  $100 \text{ dB}$  و  $10$  و دستگاه صوتی دیگر، صدایی با تراز شدت  $95 \text{ dB}$  ایجاد می‌کند. شدت‌های مربوط به این دو تراز (بر حسب  $\text{W/m}^2$ ) به ترتیب  $I_1$  و  $I_2$  هستند. نسبت  $I_1/I_2$  را تعیین کنید.

**پ۱۸.** در یک آنتن‌یازی، موجی در بالای آسمان متحرک

(ت) از چشمه دور شود به معنی کاهش بسامد خواهد بود. در این مسئله می‌شد حالت‌های زیر را نیز از دانش‌آموزان پرسید. وضعیت‌هایی که چشمه و آشکارساز رودررو به سمت یکدیگر نزدیک می‌شوند و وضعیت‌هایی که چشمه و آشکارساز در خلاف جهت از هم دور می‌شوند. در این صورت با تلفیق هر دو استدلال بالا درمی‌یابیم که در وضعیتی که هر دو به هم نزدیک می‌شوند، بسامد دریافتی بیشتر و در وضعیتی که از هم دور می‌شوند، بسامد دریافتی کوچک‌تر می‌شود.

## راهنمای پاسخ یابی پرسشی ها و مسئله های فصل ۴

۱ در واقع شکلی مانند شکل زیر داریم، به طوری که  $d_1$  فاصله شخص از صخره نزدیک تر و  $d_2$  فاصله شخص از صخره دورتر است.



بدیهی است که پژواک صدای اول مربوط به صخره نزدیک تر و زمان دریافت آن  $1/5^{\circ}s$  پس از فریاد زدن و پژواک صدای دوم مربوط به صخره دورتر و زمان دریافت آن  $2/5^{\circ}s = 1/5^{\circ}s + 1/5^{\circ}s$  پس از فریاد زدن است. چون مسافت پیموده شده در هر پژواک  $2d$  است، به ترتیب داریم:

$$2d_1 = vt_1 \quad , \quad 2d_2 = vt_2$$

(الف) تندی صوت را از رابطه اول به دست می آوریم


$$v = \frac{2d_1}{t_1} = \frac{48 \cdot m}{1/5^{\circ}s} = 32 \cdot m/s$$

(ب) اکنون با دانستن تندی  $v$  می توانیم با استفاده از رابطه دوم،  $d_2$  را محاسبه کنیم:

$$d_2 = \frac{vt_2}{2} = \frac{(32 \cdot m/s)(2/5^{\circ}s)}{2} = 40 \cdot m$$

پس فاصله بین دو صخره  $d = d_1 + d_2 = 64 \cdot m$  است.

۲ اگر فاصله شما از پلکان به حد کافی زیاد باشد، به طوری که بتوان مانند شکل زیر مسیر تپ های متوالی را تقریباً موازی در نظر گرفت، شما بسامد ثابتی برای رشته تپ های متوالی درک می کنید.



مثلاً اگر پهنای هر پله  $w = 0.75^{\circ}m$  باشد، بسامد ادراکی

$$f = \frac{1}{\Delta t} = \frac{v}{2w} = \frac{34 \cdot m/s}{2(0.75m)} = 2/27 \times 10^2 \text{ Hz} \approx 2/3 \times 10^2 \text{ Hz}$$

### پرسش ها و مسئله های فصل ۴

#### ۳-۴ شکست موج

۱. دانش آموزی بین دو صخره قائم ایستاده است و فاصله او از صخره نزدیک تر  $22 \cdot m$  است. دانش آموز فریاد می زند و اولین پژواک صدای خود را پس از  $1/5^{\circ}s$  و صدای پژواک دوم را  $1/10^{\circ}s$  بعد از پژواک اول می شنود.

(الف) تندی صوت در هوا چقدر است؟  
(ب) فاصله بین دو صخره را بیابید.

۲. اگر در فاصله مناسبی از یک رشته پلکان بنشینید و یک بار تکف زنده، پژواکی بیشتر از یک صدای بوم زدن دست می شنوید. نمونه جالبی از این پدیده در پارک ریسه بهای معبد قدیمی کرکوتگان در مکزیک رخ می دهد. این معبد از ۹۲ پله سنگی تشکیل شده است. در مورد چنین پژواکی توضیح دهید.





تصویری از معبد کرکوتگان

۳. ضرب تکست آب  $1/3$  و ضرب تکست نیشته  $1/5$  است. اگر نوری به طور مایل از آب به مرز نیشته با آب بتابد، با رسم نموداری، جهه های موج را در محیط نشان دهید.

۴. شکل زیر جهه های موجی را نشان می دهد که بر مرز بین محیط A و محیط B فرود آمده اند.

(الف) ادامه جهه موج EF را در محیط B رسم کنید.  
(ب) توضیح دهید در کدام محیط تندی موج بیشتر است.

۵. آیا با استفاده از این نمودار می توان نسبت تندی موج عبوری به موج فرودی را محاسبه کرد؟



Kulubnan Temple

برش‌ها و هسته‌های فصل ۴

۳-۴ شکست موج

۱. دانش‌آموزی بین دو صخره قائم ایستاده است و فاصله او از صخره نزدیکتر ۲۴۰ م است. دانش‌آموز فریاد می‌زند و اولین پژواک صدای خود را پس از ۱۵ ثانیه و صدای پژواک دوم را ۱۰ ثانیه بعد از پژواک اول می‌شنود.  
الف) تندی صوت در هوا چقدر است؟  
ب) فاصله بین دو صخره را بیاید.




۳-۵ بازتاب موج

۱. با رسم شکلی از جبهه‌های موج توضیح دهید چگونه جهت انتشار جبهه‌های موج با رسیدن به یک ساحل شیبدار، تغییر می‌کند.  
۲. شکلی زیر بر روی را نشان می‌دهد که از هوا وارد نشسته شده است. کدام گزینه‌های A، B، C، D، می‌تواند تندی داخل نشسته را نشان دهد؟  
۳. اگر در فاصله تناسلی از یک رشته پلکان بلند بایستید و یک بار کف بزنید، پژواکی بیشتر از یک صدای بوم زدن دست می‌شنوید. نمونه جالبی از این پدیده در برابر رشته به‌های معبد قدیمی کورکونگان در مکزیک رخ می‌دهد. این معبد از ۹۲ پله سنگی تشکیل شده است. در مورد چنین پژواکی توضیح دهید.




تصویری از معبد کورکونگان

۱. ضربت تنگست آب ۱۷۳ و ضربت تنگست نشسته ۱۷۵ است. اگر توری به‌طور مایل از آب به مرز نشسته با آب بناید، با رسم نموداری، جبهه‌های موج را در دو محیط نشان دهید.  
۲. شکلی زیر جبهه‌های موجی را نشان می‌دهد که بر مرز بین محیط A و محیط B فرود آمده‌اند.  
الف) ادامه جبهه موج EF را در محیط B رسم کنید.  
ب) توضیح دهید در کدام محیط تندی موج بیشتر است.  
۳. آب A با استفاده از این نمودار می‌توان نسبت تندی موج عبوری به موج فرودی را محاسبه کرد؟



۱. وقتی یک پارکله فزور را به دیوار کلاس می‌تابانید، همه دانش‌آموزان فقط نقطه رنگی ایجاد شده روی دیوار را می‌بینند. دلیل آن چیست؟  
۲. در شکلی زیر برتوهای بازتابیده از آب‌های تخت M<sub>1</sub> و M<sub>2</sub> را رسم کنید.




یا به عبارتی  $23^\circ \text{ Hz}$  می‌شود. این صدا به‌صورت رشته‌ای دوره‌ای از تپ‌ها بازمی‌گردد و مانند یک نت نواخته شده درک می‌شود. بدیهی است اگر پهنای پله‌ها کوچک‌تر باشد، با توجه به اینکه  $f \propto \frac{1}{w}$  است، بسامد ادراک‌شده بیشتر می‌شود.


البته در واقع امر، مسیر تپ‌های متوالی که هر کدام از یک پله نشأت گرفته‌اند، موازی نیست و بسامد ثابتی را برای رشته تپ‌های متوالی درک نمی‌کنید؛ بلکه گستره‌ای از بسامدها را درک می‌کنید که به تدریج کم می‌شوند. به‌طوری که بسامد دریافتی از پله‌های پایینی (که تپ‌های بازتابیده از آنها را زودتر می‌شنویم) بیشتر از بسامد دریافتی از پله‌های بالایی است (که تپ‌های بازتابیده از آنها را دیرتر می‌شنویم) و بدین ترتیب صدا را به‌صورت رشته‌ای دوره‌ای از تپ‌ها می‌شنوید.

همان‌طور که در متن کتاب اشاره شد، این ناشی از بازتاب پخشنده است.

شکلی مانند شکل زیر خواهیم داشت.



شکلی مانند شکل زیر خواهیم داشت. با نزدیک شدن امواج به یک ساحل شیبدار و رسیدن جبهه‌های موج به ساحل که در آنجا عمق آب کم می‌شود، جهت انتشار موج تغییر می‌کند. به عبارتی، با ورود امواج از ناحیه عمیق به ناحیه کم عمق، تندی آنها کم می‌شود.



برش ها و مسئله های فصل ۴

۴-۳ بازتاب موج

۱. دانش آموزی بین دو صخره قائم ایستاده است و فاصله او از صخره نزدیکتر ۲۲۰m است. دانش آموز فریاد می زند و اولین پژواک صدای خود را پس از ۱.۵s و صدای پژواک دوم را ۱.۷۰s بعد از پژواک اول می شنود. الف) تندی صوت در هوا چقدر است؟ ب) فاصله بین دو صخره را بیاید. ج) اگر در فاصله تناسلی از یک رشته یکان بند بایستید و یک بار کف بزنید، پژواکی بیشتر از یک صدای بوم زدن دست می شنود. نمونه جالبی از این پدیده در برابر رشته بهای معبد قدیمی کورنگکان در مکزیک رخ می دهد. این معبد از ۹۲ پله سنگی تشکیل شده است. در مورد چنین پژواکی توضیح دهید.

۴-۴ شکست موج

۱. با رسم شکلی از جبهه های موج توضیح دهید چگونه جهت انتشار جبهه های موج با رسیدن به یک ساحل ناهموار، تغییر می کند. ۲. شکلی زیر بر روی را نشان می دهد که از هوا وارد تیشه شده است. کدام گزینه های A، B، C، D می تواند بر روی داخل تیشه را نشان دهد؟





۳. ضربت تکست آپ ۱۷۳ و ضربت تکست تیشه ۱۷۵ است. اگر توری به طور مایل از آب به مرز تیشه با آب بناید، با رسم نموداری، جبهه های موج را در دو محیط نشان دهید. ۴. شکلی زیر جبهه های موجی را نشان می دهد که بر مرز بین محیط I و محیط R فرود آمده اند. الف) ادامه جبهه موج EF را در محیط R رسم کنید. ب) توضیح دهید در کدام محیط تندی موج بیشتر است. ج) آیا با استفاده از این نمودار می توان نسبت تندی موج عبوری به موج فرودی را محاسبه کرد؟




تصویری از معبد کورنگکان

۵. وقتی یک پرتو لیزر را به دیوار کلاس می تابانید، همه دانش آموزان نقطه رنگی ایجاد شده روی دیوار را می بینند. دلیل آن چیست؟ ۶. در شکلی زیر برتوهای پرتابیده از آبهای تخت M<sub>1</sub> و M<sub>2</sub> را رسم کنید.




۶ شیشه ضریب شکست بزرگ تری نسبت به هوا دارد. بنابراین انتظار می رود که پرتوی شکسته شده در شیشه به خط عمود نزدیک شود. بنابراین پرتوی A نمی تواند درست باشد، زیرا از خط عمود دور شده است. اگر نور از شیشه وارد هوا می شد، این گزینه درستی بود. پرتوی B نیز پاسخ درستی نیست، زیرا این پرتو خم نشده است و در امتداد پرتوی فرودی است. پرتوی C پاسخ درست است زیرا به سمت خط عمود کج شده است. ولی چرا پرتوی D نادرست است. توجه کنید که برای این پرتو، زاویه شکست  $\theta_r = 0^\circ$  است و بنابراین  $\sin \theta_r = 0$  خواهد که این قانون اسنل را نقض می کند که در اینجا بیان می دارد  $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_r$ .

۷ شکلی مطابق شکل زیر خواهیم داشت (البته در این شکل فاصله بین جبهه های موج در دو محیط به مقیاس نیست، ولی در هر حال، آب  $\lambda <$  تیشه است).



۸ الف) ادامه موج EF، پرتوی شکسته شده در محیط B است که باید موازی با D باشد. به عبارتی، پرتوهای شکسته باید موازی هم باشند. ب) با عبور موج از محیطی به محیط دیگر، بسامد موج تغییر نمی کند. بنابراین نسبت  $\frac{v}{\lambda}$  ثابت می ماند و داریم


$$\frac{v_1}{\lambda_1} = \frac{v_2}{\lambda_2} \Rightarrow \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$



از روی شکل درمی یابیم که  $\lambda_2 < \lambda_1$  و بنابراین  $v_1 > v_2$  است. به عبارتی با دانستن فاصله بین جبهه های موج در دو محیط می توان درباره نسبت تندی موج در دو محیط اظهار نظر کرد. مثلاً برای شکل داده شده در این مسئله نسبت  $\lambda_1$  به  $\lambda_2$  تقریباً  $1/6$  می شود که همان نسبت  $v_1$  به  $v_2$  نیز هست.

**۹ الف)** برای موج شکسته، به جز بسامد سایر مشخصه‌ها با موج فرودی متفاوت است. چرا که تندی و طول موج (همان‌طور که در تمرین ۸ هم دیدیم) تغییر می‌کنند و این دو به ضریب شکست بستگی دارند. در حالی که برای موج بازتابیده، بسامد، طول موج و تندی با موج فرودی برابر است.

**ب)** امتداد پرتوها بر اثر شکست تفاوت پیدا می‌کند. شکل پرتویی این مسئله را در تمرین ۶ مشاهده کردیم و گفتیم که پرتوی شکسته شده باید به خط عمود نزدیک شود. در حل چنین مسائلی نخست پرتوی موج را رسم کنید و سپس جبهه‌های موج را به گونه‌ای رسم کنیم که این پرتو عمود بر آنها باشد. در مورد جبهه‌های موج بازتابیده، چون در خود محیط بازتابیده می‌شوند، فاصله خطوط تغییر نمی‌کند و بنابراین برای موج بازتابیده شکلی مانند زیر خواهیم داشت.



**۱۰ الف)** در شکل زیر موج نوری فرودی از هوا وارد شیشه می‌شود. بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط بازتاب می‌دهد و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد شیشه می‌شود.

**۱۱ الف)** مشخصه‌های موج بازتابیده و موج شکست یافته را با موج فرودی مقایسه کنید.

**۱۲** با جبهه‌های موج بازتابیده و شکست یافته را رسم کنید.


**۱۳** طول موج نور فرم‌نور طیم - تون در هوا حدود ۶۳۳nm است، ولی در زجاجه جنس ۱۷۷۲nm است. الف) بسامد این نور چقدر است؟ ب) ضریب شکست زجاجه برای این نور چقدر است؟ ج) تندی این نور در زجاجه را محاسبه کنید.

**۱۴** سگای را در گوشه فضای خالی قرار دهید و طوری مقابل آن قرار گیرید که نتوانید سگه را ببینید. سپس یک آنکه سوزن را حرکت دهید باز هم در همان آب بماند، به طوری که آب رختن شما موجب جابه‌جایی سگه شود. با برداشتن فنجان، سگه را خواهید دید. با رسم پرتوها علت دیدن شدن سگه را توضیح دهید.

**۱۵** مطابق شکل، پرتو نوری که از مایع به چشمان منحنی می‌رسد تحت زاویه ۶۰° به هوا برخورد کرده است. زاویه شکست این پرتو در هوا چقدر است؟

**۱۶** گونی‌های همراه با امواج رادیویی با بسامد حدود ۲GHz کار می‌کنند. توضیح دهید این امواج تحت چه شرایطی از مواع برتابیده می‌شوند و به منطقه سایه مایع می‌رسند.

برای جبهه‌های موج شکست یافته نیز نخست یک پرتوی شکست یافته را رسم می‌کنیم و سپس جبهه‌های موج مربوط به آن را نشان می‌دهیم. توجه کنید که فاصله جبهه‌های موج در شیشه، کوتاه‌تر است.



**۱۰ الف)** بسامد را از رابطه  $f=v/\lambda$  محاسبه می‌کنیم که در آن  $v=c$  تندی نور است :

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{c}{\lambda_0} = \frac{3/0 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{633 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 4/739 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \approx 4/74 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

ب)

$$n = \frac{\lambda_0}{\lambda} = \frac{633 \cdot 10^{-9} \text{ m}}{474 \cdot 10^{-9} \text{ m}} = 1/335 \approx 1/34$$

۱۱۱

۴. در شکل زیر موج فرودی از هوا وارد شیشه می‌شود. در شکل‌های زیر، پرتوی فرودی که شامل پرتوهای فرمزد و بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط باریک‌بند و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد شیشه می‌شود. البته مشخصه‌های موج بازتابیده و موج شکست‌یافته را با موج فرودی مقایسه کنید. (با جبهه‌های موج بازتابیده و شکست‌یافته را رسم کنید.)

۱. طول موج نور فرمزد طیم - تون در هوا حدود ۶۳۳nm است، ولی در زجاجیه جنس ۲۷۷nm است. البته بسامد این نور چقدر است؟ (با ضرب شکست زجاجیه برای این نور چقدر است؟) (با تندی این نور در زجاجیه را محاسبه کنید.)

۲. سکه‌ای را در گوشهٔ فنجانی خالی قرار دهید و طوری مایل آن قرار دهید که نوک سکه را ببینید. سپس آنکه سوزن را حرکت دهید باز آن در فنجان آب بیرون بیاید. به طوری که آب ریختن شما موجب جابه‌جایی سکه شود. با برداشتن فنجان، سکه را خواهید دید. با رسم پرتوهای پدید شدن سکه را توضیح دهید.

۳. مطلقاً شکل، پرتو نوری که از ماهی به چشمان منحنی می‌رسد تحت زاویهٔ ۹۰° به مرز آب-هوا برخورد کرده است. زاویهٔ شکست این پرتو در هوا چقدر است؟


۴. گوشه‌های هزاره با امواج رادیویی با بسامد حدود ۱GHz کار می‌کنند. توضیح دهید این امواج تحت چه شرایطی از مواع برانیده می‌شوند و به منطقهٔ سایهٔ امواج می‌رسند.

۱۱۲

پ)

$$v = \frac{c}{n} = \frac{3/0 \cdot 10^8 \text{ m/s}}{1/335} = 2/247 \times 10^8 \text{ m/s} \approx 2/25 \times 10^8 \text{ m/s}$$

۱۱ نخست شاید بهتر باشد دید از بالا را بررسی کنیم تا با رسم نموداری پرتویی به حسی از این مطلب برسید. دو پرتو از نقطه‌ای از سکه رسم می‌کنیم که در زاویهٔ کوچکی از خط عمود بر سطح آب قرار دارند. به دلیل شکسته شدن پرتوها و ورود آنها از محیطی با ضریب شکست بیشتر به محیطی با ضریب شکست کمتر، آنها در محل خروج از سطح آب، از خط عمود دور می‌شوند و این طور به نظر می‌رسد که امتداد آنها در نقطه‌ای بالاتر از کف فنجان همدیگر را قطع می‌کنند (که با رسم خط‌چین‌هایی نشان داده شده است). همین باعث می‌شود عمق فنجان را کمتر ببینیم.



به طور محاسبه‌ای هم می‌توانیم رابطه‌ای به دست آوریم. چون در این وضعیت زاویه‌ها کوچک اند (که البته در شکل با اغراق بزرگ کشیده شده اند) داریم  $\sin \theta \approx \tan \theta$  و در نتیجه از قانون اسنل داریم

$$\tan \theta_2 \approx n_1 \tan \theta_1 \Rightarrow \frac{x}{d'} \approx n_1 \frac{x}{d}$$

و در نتیجه —  $d' \approx \frac{d}{n_1}$

بنابراین برای شخصی که تقریباً به طور عمود نگاه می‌کند، عمق ظاهری  $\frac{1}{n}$  عمق واقعی می‌شود ولی توجه کنید که در این حالت جابه‌جایی افقی ناچیز است. ولی اگر کسی به طور مایل نگاه کند، افزون بر جابه‌جایی قائم، یک جابه‌جایی افقی نیز وجود دارد و همان‌طور که در شکل زیر برای داده‌هایی خاص نشان داده شده است، تصویر در هر دو امتداد قائم و افقی به ناظر نزدیک می‌شود. البته محل این تصویر یکتا نیست و هر چه پرتوهایی که به چشم ناظر می‌رسند افقی‌تر گردند، تصویر به ناظر نزدیک‌تر می‌گردد که بدیهی است. بیشترین آن برای پرتوهایی است که نزدیک به زاویهٔ حد به سطح جدایی می‌تابند.

۱۲ از قانون اسنل استفاده می‌کنیم :

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$




**۱۳** در شکل زیر موج نوری فرودی از هوا وارد شیشه می‌شود. بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط بازتاب می‌دهد و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد شیشه می‌شود. البته مشخصه‌های موج بازتابیده و موج شکست یافته را با موج فرودی مقایسه کنید. با جبهه‌های موج بازتابیده و شکست یافته را رسم کنید.

**۱۴** طول موج قرمز قرمز طیف - تون در هوا حدود ۶۳۳nm است، ولی در زجاجه چشم ۲۷۲nm است. الف) بسامد این نور چقدر است؟ ب) ضربت شکست زجاجه برای این نور چقدر است؟ ب) تندی این نور در زجاجه را محاسبه کنید. ج) سکای را در گوشه فنجانی خالی قرار دهید و طوری مائل آن قرار دهید که توانید سکای را ببینید. سپس آنکه سوزان را حرکت دهید باز آن را در فنجان آب بویزید. به طوری که آب رختن شما موجب جابه‌جایی سکای شود. با برداشتن فنجان، سکای را خواهید دید. با رسم پرتوهای علت دیده شدن سکای توضیح دهید.

**۱۵** مطابق شکل، پرتو نوری که از ماهی به چشمان ناخشن می‌رسد تحت زاویه ۳۰° به مرز آب - هوا برخورد کرده است. زاویه شکست این پرتو در هوا چقدر است؟

**۱۶** گوشه‌های همراه با امواج رادیویی با بسامد حدود ۱GHz کار می‌کنند. توضیح دهید این امواج تحت چه شرایطی از مواع برانیده می‌شوند و به منطقه سایه‌ناک می‌رسند.



که در اینجا  $n_1$  و  $n_2$  به ترتیب ضریب شکست آب و هوا، و  $\theta_1$  و  $\theta_2$  به ترتیب زاویه پرتوی نور نسبت به امتداد قائم در محیط‌های آب و هوا است. بنابراین داریم

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1 \sin \theta_1}{n_2} = \frac{(1/33) \sin 3^\circ}{1/00} = 0/665$$


و از آنجا  $\theta_2 = 41/7^\circ \approx 42^\circ$  می‌شود.

**۱۲** نخست توجه کنید عددهای داده شده برای ضریب شکست‌ها صرفاً برای مقایسه دو محیط است و اینکه کدام محیط چگال تر است، و نقش دیگری در حل این تمرین ندارد. در پاسخ به این مسئله باید به چند نکته دیگر نیز توجه کرد؛ یکی اینکه با توجه به اینکه نور از محیط با ضریب شکست بیشتر وارد محیط با ضریب شکست کمتر می‌شود باید پرتوهای نور شکسته شده «در سمت درست» از خط عمود دور شوند و دیگر اینکه به پاشندگی نور توجه کنیم و ترتیب و توالی شکست پرتوها درست باشد. بنابراین نخست باید خط عمود را رسم کنیم. از آنجا درمی‌یابیم که شکل (ب) اصلاً از لحاظ منطقی نادرست است. پرتوی قرمز تقریباً در امتداد خط عمود و پرتوی آبی در سمت نادرست (سمت چپ خط عمود) شکسته شده است. شکل (پ) این مشکل را ندارد و پرتوها در سمتی درست شکسته شده‌اند، ولی اگر توجه کنیم درمی‌یابیم که پرتوی آبی به خط عمود نزدیک شده است و بنابراین کلیت این شکل نیز نادرست است. اما شکل‌های (الف) و (ت) این هر دو مشکل را ندارند، هم پرتوها در سویی مناسب شکسته شده‌اند و هم هر دو پرتو از خط عمود دور شده‌اند. منتها همان‌طور که در مبحث پاشندگی دیدیم پرتوی آبی باید بیشتر از پرتوی قرمز شکست پیدا کند و بنابراین پاسخ درست، (ت) است.


**۱۴** چون این پرسش در بخش شکست نور مطرح شده است، بنابراین باید به آن با استفاده از دانش ارائه شده در این بخش و با استفاده از پاشندگی نور پاسخ دهیم. با استفاده از یک منشور به‌سادگی می‌توانیم بین این دو نظر، یکی را انتخاب کنیم. اگر نور زرد، ترکیبی باشد در منشور تجزیه می‌شود و می‌توانیم نورهای قرمز و سبز را مشاهده کنیم.

اما با توجه به اینکه در کل مجموعه این کتاب، آزمایش ینگ نیز آموزش داده شده است، خوب است تحلیلی مبتنی بر این آزمایش نیز ارائه کنیم. پهنای هر نوار تاریک یا روشن در آزمایش ینگ با طول موج متناسب است و از این نتیجه در تحلیل خود استفاده می‌کنیم. اگر نور زرد به کار رفته در آزمایش ینگ تکفام باشد، ما نوارهای تداخلی یک در میان روشن (اینجا زرد) و تیره‌ای خواهیم داشت. ولی اگر نور زرد، ترکیبی از دو نور قرمز و سبز باشد، نوارهایی به چینی وضوحی نخواهیم داشت و نتیجه کار از برهم نهی امواج تداخلی

۱۱. در شکل های زیر، برتری فرودی که شامل فرودهای فرمزد و بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط بازمی‌تابد و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد نشسته می‌شود.




۱۲. در شکل های زیر، برتری فرودی که شامل فرودهای فرمزد و بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط بازمی‌تابد و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد نشسته می‌شود.



۱۳. دو دانش آموز به نور زرد نگاه می‌کنند. یکی از آنها نور زرد را ترکیب دو نور فرمزد و سبز و دیگری آن را از یک نوع رنگ می‌داند. به نظر شما با چه تجربه ای می‌توان بین این دو نظر یکی را انتخاب کرد؟

۱۴. در یک تشت موج، مطلق شکل زیر، موج تختی ایجاد شده است. توضیح دهید با باریک کردن شکاف‌ها چه شکلی برای جبهه های موج خروجی از آنها حاصل می‌شود.




۱۵. گونی های همراه با امواج رادیویی با بسامد حدود ۲GHz کار می‌کنند. توضیح دهید این امواج تحت چه شرایطی از موانع باریکتر می‌شوند و به منطقه سایه ای می‌رسند.

۱۶. طول موج نور فرمزد طعم - تون در هوا حدود ۶۳۳nm است، ولی در زجاجه جنس ۲۷۲mm است. الف) بسامد این نور چقدر است؟ ب) ضریب شکست زجاجه برای این نور چقدر است؟ ج) تندی این نور در زجاجه را محاسبه کنید. د) در گوشه فنجانی خالی قرار دهید و طوری مقابل آن قرار بگیرید که توانید سکه را ببینید. سپس می‌آنکه سوزن را حرکت دهید با زدن آن در فنجان آب می‌ریزید. به طوری که آب به سطح سکه موجب جابه‌جایی سکه شود. با برداشتن فنجان، سکه را خواهید دید. با رسم برتوها علت دیده شدن سکه را توضیح دهید.






۱۷. مطابق شکل، برتری نوری که از مایه به چشمان مشخص می‌رسد تحت زاویه ۶۰° به هوا برخورد کرده است. زاویه شکست این برتری در هوا چقدر است؟



قرمز و سبز حاصل می‌شود. به عبارتی، توجه کنید که اگر نور سبز را نداشتیم، نوارهای تداخلی یک در میان از قرمز و تیره حاصل می‌شد، و اگر نور قرمز را نداشتیم، نوارهای تداخلی یک در میانی از سبز و تیره حاصل می‌شد. حال در حضور این دو نور، نوارهای داخلی آنها روی هم می‌افتد. ولی توجه کنید که این برهم افتادن به طوری نیست که نوارها کاملاً برهم منطبق شوند. در واقع چون طول نوارهای تداخلی به طول موج به کاررفته مربوط است و هر چه طول موج بزرگ تر باشد، آنها نیز طویل ترند، بنابراین در همپوشانی، نوارها کاملاً بر هم منطبق نمی‌شوند.

برای مثال، نوار روشن مرکزی را در نظر بگیرید. وقتی نوارهای تداخلی حاصل از نور سبز و حاصل از نور قرمز را بر هم بنهیم، کل نوار سبز به نوار زرد تبدیل می‌شود، ولی اطراف آن تا سر نوارهای تاریک حاشیه‌های قرمز خواهند داشت. بنابراین نتیجه می‌گیریم که نور زرد ترکیبی باعث نوار مرکزی زرد رنگی می‌شود که کوتاه‌تر از نوار زرد مرکزی حاصل از یک نور زرد تکفام است؛ ضمن آنکه اطراف آن نیز ته رنگ قرمزی می‌گیرد.



(جالب است اگر آزمایش یانگ را با نوری سفید انجام دهیم، همچنان حاشیه‌های نوار مرکزی قرمز خواهد بود، زیرا پهنای این نوار از همه بیشتر است و در میانه نوار مرکزی هم نواری کاملاً سفید خواهیم داشت که از همپوشانی همه رنگ‌های طیف ایجاد شده است و در بین آنها رنگین کمانی از ترکیب رنگ‌های مختلف ایجاد می‌شود. شکل زیر طرحی تقریبی از چنین تصویری را نشان می‌دهد).




۱۴. در شکل زیر موج نوری فرودی از هوا وارد شیشه می‌شود. بخشی از موج در سطح جدایی دو محیط باز می‌ماند و بخشی دیگر شکست می‌یابد و وارد شیشه می‌شود. الف) مشخصه‌های موج بازمانده و موج شکست‌یافته را با موج فرودی مقایسه کنید. ب) جبهه‌های موج بازمانده و شکست‌یافته را رسم کنید.

۱۵. طول موج نور فرمت‌نور طیم - تون در هوا حدود ۶۳۳nm است، ولی در زجاجیه چشم ۲۷۲nm است. الف) بسامد این نور چقدر است؟ ب) عرض شکست زجاجیه برای این نور چقدر است؟ ب) تندی این نور در زجاجیه را محاسبه کنید. ج) سکای را در گوشه‌های داخلی خالی قرار دهید و طوری مقابل آن قرار گیرید که توانید سکای را ببینید. سپس می‌توان سکای را حرکت دهید تا آن را در همان آب ببینید. به طوری که آب ریختن شما موجب جابه‌جایی سکای شود. با پوشیدن فندان، سکای را خواهید دید. با رسم برتوها علت دیدن سکای را توضیح دهید.

۱۶. مطابق شکل، پرتو نوری که از مایع به چشمان منحنی می‌رسد تحت زاویه ۶۰° به هوا برخورد کرده است. زاویه شکست این پرتو در هوا چقدر است؟

۱۷. گونی‌های همراه با امواج رادیویی با بسامد حدود ۲GHz کار می‌کنند. توضیح دهید این امواج تحت چه شرایطی از موانع پراشیده می‌شوند و به منطقه سایه‌مانع می‌رسند.

۱۵ با باریک کردن پهنای شکاف، پدیده پراش به طور بارزتری خود را نشان می‌دهد و موجی که از شکاف خارج می‌شود از حالت موج تخت بیشتر خارج می‌شود و در حالتی که پهنای شکاف در حدود طول موج باشد موج‌های تخت به صورت امواج نیم‌دایره‌ای گسترده می‌شوند.




۱۶ نخست طول موج این امواج را محاسبه می‌کنیم :

$$\lambda = v / f = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{2 \times 10^9 \text{ s}^{-1}} = 0.15 \text{ m} \approx 15 \text{ cm}$$

این امواج از اجسامی به قطری حدود ۱۵cm یا کوچک‌تر، به خوبی پراشیده می‌شوند.

۱۷ از برهم نهی این دو موج، شکلی مانند زیر حاصل می شود :




۱۸ جابه جایی کل، جمع برداری هر جابه جایی مجزا است. چون جابه جایی های نقطه  $M$  در جهت های مخالف هم هستند، جمع برداری آنها برابر  $y_1 - y_2$  می شود که چون  $y_1 > y_2$  است، مقداری مثبت است.

۱۹ در نقطه  $P$  قله (ستیغ) موج ها همدیگر را قطع کرده اند و برهم نهاده شده اند و بنابراین تداخل کاملاً سازنده و دامنه موج برآیند بیشینه است. اما در نقطه  $Q$  قله (ستیغ) یک موج با دره (پاستیغ) موج دیگر تلاقی کرده است (توجه کنید که  $Q$  بر یک منحنی آبی و در میان دو منحنی قرمز است) و بنابراین همدیگر را تضعیف می کنند و دامنه کمینه است.

۲۰ الف) چون فاصله نقطه های  $S$  و  $L$  متناسب با طول موج به کار رفته در این آزمایش است، برای آنکه این آزمایش بسامدی انجام پذیر باشد باید فاصله نقطه های  $S$  و  $L$  مجاور نه خیلی زیاد، و نه خیلی کم باشد. الف) بسامد صوت گسیل شده از بلندگوها را چگونه تغییر دهیم تا فاصله های  $S$  و  $L$  مجاور به هم نزدیک شوند؟ بسامد صوت گسیل شده از بلندگوها را چگونه تغییر دهیم تا فاصله های  $S$  و  $L$  مجاور از هم دور شوند؟ ب) اگر آزمایش را به جای آنکه در هوا انجام دهیم، در آب انجام دهیم، بهای تواریتیک یا روشن چه تغییری می کند؟ ج) تازی که بین دو کیکه گاه معکوس شده است در هوا گاه اول خود یا بسامد  $f$  به نوسان درمی آید. شکل زیر جابه جایی اثر  $f = 0$  را نشان می دهد.


۲۱ الف) جابه جایی تازی در  $t = \frac{1}{4}T$  و  $t = \frac{3}{4}T$  رسم کنید. ب) فاصله بین تازی که گاه  $m\lambda$  است، اگر تازی موج عرضی در تازی  $m\lambda$  باشد، بسامد نوسان تازی چقدر می شود؟ ج) اگر تازی که طول آن  $150\text{ cm}$  است و در دو انتها بسته شده است، در  $t = 0$  خود نوسان می کند. تازی موج عرضی در این تازی  $25\text{ cm}$  و تازی صوت در هوا  $340\text{ m/s}$  است. الف) بسامد و بسامد طول موج صوتی گسیل شده از تازی چقدر است؟ ب) اگر بسامد اصلی یک تازی در  $800\text{ m/s}$  طول  $120\text{ cm}$  تازی را  $12\text{ Hz}$  باشد، الف) تازی موج عرضی در این تازی را به دست آورید. ب) کنش تازی چقدر است؟



۲۰ الف) چون فاصله نقطه های  $S$  و  $L$  متناسب با طول موج به کار رفته است، بنابراین برای آنکه نقطه های  $S$  و  $L$  به هم نزدیک باشند باید طول موج به کار رفته کوچک باشد. با توجه به اینکه  $f = v/\lambda$  است نتیجه می گیریم که این معادل با افزایش بسامد صوت است. ب) برای آنکه نقطه های  $S$  و  $L$  از هم دور شوند باید طول موج به کار رفته بزرگ باشد. با توجه به اینکه  $f = v/\lambda$  است نتیجه می گیریم که این معادل با کاهش بسامد صوت است.


۲۱ الف) پهنای نوارهای تداخلی در آزمایش ینگ متناسب با طول موج به کار رفته است. بنابراین با افزایش طول موج، پهنای نوارها زیاد می شود. پس پهنای نوارها با استفاده از نور تکفام قرمز به جای نور تکفام سبز، افزایش می یابد. ب) چون پهنای نوارهای تداخلی با طول موج به کار رفته متناسب است، با توجه به اینکه در حضور آب طول موج به  $\lambda/n$  تغییر پیدا می کند و کم می شود، بنابراین طول موج به کار رفته کاهش می یابد که این به معنای کاهش پهنای نوارها است. (توجه! در متن درس فقط به رابطه پهنای نوارها با طول موج پرداخته شده است. خوب است بدانید دو راه دیگر تغییر پهنای نوار، یکی تغییر دادن فاصله شکاف ها تا پرده، و دیگری تغییر فاصله شکاف ها از هم است.)

۲۲ الف) چون دوره تناوب برابر با عکس بسامد است ( $T = 1/f$ )، بنابراین  $t = \frac{1}{4}T$  معادل با  $t = \frac{1}{4f}$  و  $t = \frac{1}{3}T$  معادل با  $t = \frac{1}{3f}$  است. به عبارتی در زمان  $\frac{1}{4}$  دوره گذشته است و در زمان  $t = \frac{1}{3}$ ، نصف دوره. پس شکل ها (در مشابهت با شکل های ۴-۳۴ کتاب) چنین می شوند :




فصل ۱۰: برهم‌کنش امواج صوتی

**۴-۳** در آزمایش‌های صوتی (شکل ۳-۳ کتاب)، فاصله بین هر نقطه با صدای بالا (A) تا نقطه با صدای ضعیف (S) مجاورش، متناسب با طول موج صوتی به کار رفته در این آزمایش است. برای آنکه این آزمایش‌ها با دقت انجام شود باید فاصله نقطه‌های S و A مجاور به خیلی زیاد، و نه خیلی کم باشد. (الف) بسامد صوت گسیل‌شده از بلندگوها را چگونه تغییر دهیم تا نقطه‌های S و A مجاور به هم نزدیک شوند؟  
 (ب) بسامد صوت گسیل‌شده از بلندگوها را چگونه تغییر دهیم تا نقطه‌های S و A مجاور از هم دور شوند؟  
 (پ) در آزمایش‌های گنگ، (الف) اگر آزمایش را به جای تونک‌های سبز با تونک‌های قرمز انجام دهیم، پهنای هر تونک تاریک یا روشن چه تغییری می‌کند؟



**۴-۴** شکل‌های زیر نمودار جابه‌جایی مکان دو موج را در لحظه مشخصی نشان می‌دهد. جابه‌جایی برانده نقطه M در این لحظه چقدر است؟



(ب) اگر آزمایش را به جای آنکه در هوا انجام دهیم، در آب انجام دهیم، پهنای هر تونک تاریک یا روشن چه تغییری می‌کند؟  
 (پ) تاری که بین دو تونک‌ها محکم شده است در هاله‌های اول خود با بسامد  $f = 10^3$  Hz و نوسان درمی‌آید. شکل زیر جابه‌جایی  $x$  در  $t = 0$  را نشان می‌دهد.



(الف) جابه‌جایی  $x$  را در  $t = \frac{1}{4}T$  و  $t = \frac{3}{4}T$  رسم کنید.

(ب) فاصله بین تونک‌ها  $2.0 \text{ m}$  است. اگر تندی موج عرضی در تونک  $2.0 \text{ m/s}$  باشد، بسامد نوسان تاریک چقدر می‌شود؟  
 (پ) تار ویولنی که طول آن  $1.50 \text{ m}$  است و در دو انتها بسته شده است، در  $t = 0$  خود نوسان می‌کند. تندی موج عرضی در این تار  $250 \text{ m/s}$  و تندی صوت در هوا  $343 \text{ m/s}$  است. (الف) بسامد و (ب) طول موج صوتی گسیل‌شده از تار چقدر است؟  
 (پ) اگر بسامد اصلی یک تار ویولن به جرم  $8.0 \text{ mg}$  و طول  $22.0 \text{ cm}$  برابر  $440 \text{ Hz}$  باشد، (الف) تندی موج عرضی در این تار را به دست آورید. (ب) کشش تار چقدر است؟



(ب) از  $v = f\lambda$  استفاده می‌کنیم. با توجه به اینکه  $\frac{\lambda}{v} = 1/0.2 \text{ m}$  است، خواهیم داشت:

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{24 \text{ m/s}}{2 \text{ m}} = 12 \text{ Hz}$$

و یا به عبارتی  $12 \text{ Hz}$  می‌شود.

**۲۳ الف)** باید از رابطه ۴-۵ استفاده کنیم

که در اینجا  $n=1$  است:

$$f_n = \frac{nv}{2L}, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f_1 = \frac{v}{2L} = \frac{(1)(25 \text{ m/s})}{2(0.15 \text{ m})} = 833.3 \text{ Hz} \approx 833 \text{ Hz}$$

توجه کنید که بسامد موج روی تار همان بسامد موج صوتی است که تولید می‌شود. (ب) همان‌طور که گفتیم  $f_1$  بسامد موج صوتی است و بنابراین برای طول موج موج صوتی گسیل‌شده داریم

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{343 \text{ m/s}}{833 \text{ s}^{-1}} = 0.412 \text{ m} \approx 0.41 \text{ m}$$

**۲۴ الف)** دو سر تار بسته است و وقتی در پایین‌ترین بسامد خود نوسان می‌کند، طول آن دقیقاً نصف طول موج است. اگر  $L$  طول سیم و  $\lambda$  طول موج باشد،  $\lambda = 2L$  است (این را به‌طور مستقیم از رابطه ۴-۴ کتاب نیز می‌توانید ببینید). بسامد برابر  $f = v/\lambda = v/2L$  است که در آن  $v$  تندی موج روی تار ویولن است. بنابراین

$$v = 2Lf = 2(0.22 \text{ m})(92 \text{ Hz}) = 40.4 \text{ m/s} \approx 40.5 \text{ m/s}$$

که البته می‌توانستیم آن را به‌طور مستقیم با استفاده از رابطه ۴-۵ نیز به ازای  $n=1$  به دست آوریم.

(ب) تندی موج با  $v = \sqrt{F/\mu}$  داده می‌شود که در آن  $\mu = m/L$  است. بنابراین کشش تار چنین می‌شود:

$$F = \mu v^2 = \left(\frac{m}{L}\right)v^2 = \left(\frac{8.0 \times 10^{-6} \text{ kg}}{22.0 \times 10^{-2} \text{ m}}\right)(40.4 \text{ m/s})^2 = 0.9595 \text{ N} \approx 0.96 \text{ N}$$

(پ) برای بسامد اصلی، طول موج عرضی در تار  $\lambda = 2L$  است و بنابراین

$$\lambda = 2L = 2(0.22 \text{ m}) = 0.44 \text{ m}$$

بسامد صوت در هوا همان بسامد نوسان سیم است. ولی به خاطر تندی متفاوت صوت، طول موج متفاوت می‌شود. اگر هوا را با شاخص پایین  $a$  نشان دهیم، خواهیم داشت:


$$\lambda_a = \frac{v_a}{f} = \frac{34 \text{ m/s}}{92 \text{ s}^{-1}} = 0.3696 \text{ m} \approx 0.37 \text{ m} = 37 \text{ cm}$$

۳۱۱۱۱۱۱

ب) برای بسامد اصلی، طول موج موج عرضی در تار و طول موج امواج صوتی گسیل شده توسط تار چقدر است؟ تندی صوت در هوا را  $340 \text{ m/s}$  بگیرید.

ج) تار ویولنی به طول  $30 \text{ cm}$  و چگالی خطی جرمی  $0.65 \text{ g/m}$  در نزدیکی شدگی قرار داده شده است که توسط یک نوسان ساز صوتی با بسامد متغیر به کار می آید. معلوم شده است وقتی بسامد نوسان ساز در گستره  $50 \text{ Hz}$  تا  $150 \text{ Hz}$  تغییر می کند تار فقط هنگامی به نوسان در می آید که بسامد آن  $88 \text{ Hz}$  و  $132 \text{ Hz}$  باشد.

الف) چه بیده ای سبب به نوسان تار شده است؟  
ب) بسامد اصلی تار چقدر است؟ بسامد تار چقدر است؟  
ج) ریسمان های A و B، طول و چگالی خطی جرمی یکسانی دارند. ولی ریسمان B تحت کشش بیشتری نسبت به ریسمان A قرار دارد. شکل زیر چهار وضعیت (الف) تا (ت) را نشان می دهد که در آنها کشش های موج ایستاده در دو ریسمان وجود دارد. در کدام وضعیت ها احتمال دارد که ریسمان های A و B در بسامد تشدید یکسانی نوسان کنند؟



۱۱۲

**۲۵ الف)** همان طور که در متن درس آمده، تشدید باعث به نوسان در آمدن تار می شود. اگر بسامد مولد نوسان با بسامدهای ارتعاش تار منطبق شود، تار به تشدید درمی آید و در غیر این صورت، موج ایستاده بارزی ایجاد نمی شود. به عبارتی وقتی  $f = v/\lambda$  برابر با یکی از بسامدهای نوسان ساز باشند، این پدیده رخ می دهد.

ب) چون تار فقط در دو بسامد  $88 \text{ Hz}$  و  $132 \text{ Hz}$  به نوسان در می آید، تفاضل آنها برابر بسامد اصلی نوسان تار است. البته این را می توان به سادگی نیز اثبات کرد:

$$f_{n+1} - f_n = \frac{(n+1)v}{2L} - \frac{nv}{2L} = \frac{v}{2L}$$

که همان بسامد اصلی نوسان است. بنابراین

$$f_{n+1} - f_n = 132 \text{ Hz} - 88 \text{ Hz} = 44 \text{ Hz}$$

پ) در بالا ثابت کردیم  $f_{n+1} - f_n = v/2L$ ، که در آن  $v = \sqrt{F/\mu}$  است. بنابراین

$$f_{n+1} - f_n = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

و از آنجا

$$F = 4L^2 \mu (f_{n+1} - f_n)^2 = 4 \left( \frac{0.30 \text{ m}}{2} \right)^2 (0.65 \times 10^{-3} \text{ kg/m}) \times$$

$$(132 \text{ Hz} - 88 \text{ Hz})^2 = 45/3 \text{ N}$$

در اینجا خوب بود تندی صوت در تار ویولن نیز پرسیده می شد و آن را با تندی صوت در هوا مقایسه می کردیم. برای تندی صوت در تار داریم

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{45/3 \text{ N}}{0.65 \times 10^{-3} \text{ kg/m}}} = 264 \text{ m/s}$$

**۲۶** چون ریسمان B تحت کشش بیشتری نسبت به ریسمان A قرار دارد، تندی موج در این ریسمان بیشتر است، زیرا هر دو ریسمان چگالی خطی جرمی یکسانی دارند. پس طبق رابطه  $f_n = nv/2L$ ، با توجه به اینکه طول دو ریسمان یکسان است، درمی یابیم تنها در شکل (ت) که ریسمان B در هماهنگ اول و ریسمان A در هماهنگ دوم در نوسان است این امکان وجود دارد که ریسمان ها در بسامدهای تشدید یکسانی باشند.

**۲۷** همان طور که در حل مسئله ۲۵ نشان دادیم، تفاضل دو بسامد نوسان متوالی تار برابر با بسامد اصلی نوسان تار است. بنابراین

$$f = 390 \text{ Hz} - 65 \text{ Hz} = 325 \text{ Hz}$$

همان بسامد اصلی (پایه) است. پس بسامد هماهنگ بعدی پس از  $195 \text{ Hz}$  برابر با  $260 \text{ Hz} = 195 \text{ Hz} + 65 \text{ Hz}$  است. اگر بررسی کنیم عدد هماهنگ این بسامد تشدید ۴ است.

**۲۸ الف)** اگر بررسی کنید درمی یابید تفاوت بسامدهای تشدیدی برابر ۷۵Hz است و چون بسامد کمتر از ۴۰۰ Hz خواسته شده است، پس بسامد مورد نظر همان ۷۵Hz است.

**ب)** بسامد پنجم هماهنگ اول به ترتیب برابر با ۷۵Hz، ۱۵۰Hz، ۲۲۵Hz، ۳۰۰Hz و ۳۷۵Hz شده است که به ترتیب هماهنگ‌های اول تا پنجم هستند. بنابراین بسامد هماهنگ هفتم برابر است با:  $f_7 = 7(75 \text{ Hz}) = 525 \text{ Hz}$ .

**۲۹** توجه کنید آنچه در توصیف چگونگی انجام این آزمایش آمده است، صرفاً برای آن است. که مسئله از جنبه انتزاعی خارج شده و عملاً انجام پذیر باشد. اگر تار در نقطه C محکم گرفته شود، نوسان‌های تار به سمت راست منتقل نمی‌شوند. بنابراین در انجام این تجربه، چگونگی گرفتن تار در نقطه C مهم است و تا آنجا که ممکن است باید به آرامی گرفته شود. در این صورت، موج ایستاده‌ای مانند شکل زیر بر تار ایجاد می‌شود به طوری که نقطه‌های A، C، E، G و گره‌ها و نقطه‌های B، D، F شکم‌ها می‌شوند. بنابراین کاغذهای تاشده در نقطه‌های D و F به هوا برمی‌خیزند، در حالی که کاغذ واقع در E، در جای خود ثابت می‌ماند.

۳۰ الف) این بسامد کدام است؟  
ب) بسامد هماهنگ هفتم چند است؟  
ج) در شکل نشان داده شده، نقاط A، B، C، D، E، F، G و H در فاصله‌های یکسانی از هم قرار دارند. تار را در نقطه C به آرامی می‌گزیم. طوری که نوسان‌های بخش از تار که سمت چپ نقطه C است، بتواند به سمت راست این نقطه منتقل شود. اکنون تار را در نقطه B می‌نوازیم. بین ترتیب موج ایستاده‌ای در طول تار تشکیل می‌شود. بطوری که در نقطه‌های A و C گره و در نقطه B شکم آن قرار دارد. به گمان شما برای کاغذهای تاشده‌ای که در نقاط E، D، F و قرار دارند، چه رخ می‌دهد؟

۳۱ الف) چه بسامدهای سبب به نوسان درآمن تار شده است؟  
ب) بسامد اصلی تار چند است؟  
ج) بسامدهای A و B، طول و چگالی خطی جرمی یکسانی دارند. ولی ریسمان B تحت کشش بیشتری نسبت به ریسمان A قرار دارد. شکل زیر چهار وضعیت (الف) تا (د) را نشان می‌دهد که در آنها کشش‌های موج ایستاده در دو ریسمان وجود دارد. در کدام وضعیت‌ها احتمال دارد که ریسمان‌های A و B در بسامد تشدید یکسانی نوسان کنند؟

۳۲ وقتی گالن آبی را خالی می‌کنیم، با خالی شدن آب صدای گلوب گلوب را می‌شنویم. موقع خالی شدن گالن بسامد این صدا کمتر می‌شود (صدای تریز) یا بیشتر (صدای زیر) چرا؟

۳۳ در گذشته برای آگاه کردن کشتی‌ها از خطر صخره‌ها، در صدف‌های حلزونی می‌دیدند. امروزه بیشتر برای جشن‌ها و شادی‌ها در آنها می‌بندند. چگونه این صدف‌ها می‌توانند چنین صدایی ایجاد کنند؟



**۳۰** آنچه در این پرسش مطرح شده است در واقع وضعیتی مخالف پرسش ۴-۶ متن کتاب است که در آنجا با ریختن آب، بسامد صدایی که شنیده می‌شود، افزایش می‌یابد. در هنگام خالی شدن گالن، حجم فضای هوای داخل آن افزایش می‌یابد. هر چه فضای هوای خالی افزایش یابد، اندازه بسامدهای تشدیدی کمتر می‌شوند (این بسامدها با طول ستون هوا نسبت معکوس دارند). صدای حاصل از خالی شدن ظرف، گستره وسیعی از بسامدها را دارد که در هر لحظه، یکی از آنها با بسامد تشدیدی هوای درون ظرف منطبق می‌شود، بنابراین موقع خالی شدن گالن، مدام صداهای بم‌تر و بم‌تری (با بسامد کمتری) را می‌شنویم.

**۳۱** هنگام دمیدن در یک صدف حلزونی (conch) لب‌ها را روی دهانه باریک آن می‌فشارند. با دمیدن صدف حلزونی، لب‌ها به نوسان درمی‌آیند و اگر این کار با دقت صورت بگیرد، لب‌ها در بسامدهای مختلفی به نوسان در می‌آیند. نوسان لب‌ها در درون صدف، امواج صوتی را با همان بسامدهای نوسان لب به وجود می‌آورد. اگر برخی از این امواج با یکی از بسامدهای تشدید صدف منطبق شوند، در این صورت یک موج صوتی قوی را ایجاد می‌کنند. از لحاظ تجربی خوب است به یک آزمایش اشاره کنیم. در آن آزمایش، پایین‌ترین بسامد تشدید صدف ۳۳۲/۵Hz بود و بنابراین نوسان‌های لب در آن بسامد باعث تشدید در درون صدف در همان بسامد می‌شد.

## راهنمای پاسخ‌یابی پرشی‌ها و مسئله‌های فصل ۵

### ۱-۵ اثر فوتوالکتریک و فوتون

۱ الف

$$\lambda = 589 \text{ nm}, f, E = ?$$

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{589 \text{ nm}} = 2.10 \text{ eV}$$

$$E = (2.10 \text{ eV}) \left( \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} \right) = 3.36 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{589 \times 10^{-9} \text{ m}} = 5.09 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

ب) انرژی گسیل شده توسط لامپ در هر دقیقه برابر است با:

$$E_t = Pt = \left( \frac{\text{J}}{\text{s}} \right) (6 \cdot 0 \cdot \text{s}) = 300 \text{ J}$$

تعداد فوتون گسیل شده در هر دقیقه برابر است با:

$$n = \frac{E_t}{E} = \frac{300 \text{ J}}{3.36 \times 10^{-19} \text{ J}} = 8.9 \times 10^{20}$$

۲ الف)  $R_a = \frac{\text{توان خروجی}}{\text{توان ورودی}} = \frac{5.0 \times 10^{-3} \text{ W}}{5.0 \text{ W}} = 10^{-4}$

که برابر ۰/۰۱ درصد است.

ب) ابتدا انرژی هر فوتون خروجی را پیدا می‌کنیم.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{633 \text{ nm}} = 1.96 \text{ eV}$$

$$= (1.96 \text{ eV}) \left( \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} \right) = 3.13 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$E_t = Pt = \left( \frac{\text{J}}{\text{s}} \right) (1 \text{ s}) = 5 \times 10^{-3} \text{ J}$$

$$n = \frac{E_t}{E} = \frac{5 \times 10^{-3} \text{ J}}{3.13 \times 10^{-19} \text{ J}} = 1.59 \times 10^{16}$$

انرژی کل فوتون‌های خروجی در هر ثانیه برابر است با:

تعداد فوتون‌های خروجی در هر ثانیه برابر است با:


۳ چشمه نور را در مرکز کره‌ای به شعاع ۱ km در نظر می‌گیریم.

ابتدا تعداد فوتون‌هایی را که با طول موج ۵۵۰ nm از لامپ در هر ثانیه گسیل می‌شود مشابه قسمت (ب) مسئله قبل به دست می‌آوریم. انرژی کل فوتون‌های خروجی با طول موج ۵۵۰ nm در هر ثانیه برابر است با:

$$E_t = \frac{1}{100} \left( \frac{\text{J}}{\text{s}} \right) (1 \text{ s}) = \frac{5}{100} \text{ J}$$

انرژی هر فوتون با طول موج ۵۵۰ nm برابر است با:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{550 \text{ nm}} = 2.25 \text{ eV}$$



۱-۵ اثر فوتوالکتریک و فوتون

۱. یک لامپ حاوی گاز کاتد سرد، فوتون‌های با طول موج ۵۸۹ nm گسیل می‌کند.

۲. با فرض زایل و همجنین الکترون ولت بیان کنید.

۳. در هر دقیقه چند فوتون از این لامپ گسیل می‌شود؟

۴. توان باریکه تور خروجی یک لیزر گازی هلیوم نئون ۵۰ mW است. اگر توان ورودی این لیزر ۵۰۰ W باشد.

۵. اگر طول موج باریکه تور خروجی ۶۳۳ nm باشد، شمار فوتون‌های را پیدا کنید که در هر ثانیه از این لیزر گسیل می‌شود.

۶. یک لامپ رشته‌ای با توان ۱۰۰ W از فلزات یک کلوپتری دیده می‌شود. فرض کنید نور لامپ به طور یکنواخت در فضای اطراف آن منتشر می‌شود و بازده لامپ ۵ درصد است (یعنی ۵ W تابش مری گسیل می‌کند) و فقط ۱ درصد تابش دارای طول موجی در حدود ۵۵۰ nm است. در هر ثانیه چه تعداد فوتون با این طول موج دارد مردمک‌های چشم نظری می‌شود که در این فاصله قرار دارد؟ (قطر مردمک را ۲ mm در نظر بگیرید.)

۷. شدت تابش خورشید در خارج جو زمین حدود ۱۲۶ W/m<sup>2</sup> است؛ یعنی در هر ثانیه به سطحی برابر ۱ m<sup>2</sup> مقدار انرژی ۱۲۶ J می‌رسد. وقتی این تابش به سطح زمین می‌رسد مقداری زیادی از شدت آن به علت جذب در جو و ابرها از دست می‌رود. اگر شدت تابشی متوسط خورشید در سطح زمین با زای هر متر مربع حدود ۳۰۰ W/m<sup>2</sup> باشد، در هر ثانیه چند فوتون به هر متر مربع از سطح زمین می‌رسد؟ طول موج متوسط فوتون‌ها را ۵۷۰ nm فرض کنید.

۸. الف) منظور از اثر فوتوالکتریک چیست؟

ب) توضیح دهید نظریه کوانتومی تابش که توسط اینشتین مطرح شد و در آن نور به صورت مجموعه‌ای از بسته‌های انرژی در نظر گرفته شد چگونه به تبیین اثر فوتوالکتریک کمک کرد؟

ج) با معادله مربوط به اثر فوتوالکتریک به صورت  $K_{\text{max}} = hf - W$  بیان می‌شود. سه بخش این معادله را به طور جداگانه توضیح دهید.



$$= (2/25 \text{ eV}) \left( \frac{1/6 \times 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} \right) = 3/60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

تعداد فوتون‌هایی که در هر ثانیه با طول موج ۵۵۰ nm از این لامپ گسیل می‌شود برابر است با :

$$n = \frac{E_t}{E} = \frac{0.5 \text{ J}}{3/60 \times 10^{-19} \text{ J}} = 1/38 \times 10^{17}$$

به این ترتیب تعداد فوتون‌هایی که با این طول موج وارد چشم ناظر می‌شوند برابر است با :

$$n' = \left( \frac{\pi r^2}{4\pi R^2} \right) n = \left( \frac{10^{-6} \text{ m}^2}{4 \times 10^6 \text{ m}^2} \right) (1/38 \times 10^{17})$$

$$\Rightarrow n' = \left( \frac{1/38}{4} \right) \times 10^5 = 3/45 \times 10^4$$

۴ ابتدا انرژی متوسط هر فوتون را پیدا می‌کنیم.

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{570 \text{ nm}} = 2/17 \text{ eV}$$

$$= (2/17 \text{ eV}) \left( \frac{1/6 \times 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} \right) = 3/48 \times 10^{-19} \text{ J}$$

انرژی کل فوتون‌های رسیده به سطحی برابر ۱ m<sup>2</sup> در هر ثانیه برابر است با :

$$E_t = \left( 300 \cdot \frac{\text{J}}{\text{sm}} \right) (1 \text{ m}^2) (1 \text{ s}) = 300 \text{ J}$$

به این ترتیب تعداد فوتون‌هایی که در هر ثانیه به هر متر مربع از سطح زمین می‌رسد برابر است با :

$$n = \frac{E_t}{E} = \frac{300 \text{ J}}{3/48 \times 10^{-19} \text{ J}} = 8/62 \times 10^{20}$$

خوب است توجه دانش‌آموزان را به این نکته مهم جلب کنید که ایران از نظر جغرافیایی در وضعیت مطلوبی نسبت به تابش خورشید قرار گرفته است، میانگین انرژی‌ای که از تابش خورشید به هر متر مربع آن می‌رسد حدود ۱۰۰۰ J است. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی در ایران (به جز نوار شمالی) به مراتب از بسیاری از کشورهای دیگر جهان بازدهی بالاتری دارد.

۵ الف) لازم است دانش‌آموزان فهم درستی از پاراگراف اول بخش ۵-۱ ارائه دهند.

ب) اینشتین افزون بر اینکه نور را به صورت بسته‌های انرژی در نظر گرفت، فرض کرد که هر یک از این بسته‌های انرژی صرفاً با یکی از الکترون‌های سطح فلز برهم‌کنش می‌کند. اگر در حین برهم‌کنش، فوتون انرژی کافی داشته باشد تا الکترون را از سطح فلز خارج کند، اثر فوتوالکتریک رخ می‌دهد.

ب) کافی است دانش‌آموزان فهم درست خود را از هر یک از کمیت‌های مندرج در این رابطه را بیان کنند.

۶ الف) با کاهش بسامد نور فرودی نسبت به بسامد آستانه، اثر فوتوالکتریک رخ نمی‌دهد در حالی که با افزایش بسامد نور فرودی نسبت به بسامد آستانه، انرژی فوتون‌های تابش شده به سطح فلز افزایش می‌یابد و در نتیجه فوتوالکتریک‌ها با انرژی جنبشی بزرگ‌تری سطح فلز را ترک می‌کنند.

ب) افزایش شدت نور فرودی برای حالتی که بسامد فوتون‌ها از بسامد آستانه کمتر است، بدون آنکه اثر فوتوالکتریک رخ دهد تنها

پرسش‌ها و مسئله‌های فصل ۵

۳۴۳

۱. توضیح دهید چرا برای یک فلز معین، تغییر هر یک از کمیت‌های زیر چه تأثیری در نتیجه اثر فوتوالکتریک دارد.
- الف) افزایش یا کاهش بسامد نور فرودی نسبت به بسامد آستانه
- ب) افزایش شدت نور فرودی در بسامدهای کوچک‌تر از بسامد آستانه
- ب) کاهش شدت نور فرودی در بسامدهای بزرگ‌تر از بسامد آستانه
۲. حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از سطح فلز سیم برابر ۲.۲۸ eV است.
- الف) طول موج آستانه برای گسیل فوتوالکتریک از سطح فلز سیم چقدر است و با مراجعه به شکل ۶-۴ معلوم کنید این طول موج مربوط به چه رنگی است؟
- ب) آیا فوتون‌هایی با طول موج ۶۸۰ nm قادر به جدا کردن الکترون از سطح این فلز هستند؟
۳. تابش فرافشانی با طول موج ۲۰۰ nm بر سطح فلزی از جنس نیکل با تابع کار ۲.۱۰ eV بیاورد. بیشینه انرژی فوتوالکتریک‌های جدا شده از سطح نیکل را حساب کنید.
۴. هر گاه بر سطح فلزی نوری با طول موج ۲۲۰ nm بیاورد بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکتریک‌های گسیل‌شده حدود ۰.۵۰ eV است. بسامد آستانه برای گسیل فوتوالکتریک‌ها از سطح این فلز چقدر است؟
۵. ۳-۲ سطح خطی و مدل اتم بورورد - ۳۰۰
- الف) سطح گسیلی یک جسم در چه مواردی پیوسته و در چه مواردی گسسته است؟ منشأ فیزیکی این تفاوت را توضیح دهید.
- ب) توضیح دهید چگونه می‌توان سطح‌های گسیلی پیوسته و خطی را ایجاد کرد.
۶. شکل صفحه‌ی عدسه رشته‌ی طیف گسیلی گاز هیدروژن امی را روی نمودار تراز انرژی نشان می‌دهد که بر اساس مدل امی بور رسم شده است.

پوشش‌ها و مسئله‌های فصل ۵

۳۴۰۰۰۰

- ۵-۱ اثر فوتوالکتریک و فوتون**
۱. یک لامپ حاوی گاز کاتود سدیم، فوتون‌هایی با طول موج  $589\text{nm}$  گسیل می‌کند.
    - الف) بسامد و انرژی فوتون‌های گسیلی را حساب کنید. انرژی را برحسب ژول و همچنین الکترون‌ولت بیان کنید.
    - ب) فرض کنید توان تابشی عبود لامپ  $50\text{W}$  است. در هر دقیقه چند فوتون از این لامپ گسیل می‌شود؟
    - ج) توان بارگاه تور خروجی یک لیزر گازی هلیوم نئون  $50\text{mW}$  است. اگر توان ورودی این لیزر  $500\text{W}$  باشد، الف) بازده لیزر را حساب کنید. ب) اگر طول موج بارگاه تور خروجی  $633\text{nm}$  باشد، شمار فوتون‌هایی را بداند که در هر ثانیه از این لیزر گسیل می‌شود. ج) یک لامپ رشته‌ای با توان  $100\text{W}$  از فلز سدیم یک کیلوواتی دیده می‌شود. فرض کنید نور لامپ به‌طور یکنواخت در فضای اطراف آن منتشر می‌شود و بازده لامپ ۵ درصد است (یعنی  $5\text{W}$  تابش مری گسیل می‌کند) و فقط ۱ درصد این تابش دارای طول موجی در حدود  $550\text{nm}$  است. در هر ثانیه چه تعداد فوتون با این طول موج وارد مردمک‌های چشم ناظر می‌شود که در این فاصله قرار دارد؟ (قطر مردمک را  $7\text{mm}$  در نظر بگیرید.)
    - د) شدت تابشی خورشید در خارج جو زمین حدود  $126\text{W/m}^2$  است؛ یعنی در هر ثانیه به سطحی برابر  $1\text{m}^2$  مقدار انرژی  $126\text{J}$  می‌رسد. فرض این تابش به سطح زمین می‌رسد مفاداری زیادی از شدت آن به علت جذب در جو و ابرها از دست می‌رود. اگر شدت تابشی متوسط خورشید در سطح زمین بازای هر متر مربع حدود  $1000\text{W/m}^2$  باشد، در هر ثانیه چند فوتون به هر متر مربع از سطح زمین می‌رسد؟ طول موج متوسط فوتون‌ها را  $550\text{nm}$  فرض کنید.
    - ه) الف) منظور از اثر فوتوالکتریک چیست؟ ب) توضیح دهید نظریه کوانتومی تابش که توسط اینشتین مطرح شد و در آن نور به‌صورت مجموعه‌ای از بسته‌های انرژی در نظر گرفته شده چگونه به تبیین اثر فوتوالکتریک کمک کرد؟ ج) معادله مربوط به اثر فوتوالکتریک به‌صورت  $K_{\text{max}} = hf - W_0$  بیان می‌شود. سه بخش این معادله را به‌طور جداگانه توضیح دهید.
  ۲. توضیح دهید برای یک فلز معین، تغییر هر یک از کمیت‌های زیر چه تأثیری در نتیجه اثر فوتوالکتریک دارد.
    - الف) افزایش یا کاهش بسامد نور فرودی نسبت به بسامد آستانه
    - ب) افزایش شدت نور فرودی در بسامدهای کوچک‌تر از بسامد آستانه
    - ج) کاهش شدت نور فرودی در بسامدهای بزرگ‌تر از بسامد آستانه
    - د) حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون از سطح فلز سدیم برابر  $2.28\text{eV}$  است.
    - ه) الف) طول موج آستانه برای گسیل فوتوالکترون از سطح فلز سدیم چقدر است و با مراجعه به شکل ۴-۳ معلوم کنید این طول موج مربوط به چه رنگی است؟ ب) آیا فوتون‌هایی با طول موج  $680\text{nm}$  قادر به جدا کردن الکترون از سطح این فلز هستند؟ ج) تابش فرافشانی با طول موج  $200\text{nm}$  به سطح نغزای از جنس نیکل با تابع کار  $4.74\text{eV}$  تابده می‌شود. بیشینه انرژی فوتوالکترون‌های جدا شده از سطح نیکل را حساب کنید. د) هر گاه به سطح فلزی توری با طول موج  $440\text{nm}$  تابش پهنه انرژی جنبشی فوتوالکترون‌های گسیل‌شده حدود  $0.50\text{eV}$  است. بسامد آستانه برای گسیل فوتوالکترون‌ها از سطح این فلز چقدر است؟
    - ۳-۵ و ۳-۵ طیف خطی و مدل اتم رادرفورد-بور
    ۱. الف) طیف گسیلی یک جسم در چه مواردی پیوسته و در چه مواردی گسسته است؟ منشأ فیزیکی این تفاوت را توضیح دهید. ب) توضیح دهید چگونه می‌توان طیف‌های گسیلی پیوسته و خطی را ایجاد کرد. ج) شکل صفحه‌بندی سه رشته طیف گسیلی گاز هیدروژن اتمی را روی نمودار تراز انرژی نشان می‌دهد که بر اساس مدل اتمی بور رسم شده است.

تعداد فوتون‌هایی را که با سطح فلز برهم‌کنش می‌کنند افزایش می‌دهد و این برهم‌کنش سبب افزایش انرژی درونی فلز و در نتیجه افزایش دمای آن می‌شود. (پ) سبب کاهش فوتون‌ها و در نتیجه کاهش تعداد فوتوالکترون‌هایی می‌شود که از سطح فلز خارج می‌شوند.

۷ الف)

$$W_0 = 2.28 \text{ eV}$$

$$f_s = \frac{W_0}{h} \Rightarrow \lambda_s = \frac{hc}{W_0} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{2.28 \text{ eV}} \approx 544 \text{ nm}$$

این طول موج متناظر با رنگ سبز است.

(ب) خیر، زیرا بسامد آنها کمتر از بسامد آستانه است.

۸

$$K_{\text{max}} = hf - W_0 = \frac{hc}{\lambda} - W_0$$

$$= \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{200 \text{ nm}} - 4.74 \text{ eV} = 1.3 \text{ eV}$$

۹

$$K_{\text{max}} = \frac{hc}{\lambda} - W_0 \Rightarrow 0.5 \text{ eV} = \frac{1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}}{420 \text{ nm}} - W_0$$

$$\Rightarrow W_0 = 2.45 \text{ eV}$$

$$f_s = \frac{W_0}{h} = \frac{2.45 \text{ eV}}{4.14 \times 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}} = 5.92 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

۵-۲ و ۵-۳ طیف خطی و مدل اتم رادرفورد-بور :

۱۰ در پاراگراف اول بخش ۵-۲ در خصوص تفاوت طیف گسیلی اجسام جامد (که پیوسته است) و طیف گسیلی گازهای اتمی (که خطی است) توضیح داده شده است.

(ب) شکل‌های ۵-۶ و ۵-۸ روش تشکیل طیف گسیلی جسم جامد (مانند رشته تنگستن یک لامپ) و گاز اتمی (مانند گاز هیدروژن اتمی) نشان داده شده است.

۱۱ الف)  $n=1$  متناظر با حالت پایه اتم است و برای اتم هیدروژن، انرژی الکترون در حالت پایه  $13.6 \text{ eV}$  است.

(ب) از یک طرف برهم‌کنش بین اتم‌های گاز بسیار ناچیز است و از طرف دیگر بنا بر مدل بور، الکترون در مدارهایی با شعاع  $(r_n = a_0 n^2)$  و انرژی معین  $(E_n = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2})$  در فضای پیرامون هسته توزیع شده‌اند. لذا هنگام گذار الکترون‌ها بین دو مدار، تنها فوتون‌هایی با انرژی معین می‌توانند گسیل یا جذب شوند. به همین دلیل طیف گسیلی یا جذبی گازهای اتمی، خطی است.

(پ) بلندترین طول موج از  $n=2$  و کوتاه‌ترین طول موج از  $n=\infty$  به دست می‌آید. به این ترتیب داریم:

$$\lambda_{\text{max}} = \frac{4}{3R} \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{4}{3R} - \frac{1}{R} = \frac{1}{3R} \approx 30 \text{ nm}$$

$$\lambda_{\text{min}} = \frac{1}{R}$$

۱۲ الف) به شکل ۵-۱۸-ب و شرح متناظر با آن توجه شود.

ب) با توجه به شکل ۵-۱۶، هنگام عبور فوتون‌ها از سلول حاوی اتم‌های گازی، برخی از این فوتون‌ها که انرژی آنها برابر با اختلاف انرژی ترازهای اتم‌های درون گاز هستند جذب شده و به همین دلیل طیف ایجاد شده دارای خط‌های تاریکی است که طول موج آنها متناظر با طول موج همین فوتون‌های جذب شده است. نکته مهمی که باید توجه شود این است که مدت کوتاهی پس از جذب این فوتون‌ها توسط الکترون و رفتن به مدار بالاتر، دوباره الکترون به حالت قبلی بازمی‌گردد و فوتونی با همان طول موج جذب شده را گسیل می‌کند. از آنجا که جهت این فوتون در جهت فوتون جذب شده نیست (یعنی دارای جهت کاتوره‌ای است) لذا دائماً این خط‌های تاریک روی طیف جذبی گازهای اتمی مشاهده می‌شود.

پ) زیرا هنگام برخورد نور فرابنفش به یک ماده، به دلیل انرژی زیادی که فوتون‌های آن دارند ممکن است الکترون‌هایی پس از جذب انرژی فوتون، به چند تراز بالاتر از جایی که بوده‌اند بروند (شکل الف). پس از مدت کوتاهی (۱۰<sup>-۸</sup> s) و هنگام برگشت این الکترون‌ها ممکن است مستقیماً به تراز اولیه خود نروند و پس از رفتن روی ترازهای میانی به تراز اولیه خود بازگردند (شکل ب).

۱۳ الف و ب) به شرح مدل رادرفورد و شکل ۵-۵ توجه شود.

پ) زیرا ورقه‌های طلا را بدون آنکه دوام خود را از دست بدهند به اندازه کافی می‌توان نازک ساخت. معمولاً ورقه‌های طلا را با ضخامت صدها اتم نیز می‌توان ساخت.

ت) ناپایداری اتم. زیرا مطابق فیزیک کلاسیک، الکترون‌های (بار منفی) در حال چرخش به دور هسته (با بار مثبت) به تدریج انرژی خود را از دست می‌دهند و سرانجام روی هسته فرو می‌افتند.

۱۴ الف) با استفاده از رابطه ۵-۸ ( $E_n = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2}$ ) داریم:

$$\Delta E(n_u \rightarrow n_L) = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n_u^2} + \frac{13.6 \text{ eV}}{n_L^2} = (-13.6 \text{ eV}) \left( \frac{1}{n_u^2} - \frac{1}{n_L^2} \right)$$

$$\Delta E(4 \rightarrow 2) = \Delta E(4 \rightarrow 3) + \Delta E(3 \rightarrow 2) \tag{ب}$$

$$(-13.6 \text{ eV}) \left( \frac{1}{4^2} - \frac{1}{2^2} \right) = (-13.6 \text{ eV}) \left( \frac{1}{4^2} - \frac{1}{3^2} \right) + (-13.6 \text{ eV}) \left( \frac{1}{3^2} - \frac{1}{2^2} \right)$$

$$\frac{1}{16} - \frac{1}{4} = \frac{1}{16} - \frac{1}{9} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} = \frac{1}{16} - \frac{1}{4}$$



۱۵ الف) گذارهای ممکن از  $n=5$  به حالت پایه ( $n=1$ ) عبارت‌اند از:

$$\Delta E(5 \rightarrow 4) \quad \text{و} \quad \Delta E(4 \rightarrow 3) \quad \text{و} \quad \Delta E(4 \rightarrow 2) \quad \text{و} \quad \Delta E(4 \rightarrow 1)$$

$$\Delta E(5 \rightarrow 3) \quad \text{و} \quad \Delta E(3 \rightarrow 2) \quad \text{و} \quad \Delta E(3 \rightarrow 1)$$

شکل ۵-۱۸: انتقال الکترون به فرکانس بالاتر

ب) تنها تعداد بسیار کمی از ذره‌ها مانند ذره ۳ منحرف می‌شوند. این امر چه نکته‌ای را درباره ساختار اتم طلا نشان می‌دهد؟  
 ب) چرا رادرفورد در آزمایش خود از صفحه بسیار نازک طلا استفاده کرده بود؟  
 ت) شکل ب، به کدام مشکل مدل رادرفورد اشاره دارد؟ در مدل بور چگونه این مشکل رفع شده است؟




۱۶ با استفاده از رابطه بور برای انرژی الکترون در اتم هیدروژن، اختلاف انرژی  $E_5 - E_1 = E_5 - E_1 = -13.6 \text{ eV} \left( \frac{1}{5^2} - \frac{1}{1^2} \right)$  را حساب کنید.

ب) نشان دهید که:  
 $\Delta E(2 \rightarrow 1) = \Delta E(2 \rightarrow 3) + \Delta E(3 \rightarrow 1)$   
 $\Delta E(3 \rightarrow 1) = \Delta E(3 \rightarrow 2) + \Delta E(2 \rightarrow 1)$

۱۷ الکترون اتم هیدروژن در تراز  $n=5$  قرار دارد. با در نظر گرفتن تمام گذارهای ممکن، اگر این اتم به حالت پایه برود، امکان گسیل چند نوع فوتون با انرژی متفاوت وجود دارد؟

ب) فرض کنید فقط گذارهای  $\Delta n = 1$  مجاز باشند، در این صورت امکان گسیل چند نوع فوتون با انرژی متفاوت وجود دارد؟



الف) منظور از  $n=6$  و انرژی  $-13.6 \text{ eV}$  چیست؟  
 ب) بر اساس مدل اتمی بور دلیل خطی بودن طیف گسیلی گاز هیدروژن اتمی را توضیح دهید.

ب) اختلاف کوئانتوم و بلندترین و بلندترین طول موج در هر رشته را، گستره طول موج‌های آن رشته می‌نامند. گستره طول موج‌های رشته لیان ( $n_f = 1$ ) را پیدا کنید.

۱۸ الف) فرکانس جذب فوتون توسط اتم را توضیح دهید.  
 ب) با استفاده از مدل بور، چگونه می‌تواند خط‌های تاریک در طیف جذبی گاز هیدروژن اتمی را توجیه کنید؟

ب) وقتی که نور فرابنفش به بسیاری از مواد تابیده شود، تابش مرئی از خود گسیل می‌کنند. این پدیده فیزیکی نمونه‌ای از فوتوسنتزی است. آزمایش نشان می‌دهد در پدیده فوتوسنتزی طول موج‌های گسیل یافته معمولاً برابر همان طول موج نور فرودی یا بزرگتر از آن است. این پدیده را چگونه به کمک مدل بور می‌تواند تفسیر کنید؟




۱۹ متناهی مدل رادرفورد، نتایج آزمایش‌هایی بود که از براندگی ذره‌های آلفا توسط یک ورقه نازک طلا دست‌آمده بود (شکل الف).

الف) توضیح دهید چرا بیشتر ذره‌های آلفا مانند ذره‌های ۱ و ۲ با اصلاً منحرف نمی‌شوند یا به مقدار کمی منحرف می‌شوند.

فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی ۳۰۱

فصل ۵-۴: انتقالی به فیزیک اتمی

ب) تنها تعداد بسیار کمی از ذره‌ها مانند ذره ۳ منحرف می‌شوند. این امر چه نکته‌ای را درباره ساختار اتم پلان نشان می‌دهد؟  
ج) چرا رادرفورد در آزمایش خود از صفحه بسیار نازک طلا استفاده کرده بود؟  
د) شکل ب. به کدام مشکل مدل رادرفورد اشاره دارد؟ در مدل بور چگونه این مشکل رفع شده است؟



الف) منظور از  $n=6$  و انرژی  $-۷۳۶۰۰$  چیست؟  
ب) بر اساس مدل اتمی بور دلیل خطی بودن طیف گسیلی گاز هیدروژن اتمی را توضیح دهید.  
ج) اختلاف کوتناوبین بلندترین و بلندترین طول موج در هر رشته را، گستره طول موج‌های آن رشته می‌نامند. گستره طول موج‌های رشته لیان ( $n=1$ ) را پیدا کنید.

د) الف) فرکانس جذب فوتون توسط اتم را توضیح دهید.  
ب) با استفاده از مدل بور، چگونه می‌تواند خط‌های نازک در طیف جینی گاز هیدروژن اتمی را توجیه کنید؟  
ج) برای زمانی که نور فرابنفش به بسیاری از مواد تابیده شود، تابش مرئی از خود گسیل می‌کنند. این پدیده فیزیکی نمونه‌ای از فوتوسنتزی است. آزمایش نشان می‌دهد در پدیده فوتوسنتزی طول موج‌های گسیل‌یافته معمولاً برابر همان طول موج نور فرودی یا بزرگتر از آن است. این پدیده را چگونه به کمک مدل بور می‌توانید تفسیر کنید؟  
د) منتهای مدل رادرفورد، نتایج آزمایش‌هایی بود که از پراکنش ذره‌های آلفا توسط یک ورقه نازک طلا دست‌آمده بود (شکل الف). الف) توضیح دهید چرا بیشتر ذره‌های آلفا مانند ذره‌های ۱ و ۲ با اصلاً منحرف نمی‌شوند یا به مقدار کمی منحرف می‌شوند.

$$\Delta E(2 \rightarrow 1) \quad \text{و} \quad \Delta E(5 \rightarrow 2)$$

$$\Delta E(5 \rightarrow 1)$$

همان‌طور که دیده می‌شود در مجموع امکان  $10^\circ$  گذار وجود دارد. (ب) با توجه به شرط  $\Delta n=1$ ، تنها امکان ۴ گذار زیر وجود دارد.

$$\Delta E(3 \rightarrow 2) \quad \text{و} \quad \Delta E(4 \rightarrow 3) \quad \text{و} \quad \Delta E(5 \rightarrow 4)$$

$$\Delta E(2 \rightarrow 1)$$

۵-۴- لیزر

۱۶ الف) یعنی اتم‌ها در حالت عادی هستند و برانگیخته نشده‌اند.

ب) این انرژی سبب برانگیخته شدن اتم‌ها می‌شود.

پ) حالتی است که تعداد اتم‌های برانگیخته شده فراتر از تعداد اتم‌ها در حالت معمول باشد.

ت) درست برابر اختلاف انرژی ترازهای  $E_u$  و  $E_L$  است.

ث) هم بسامد، هم جهت و همگام (هم‌فاز) اند.

۱۷ فوتون‌های گسیل شده از رشته تنگستن لامپ دارای طیف گسترده و


پیوسته‌ای از طول موج‌ها هستند و در تمام جهت‌های مختلف حرکت می‌کنند

درحالی‌که آینه درون چراغ‌قوه جهت‌مندی بهتری به فوتون گسیل شده از

لامپ می‌دهد و فوتون‌ها در گستره فضایی کوچک‌تری منتشر می‌شوند.

فوتون‌های گسیل شده از لیزر، افزون بر اینکه هم‌بسامدند، هم‌جهت و همگام هستند.

ب) منظور از هم‌رنگی چیست؟  
ج) تا انرژی فوتون ورودی چقدر باید باشد تا فرکانس القایی انجام شود؟  
د) تا فوتون‌هایی که بر اثر فرکانس القایی و جهش الکترون‌ها به تراز پایین‌تر ایجاد می‌شوند چه ویژگی مشترکی دارند؟  
تأین می‌شود؟



د) در شکل زو نحوه گسیل فوتون‌ها از هر جسم نور شامل لامپ رشته‌ای، چراغ قوه یا لامپ رشته‌ای و لیزر با یکدیگر مقایسه شده است.

الف) با توجه به آنچه در این فصل فراگرفتید تفاوت فوتون‌های



## راهنمای پاسخ‌یابی به پرسشی‌ها و مسئله‌های فصل ۶

### ۱-۶ ساختار هسته

۱ اگر هنگام قرار گرفتن نوترون‌ها درون توپ تنیس، فضاهای خالی را نادیده بگیریم و ضریب پرتوزایی را یک در نظر بگیریم، در این صورت داریم:

$$\approx \frac{\frac{4}{3}\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{(3/2 \times 10^{-2} \text{ m})^3}{(10^{-15} \text{ m})^3} \approx 10^4$$

در توپ تنیس جای می‌گیرد

$$10^{13} \text{ kg} = 10^{-27} \text{ kg} \times 10^4 \approx \text{مرتبه بزرگی جرم توپ تنیس در این شرایط}$$

برای مقایسه خوب است بدانید مرتبه بزرگی جرم تمامی ساکنین روی کره زمین حدود  $10^{12} \text{ kg}$  است!

۲ الف)  $A = 208$  تعداد نوکلئون‌ها (عدد جرمی)

ب)  $N = A - Z = 208 - 82 = 126$

پ)  $q = +Ze = +82e$

۳ الف)

**بررسی‌ها و مسئله‌های فصل ۶**

**۱-۶ ساختار هسته**

۱. مرتبه بزرگی تعداد نوترون‌هایی را که می‌توان تک‌تک هم در یک توپ تنیس به شعاع ۳.۷۵ cm جای داد، تخمین بزنید. در این صورت مرتبه بزرگی جرم این توپ چقدر است؟ (مرتبه بزرگی شعاع و جرم نوترون را به ترتیب  $10^{-15} \text{ m}$  و  $10^{-27} \text{ kg}$  در نظر بگیرید.)

۲. برای  $^{208}\text{Pb}$  مطلوب است:

الف) تعداد نوکلئون‌ها  
ب) بار الکتریکی خالص هسته  
ج) در هر یک از موارد زیر تعداد  $X$  چه عددی را نشان می‌دهد و در هسته هر یک چند نوترون وجود دارد؟ در صورت لزوم از جدول تناوبی استفاده کنید.

د)  $^{208}\text{Pb}$  با  $^{209}\text{Bi}$   
ه)  $^{208}\text{Pb}$  با  $^{209}\text{Po}$   
۳. آیا می‌توان ایزوتوپ  $^{208}\text{Pb}$  را با روش شیمیایی از ایزوتوپ  $^{209}\text{Pb}$  جدا کرد؟ از ایزوتوپ  $^{209}\text{Pb}$  چطور؟ پاسخ خود را توضیح دهید.

**۲-۶ پرتوزایی طبیعی و نیمه‌عمر**

۱. جاهای خالی در فرایندهای واپسی زیر نشان‌دهنده یک یا چند ذره  $\alpha$ ،  $\beta^-$  یا  $\beta^+$  است. در هر واکنش، جای خالی را کامل کنید.

الف)  $^{238}\text{Pu} \rightarrow ^{234}\text{U} + \dots$   
ب)  $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \dots$   
ج)  $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Pa} + \dots$   
د)  $^{238}\text{U} \rightarrow ^{234}\text{Th} + \dots$


۲. هسته دختر بدست‌آمده از هر یک از واپسی‌های زیر را به صورت  $^Z_X$  مشخص کنید.

الف)  $^{238}\text{Pu}$  واپسی  $\alpha$  انجام دهد.  
ب) سدیم  $^{23}\text{Na}$  واپسی  $\beta^-$  انجام دهد.  
ج) بی‌نوترون  $^{23}\text{N}$  واپسی  $\beta^+$  انجام دهد.  
د)  $^{23}\text{O}$  واپسی  $\beta^-$  انجام دهد.

۳. هنگامی که نوترون جز زمین توسط پرتوهای کیهانی (که معمولاً از جنس پروتون، ذره‌های  $\alpha$  و الکترون هستند) پدیدار می‌شود، ایزوتوپ پروتوزی کرن ۱۴ یا آنگ کان با ۱۴ پروتون و ۷ نوترون می‌تولید می‌شود. این کرن پروتوزی، با کرن ۱۴ که بطور طبیعی در جو وجود دارد، در هر می‌آمزد. بررسی‌ها نشان داده است که بازای هر ۱۰۰۰۰ میلیارد اتم پایدار کرن ۱۴، تقریباً یک اتم پروتوزی کرن ۱۴ از این طریق وارد جو می‌شود.

۴. اتم‌های کرن جزئی از طریق حالت‌های بی‌نوترونی از قبیل فوتون‌ها و نوسان، به‌طور گام‌به‌گام مکان خود را عوض می‌کنند و به این جامدات منتقل می‌شوند. بطوری که اتم‌های کرن هر موجود زنده شامل کسر کوچک و ناچیزی از ایزوتوپ پروتوزی کرن ۱۴ است.

۵. وقتی موجود زنده‌ای می‌میرد، مقدار کرن پروتوزی به تله افتاده در موجود غیرزنده، با نیمه‌عمر ۵۷۳۰ سال رو به کاهش می‌گردد. کرن ۱۴ موجود در یک نمونه زغال فسیل ۱۵۶ درصد (معادل  $\frac{1}{6}$ ) مقدار عادی کرن ۱۴ موجود در زغال است که تازه تولد



$$^{195}_{78}\text{X} = ^{195}_{78}\text{Pt}$$

$$N = A - Z = 195 - 78 = 117$$

$$^{32}_{16}\text{X} = ^{32}_{16}\text{S}$$

$$N = A - Z = 32 - 16 = 16$$



$$^{61}_{29}\text{X} = ^{61}_{29}\text{Pm}$$

$$N = A - Z = 61 - 29 = 32$$


۴  $^{59}_{25}\text{X}$  و  $^{61}_{26}\text{X}$  از ایزوتوپ‌های منگنز هستند که به طریق شیمیایی قابل جداسازی نیستند. در حالی که  $^{61}_{26}\text{X}$  یکی از ایزوتوپ‌های آهن است و به سادگی می‌توان به روش شیمیایی آن را از ایزوتوپ منگنز جدا نمود.

۲-۶ پرتوزایی طبیعی و نیمه‌عمر


۵



۶



الف)




ب)

برش‌ها و سسته‌های فصل ۶

۱-۶ ساختار هسته

- ۱. مرتبه‌ی بزرگی تعداد نوترون‌هایی را که می‌توان تک هم در یک توب تنیس به شعاع ۳۲cm جای داد، تخمین بزنید. در این صورت مرتبه‌ی بزرگی جرم این توب چقدر است؟ (مرتبه‌ی بزرگی شعاع و جرم پروتون را به ترتیب  $10^{-16}m$  و  $10^{-27}kg$  در نظر بگیرید.)
- ۲. برای  $^{238}_{92}Pu$  مغلوب است:
  - الف) تعداد نوترون‌ها
  - ب) بار الکتریکی خالص هسته
  - ج) در هر یک از موارد زیر نماد X چه شعری را نشان می‌دهد و در هسته هر یک چند نوترون وجود دارد؟ در صورت لزوم از جدول تناوبی استفاده کنید.
- ۳. آیا می‌توان ایزوتوپ  $^{238}_{92}Pu$  را با روش تشخیصی از ایزوتوپ  $^{238}_{94}Pu$  جدا کرد؟ از ایزوتوپ  $^{238}_{94}Pu$  بطور واضح پاسخ خود را توضیح دهید.




- ۴. هنگامی که نیترون جز زمین توسط پرتوهای کیهانی (که معمولاً از جنس پروتون، ذره‌های  $\alpha$  و الکترون هستند) پیلران می‌شود، ایزوتوپ پرتوزای کربن  $^{14}_6C$  با آنگ بانی در لایه‌های فوقانی جو تولد می‌شود. این کربن پرتوزا با کربن  $^{12}_6C$  که بطور طبیعی در جو وجود دارد درهم می‌آمیزد. بررسی‌ها نشان داده است که به ازای هر ۱۰۰۰۰ میلیارد اتم پایدار کربن  $^{12}_6C$  تقریباً یک اتم پرتوزای کربن  $^{14}_6C$  از این طریق وارد جو می‌شود. اینها کربن جوانی از طریق فعالیت‌های بیولوژیکی از قبیل فوسنتز و تنفس، به‌جای کانون‌های مکان خود را عوض می‌کنند و به بدن جانداران منتقل می‌شوند. به طوری که آن‌ها کربن هر موجود زنده شامل کسر کوچک و بانی از ایزوتوپ پرتوزای کربن  $^{14}_6C$  است.
- ۵. وقتی موجود زنده‌ای می‌میرد، مقدار کربن پرتوزای  $^{14}_6C$  به تله افتاد در موجود غیرزنده، با نیمه‌عمر  $5730$  سال رو به کاهش می‌گردد. کربن  $^{14}_6C$  موجود در یک نمونه زغال فسیل، ۱۵۶ درصد معادل  $^{14}_6C$  مقدار عادی کربن  $^{14}_6C$  موجود در زغال است که تازه تولید شده است.



۷ یک راه برای دیدن سری‌های واپاشی پرتوزا، مراجعه به کتاب‌های مرجع هسته‌ای است ولی با مراجعه به اینترنت و با استفاده از کلیه واژه‌های (radioactive decay series) یا (decay chain) است. مراجعه به سایت زیر نیز برخی از سری‌های واپاشی پرتوزا را ارائه می‌دهد. حفظ کردن این سری و ارزشیابی از آن، جزو اهداف این فصل نیست.


www.en.wikipedia.org/wiki/decay-chain



برش‌ها و سسته‌های فصل ۶

۳-۱. ساختار هسته



- ۱. مرتبه‌ی بزرگی تعداد نوترون‌هایی را که می‌توان تک هم در یک نوبت تپش به شعاع ۳۲cm خای داد، تخمین بزنید. در این صورت مرتبه‌ی بزرگی جرم این نوب چقدر است؟ (مرتبه‌ی بزرگی شعاع و جرم نوترون را به ترتیب  $10^{-14}$  و  $10^{-27}$  kg در نظر بگیرید.)
- ۲. برای  $^{238}_{92}\text{Pu}$  مطلوب است:
  - الف) تعداد نوترون‌ها (ب) تعداد نوترون‌ها
  - ب) بار الکتریکی خالص هسته
  - ۳. در هر یک از موارد زیر نماد X چه عنصری را نشان می‌دهد و در هسته هر یک چند نوترون وجود دارد؟ در صورت لزوم از جدول تناوبی استفاده کنید.
  - الف)  $^{238}_{92}\text{Pu} \rightarrow ^{234}_{90}\text{Th} + X$  (ب)  $^{238}_{92}\text{Pu} \rightarrow ^{234}_{92}\text{Pu} + X$
  - ب) آیا می‌توان ایزوتوپ  $^{238}_{92}\text{Pu}$  را با روش تپش‌هایی از ایزوتوپ  $^{238}_{92}\text{Pu}$  جدا کرد؟ از ایزوتوپ  $^{238}_{92}\text{Pu}$  بطوراً پایش خود را توضیح دهید.



- ۴. هنگامی که نیترون جز زمین توسط پرتوهای کیهانی (که معمولاً از جنس پروتون، ذره‌های  $\alpha$  و الکترون هستند) پدیدار می‌شود، ایزوتوپ پرتوهای کربن  $^{14}_6\text{C}$  با آنگ تابش در لایه‌های فوقانی جو تولد می‌شود. این کربن پرتو، با کربن  $^{12}_6\text{C}$  که بطور طبیعی در جو وجود دارد درهم می‌آمیزد. ورسنا نشان داده است که به ازای هر ۱۰۰۰۰ میلیارد اتم پایدار کربن  $^{12}_6\text{C}$  تقریباً یک اتم پرتوهای کربن  $^{14}_6\text{C}$  از این طریق وارد جو می‌شود. اینها کربن جوانی از طریق فعالیت‌های بیولوژیکی از قبل فوسنتروفتس، بهنجو کانونهای مکان خود را عوض می‌کنند و به بین جاداران منتقل می‌شوند. بطوری که اینها کربن هر موجود زنده شامل کسر کوچک و تابش از ایزوتوپ پرتوهای کربن  $^{14}_6\text{C}$  است.
- وقتی موجود زنده‌ای می‌میرد، مقدار کربن پرتوهای به تله افتاده در موجود غیرزنده، با نیمه عمر ۵۷۳۰ سال رو به کاهش می‌گردد. کربن  $^{14}_6\text{C}$  موجود در یک نمونه زغال فسیل ۱۵۶ درصد (معادل  $\frac{1}{6}$ ) مقدار عادی کربن  $^{14}_6\text{C}$  موجود در زغال است که تازه تولد گزین  $^{14}_6\text{C}$  را پایش  $\beta^-$  انجام دهد.
- الف)  $^{14}_6\text{C}$  را پایش  $\alpha$  انجام دهد.
- ب) سیم  $^{238}_{92}\text{Pu}$  را پایش  $\beta^-$  انجام دهد.
- ب) نیترون  $^1_0\text{n}$  را پایش  $\beta^-$  انجام دهد.
- ب)  $^{14}_6\text{C}$  را پایش  $\beta^-$  انجام دهد.




در شکل‌های بالا، سری‌های واپاشی پرتوهای NP  $^{237}_{93}$  به  $^{208}_{81}\text{Ti}$  که هسته دختر پایدار است و همچنین  $^{235}_{92}\text{U}$  به هسته دختر پایدار  $^{207}_{82}\text{Pb}$  نشان داده شده است.

برای مثال در ادامه تعدادی از فرایندهای مربوط به واپاشی  $\alpha$  یا  $\beta^-$  اورانیم  $^{235}_{92}\text{U}$  به هسته دختر پایدار سرب  $^{207}_{82}\text{Pb}$  آمده است.




یا

همان‌طور که در تصویر مربوط پاسخ تمرین ۷ دیده می‌شود سری واپاشی پرتوهای نپتونیم  $^{237}_{93}\text{Np}$  آمده است.



همان‌طور که دیده می‌شود  $^{237}_{93}\text{Np}$  پس از واپاشی‌های  $\alpha$ ،  $\beta^-$ ،  $\alpha$  به هسته دختر رادیوم  $^{225}_{88}\text{Ra}$  تبدیل می‌شود که هنوز پرتو است و پس از واپاشی‌های دیگر به هسته دختر پایدار تالیوم  $^{205}_{81}\text{Tl}$  تبدیل می‌شود.

با توجه به گام‌های زمانی نشان داده شده روی نمودار شکل زیر، مشخص است که نمونه ۱، دارای بیشترین نیمه عمر و نمونه ۲ دارای کمترین نیمه عمر است.



$$\frac{1}{6^4} = \left(\frac{1}{6}\right)^6 = \left(\frac{1}{6}\right)^n \Rightarrow n = 6$$


بنابراین پس از ۶ نیمه‌عمر، کربن ۱۴ موجود در نمونه زغال قدیمی به ۱/۵۶ درصد مقدار کربن ۱۴ موجود در زغالی که تازه تولید شده، رسیده است. چون هر نیمه‌عمر ۵۷۳ سال طول می‌کشد، در این صورت سن تقریبی این زغال برابر است با

$$6 \times 573 \text{ years} = 3438 \text{ years}$$

برش‌ها و هسته‌های فصل ۶

۱-۱ ساختار هسته

- ۱-۱-۱ مرتبه بزرگی تعداد نوترون‌هایی را که می‌توان تخمین هم در یک توب تنیس به شعاع ۳۲cm خای داد، تخمین بزنید. در این صورت مرتبه بزرگی جرم این توب چقدر است؟ (مرتبه بزرگی شعاع و جرم پروتون را به ترتیب ۱۰<sup>-۱۰</sup>kg و ۱۰<sup>-۲۷</sup>kg در نظر بگیرید.)
- ۱-۱-۲ برای <sup>۱۲۰</sup>Sn مغلوب است: (الف) تعداد نوترون‌ها (ب) تعداد پروتون‌ها (ج) بار الکتریکی خالص هسته (د) در یک از موارد زیر تعداد X چه عنصری را نشان می‌دهد و در هسته هر یک چند نوترون وجود دارد؟ در صورت لزوم از جدول تناوبی استفاده کنید.
- ۱-۱-۳ (الف) <sup>۱۲۰</sup>X (ب) <sup>۱۲۰</sup>X (ج) <sup>۱۲۰</sup>X (د) <sup>۱۲۰</sup>X آیا می‌توان ایزوتوپ <sup>۱۲۰</sup>X را با روش تئیسایی از ایزوتوپ <sup>۱۲۰</sup>X جدا کرد؟ از ایزوتوپ <sup>۱۲۰</sup>X چگونه می‌توان به توضیح دهید.



- ۱-۱-۴ هنگامی که نوترون جزو زمین توسط پروتوها کهنالی (که معمولاً از جنس پروتون، ذره‌های H و الکترون هستند) پیمبران می‌شود، ایزوتوپ پروتوزای کربن ۱۲ با آنگ‌های در لایه‌های فرمای جزو تولد می‌شود. این کربن پروتوزا، با کربن ۱۲ به‌طور طبیعی در جو وجود دارد. دهم می‌آید، و در سطح دریا، نزدیکاً است که به‌ازای هر ۱۰۰۰۰ میلیارد بار پیمابر کربن ۱۲، تقریباً یک‌گانه پروتوزای کربن ۱۲ از این طریق وارد جو می‌شود. اینها کربن جوی از طریق فعالیت‌های بیولوژیکی از قبل فوستر و نقش، به‌همراه کاتوره‌ای مکان خود را عوض می‌کند و به‌همراه جانداران منتقل می‌شوند. بطوری که اینها کربن موجود زنده شامل کسر کوچک و تابش از ایزوتوپ پروتوزای کربن ۱۲ است. و پس وجود زنده‌ای می‌شود، مقدار کربن پروتوزای به‌تله‌افاده در موجود غیرزنده، به‌همراه ۵۷۳ سال در یک کاشف می‌گذرد. موجود پروتوزای موجود در یک نمونه زغال قدیمی ۱۵۶ درصد همان <sup>۱۲</sup>C و مقدار عادی کربن ۱۲ موجود در زغالی است که تازه تولید شده.

۱۱ چهار ساعت معادل ۴ نیمه‌عمر است. بنابراین  $\left(\frac{1}{6}\right)^4 = \frac{1}{16}$  ماده اولیه، در نمونه بیسموت باقی می‌ماند.

۶-۲- شکافت هسته‌ای

۱۲ الف اورانیم ۲۳۵، که حاوی ۹۲ پروتون و ۱۴۳ نوترون است، عنصری پروتوزا و با نیمه‌عمر بسیار زیاد حدود ۷۰۰ میلیون سال است. به عبارت دیگر، این تعداد پروتون و نوترون که در هسته اتم اورانیم ۲۳۵ کنار یکدیگر جمع شده‌اند، سبب توازن بسیار خوبی در نیروی کولنی بین پروتون‌ها و نیروی هسته‌ای بین نوکلئون‌ها شده است و سبب ایجاد هسته‌ای با پایداری نسبتاً خوب شده است که در طبیعت نیز یافت می‌شود (توجه شود که تمامی هسته‌هایی که عدد اتمی آنها بیشتر از ۸۲ است، Z > ۸۲، ناپایدارند.)

ب) وقتی هسته اتم اورانیم ۲۳۵، یک نوترون کم انرژی (یا اصطلاحاً نوترون کند) را به دام می‌اندازد به هسته مرکب و به شدت ناپایداری تبدیل می‌شود که پس از ۱۰<sup>-۱۲</sup> ثانیه منجر به فرایند شکافت می‌شود. انرژی آزاد شده در هر فرایند شکافت، کمی بیش از ۲۰۰ MeV است. این انرژی عمدتاً مربوط به انرژی جنبشی پاره‌های شکافت و نوترون‌های ایجاد شده است. از آنجا که جرم محصولات شکافت، اندکی کمتر از جرم هسته مرکب اورانیم ۲۳۶ است، این اختلاف جرم بنا به رابطه معروف اینشتین E=mc<sup>2</sup>، سبب آزاد


تئوریت

- ۱-۲-۱ شده است. سن تقریبی این زغال قدیمی چقدر است؟
- ۱-۲-۲ معادله زیر بخشی از واکنش هسته‌ای است. در این واکنش عدد اتمی، عدد جرمی، و عنصر لارا در X تعیین کنید.
- ۱-۲-۳ معادله واکنش هسته‌ای زیر را در نظر بگیرید که در یک واکنش هسته‌ای روی می‌دهد.
- ۱-۲-۴ الف) اهمیت عددتهای ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید. ب) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید. ج) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید. د) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید.
- ۱-۲-۵ الف) اهمیت عددتهای ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید. ب) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید. ج) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید. د) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید.
- ۱-۲-۶ الف) اهمیت عددتهای ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید. ب) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید. ج) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید. د) اینها را با یکدیگر مقایسه کنید و تفاوت‌های آنها را توضیح دهید.




۳۲۹

گرما می‌شود. سن تقریبی این زغال فسیل چقدر است؟  
 نیمه‌عمر بیسپت ۱۲۴ حدود ۴۰ دقیقه است. سن از گذشت  
 چهار ساعت، چه کسری از ماده اولیه، در نمونه‌ای از این  
 بیسپت، باقی می‌ماند؟  
 در این واکنش عدد اتمی، عدد جرمی، و عدد X را  
 در واکنش تعیین کنید.



در صورت لزوم از جدول تناوبی کمک بگیرید.

در واکنش زیر چه تعداد نوترون تولید می‌شود؟



نوترون‌ها  ${}^{101}_{42}\text{Mo}$  و  ${}^{131}_{50}\text{Sn}$  به  ${}^{235}_{92}\text{U}$  +  $n$

۱۷. بازه انرژی هسته‌ای پهنه‌های حدود ۳۵ درصد است. حتی  
 ۶۵ درصد انرژی حاصل از شکافت اورانیم ۲۳۵، به  
 صورت گرما تلف و حدود ۳۵ درصد آن، به انرژی الکتریکی  
 تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه در هر شکافت حدود ۲.۰  
 انرژی آزاد می‌شود، چند کیلوگرم اورانیم ۲۳۵ در سال شکافت  
 پیدا می‌کند؟ فرض کنید نیروگاه در طول سال با توان به‌کار  
 ۱۰۰۰ مگاوات کار می‌کند.

#### ۴-۶ ساخت هسته‌ای

۱۷. انرژی آزاد شده در واکنش شکافت اورانیم ۲۳۵ با یک  
 نوترون کند حدود ۲۰۰-۲۱۰ MeV و در واکنش شکافت دوتریم  
 با انرژی حدود ۱۷.۴ MeV است.

الف) تعداد نوترون‌های شرکت‌کننده، در هر واکنش شکافت  
 چقدر است؟ انرژی آزاد شده به‌ازای هر نوترون را حساب کنید.  
 ب) تعداد نوترون‌های شرکت‌کننده، در هر واکنش شکافت  
 چقدر است؟ انرژی آزاد شده به‌ازای هر نوترون را حساب کنید.

ب) نتیجه‌های قسمت الف) و ب) را با یکدیگر مقایسه کنید. با  
 توجه به آثار روزافزون بشر به انرژی و توجه به اینکه مواد قابل  
 شکافت مانند  ${}^{235}\text{U}$  به مقدار بسیار کمی در طبیعت وجود دارد  
 ولی دوتریم به‌طور فراوان در آب اقیانوس‌ها و دریاها موجود  
 است و جدا کردن آن از هیدروژن معمولی آسان و کم‌هزینه است،  
 اهمیت این مقایسه را در توضیح دهید.

الف) اهمیت عدد‌های ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید.  
 ب) اتم‌های  ${}^{235}_{92}\text{U}$  با یکدیگر و خود به‌خود به قطعه‌های کوچک‌تر  
 همراه با تعدادی نوترون سریع (بین ۲ تا ۵ عدد) و مقدار زیادی  
 انرژی واپسیده می‌شود. این فرایند چه نام دارد و انرژی آزاد  
 شده در این فرایند چگونه تعیین می‌شود؟  
 ب) اورانیم ۲۳۵ عمدتاً نوترون‌های با انرژی کم را جذب می‌کند تا  
 نوترون‌های سریع را. توضیح دهید چگونه نوترون‌ها را در  
 قلب راکتور می‌کنند.  
 تا چگونه تولید انرژی را در قلب راکتور کنترل می‌کنند؟  
 تا واکنش زنجیری را توضیح دهید.

۱۸. معادله زیر بخشی از واکنش را نشان می‌دهد که در یک  
 راکتور هسته‌ای روی می‌دهد.



الف) اهمیت عدد‌های ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید.

ب) اتم‌های  ${}^{235}_{92}\text{U}$  با یکدیگر و خود به‌خود به قطعه‌های کوچک‌تر  
 همراه با تعدادی نوترون سریع (بین ۲ تا ۵ عدد) و مقدار زیادی  
 انرژی واپسیده می‌شود. این فرایند چه نام دارد و انرژی آزاد  
 شده در این فرایند چگونه تعیین می‌شود؟  
 ب) اورانیم ۲۳۵ عمدتاً نوترون‌های با انرژی کم را جذب می‌کند تا  
 نوترون‌های سریع را. توضیح دهید چگونه نوترون‌ها را در  
 قلب راکتور می‌کنند.  
 تا چگونه تولید انرژی را در قلب راکتور کنترل می‌کنند؟  
 تا واکنش زنجیری را توضیح دهید.

ج) انرژی به‌صورت گرما در قلب راکتور تولید می‌شود، چگونه  
 گرما از قلب راکتور گرفته و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود؟  
 د) هنگامی که میله‌های سوخت از مرکز راکتور بیرون کشیده  
 می‌شوند، آنها «پروتون‌هایی با نیمه‌عمر» طولانی  
 هستند. واژه‌های داخل گیومه را توضیح دهید.

۱۹. الف) حدود ۷۰ درصد اورانیم موجود در سنگ معین  
 طبیعی اورانیم از ایزوتوپ ۲۳۵ تشکیل شده است. در هر  
 واکنش شکافت حدود ۲۰۰ انرژی آزاد می‌شود. فرض  
 کنید تمامی ایزوتوپ ۲۳۵ موجود در یک کیلوگرم از این اورانیم  
 بتواند بر اثر شکافت، انرژی خود را آزاد کند. مقدار این انرژی  
 بر حسب مگاژول (MJ) و ژول (J) چقدر است؟  
 ب) با سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ، حدود ۳۰ MJ انرژی

شدن انرژی گرمایی زیادی عمدتاً به‌صورت انرژی جنبشی پاره‌های شکافت  
 می‌شود.

پ) آب معمولی ( $\text{H}_2\text{O}$ )، آب سنگین ( $\text{D}_2\text{O}$ ) و گرافیت (اتم‌های کربن) از  
 جمله موادی هستند که سبب کاهش انرژی جنبشی نوترون‌ها در واکنش‌های  
 شکافت هسته‌ای می‌شوند و اصطلاحاً نوترون‌های کند به نوترون‌های تند  
 تبدیل می‌شوند.

ت) با وارد کردن میله‌های کنترل به داخل قلب راکتور، آهنگ واکنش‌های  
 شکافت و در نتیجه تعداد نوترون‌های ایجاد شده از این واکنش‌ها را کنترل  
 می‌کنند. میله‌های کنترل معمولاً از جنس کادمیم یا بور (Boron) هستند که  
 مواد مناسبی برای جذب نوترون به حساب می‌آیند.

ث) واکنش زنجیری در راکتورهای شکافت، با جذب نوترون‌های کند توسط  
 هسته‌های اورانیم ۲۳۵ شروع می‌شود. در این فرایند با ایجاد هسته اورانیم  
 ۲۳۶، که به شدت ناپایدار است، پس از  $10^{-12}$  ثانیه به دو پاره شکافت و  
 تعدادی نوترون سریع به‌وجود می‌آید. پس از کند شدن نوترون سریع و جذب  
 آنها توسط هسته‌های دیگر اورانیم ۲۳۵، این فرایند به‌طور زنجیری و در کسر  
 کوچکی از زمان، ادامه پیدا می‌کند.

ج) گرمای حاصل از فرایند شکافت، توسط شاره‌ای که معمولاً آب است گرفته می‌شود و به خارج از راکتور انتقال داده می‌شود.  
 جزئیات بیشتر در شکل ۶-۱۳ ب کتاب درسی نشان داده شده است.

چ) پروتوزا: یعنی هسته‌هایی که با گسیل ذرات  $\alpha$ ،  $\beta$  یا  $\gamma$ ، واپسیده می‌شوند.  
 ایزوتوپ: مجموعه‌ای از هسته‌های یک اتم که Z یکسان و تعداد نوترون متفاوت دارند.  
 نیمه‌عمر: مدت زمانی که طول می‌کشد تا نیمی از هسته‌های یک نمونه پروتوزا، واپاشی کنند.  
 الف) ابتدا جرم یک مول سنگ معدن طبیعی اورانیم را به‌دست می‌آوریم.

$$M(\text{U}) = \frac{1}{1000} (\%7 \times 235 + 99/3 \times 238) \approx 0.238 \text{ kg/mol}$$

به این ترتیب تعداد اتم‌های ۱ kg سنگ معدن طبیعی اورانیم برابر است با

$$N = \left( \frac{1 \text{ kg}}{0.238 \text{ kg}} \right) \times 6.022 \times 10^{23} = 2.53 \times 10^{24}$$

تعداد اتم‌های اورانیم ۲۳۵ در ۱ mg سنگ معدن طبیعی برابر است با

$$n = \frac{V}{1000} \times 2.53 \times 10^{24} = 1.77 \times 10^{22}$$

اگر تمامی این اتم‌های اورانیم ۲۳۵ بر اثر فرایند شکافت انرژی خود را آزاد کنند، انرژی آزاد شده برابر است با

$$E = 1.77 \times 10^{22} \times 200 \text{ MeV} = 3.54 \times 10^{24} \text{ MeV}$$

$$= (3.54 \times 10^{24} \text{ eV}) \left( \frac{1.6 \times 10^{-19} \text{ J}}{1 \text{ eV}} \right) \approx 5.66 \times 10^{11} \text{ J}$$

ب) مقدار زغال سنگ که باید بسوزد تا انرژی معادل  $5/66 \times 10^{11} \text{ J}$  ایجاد کند برابری است با

$$m = (5/66 \times 10^{11} \text{ J}) \left( \frac{1 \text{ kg}}{30 \times 10^6 \text{ J}} \right) = 1/88 \times 10^4 \text{ kg}$$

حدود ۱۹ تن زغال سنگ باید بسوزد تا انرژی معادل انرژی حاصل از شکافت اورانیم‌های ۲۳۵ داخل سنگ معدن طبیعی آزاد شود. این نتیجه اهمیت غنی‌سازی اورانیم را نشان می‌دهد که برای نیروگاه‌های هسته‌ای درصد اورانیم ۲۳۵ را در میله‌های سوخت به حدود ۳ تا ۵ درصد می‌رسانند.




با توجه به موازنه بودن عدد جرمی و عدد اتمی در دو طرف معادله واکنش، داریم

$$A = (1 + 235) - (133 + 4) = 99$$


$$Z = (92 + 0) - (51 + 0) = 41$$

با مراجعه به جدول تناوبی، که در پیوست پایان کتاب آمده است، نام عنصر پاره شکافت نیویوم  $^{99}_{41}\text{Nb}$  است.

گره‌های آزاد می‌شود. چند کیلوگرم زغال سنگ باید بسوزد تا معادل انرژی به دست آمده در فست‌انف، انرژی تولید شود؟  
**۱۱.** یکی از واکنش‌های ممکن در شکافت  $^{235}_{92}\text{U}$  داده شده است. در این واکنش عدد اتمی، عدد جرمی،  $A$  و عنصر  $X$  را در  $^A_Z\text{X}$  تعیین کنید.



در صورت لزوم از جدول تناوبی کمک بگیرید.  
**۱۲.** در واکنش زیر چه تعداد نوترون تولید می‌شود؟



الف) اهمیت عدد‌های ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید.  
 ب) اتم‌های  $^{235}_{92}\text{U}$  پایدارند و خودبخود به قطعه‌های کوچک‌تر همراه با تعدادی نوترون سریع (بین ۲ تا ۵ عدد) و مقدار زیادی انرژی واکنش می‌دهند. این فرایند چه نام دارد و انرژی آزاد شده در این فرایند چگونه تعیین می‌شود؟  
 ب) اورانیم ۲۳۵ عمدتاً نوترون‌های با انرژی کم را جذب می‌کند تا نوترون‌های سریع را. توضیح دهید چگونه نوترون‌ها را در قلب راکتور گرم می‌کنند.  
 تا چگونه تولید انرژی را در قلب راکتور کنترل می‌کنند؟

تا واکنش زنجیری را توضیح دهید.

ج) انرژی به صورت گرما در قلب راکتور تولید می‌شود، چگونه گرما از قلب راکتور گرفته و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود؟

د) واکنش‌های داخلی گویسه را توضیح دهید.

ه) الف) حدود ۷ درصد اورانیم موجود در سنگ معدن طبیعی اورانیم از اورانیم ۲۳۵ تشکیل شده است. در هر واکنش شکافت حدود  $200 \text{ MeV}$  انرژی آزاد می‌شود. فرض کنید تمامی اورانیم ۲۳۵ موجود در یک کیلوگرم از این اورانیم بتواند براتر شکافت، انرژی خود را آزاد کند. مقدار این انرژی بر حسب مگاالکترون‌ولت (MeV) و ژول (J) چقدر است؟

ب) با سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ، حدود  $30 \text{ MJ}$  انرژی

تولید می‌شود. با توجه به اینکه در هر شکافت حدود  $200 \text{ MeV}$  انرژی آزاد می‌شود، چند کیلوگرم اورانیم ۲۳۵ در سال شکافت پیدا می‌کند؟ فرض کنید نیروگاه در طول سال با توان به‌کار ۱۰۰۰ مگاوات کار می‌کند.

۱۳. شکافت هسته‌ای

۱۴. انرژی آزاد شده در هر واکنش شکافت اورانیم ۲۳۵ با یک نوترون کند حدود  $200 \text{ MeV}$  و در هر واکنش شکافت دوتریم با ترتیب حدود  $17.4 \text{ MeV}$  است.

الف) تعداد نوترون‌های شرکت‌کننده در هر واکنش شکافت چقدر است؟ انرژی آزاد شده به‌ازای هر نوترون را حساب کنید.

ب) تعداد نوترون‌های شرکت‌کننده در هر واکنش شکافت چقدر است؟ انرژی آزاد شده به‌ازای هر نوترون را حساب کنید.

ب) نتیجه‌های فست (الف) و (ب) را با یکدیگر مقایسه کنید. با توجه به نیاز روزافزون بشر به انرژی و با توجه به اینکه مواد قابل شکافت مانند  $^{235}\text{U}$  به مقدار بسیار کمی در طبیعت وجود دارد ولی دوتریم به‌طور فراوان در آب اقیانوس‌ها و دریاها موجود است و جدا کردن آن از هیدروژن معمولی آسان و کم‌هزینه است، اهمیت این مقایسه را توضیح دهید.

۱۵. با توجه به فرض مسئله، اگر توان نیروگاه را  $1000 \text{ mW}$  در نظر بگیریم در این صورت انرژی معادل این توان در یک سال برابر است با

$$E = (10^3 \times 10^6 \text{ J/s}) (24 \times 3600 \times 365 \text{ s})$$

$$= 3/15 \times 10^{16} \text{ J} = (3/15 \times 10^{16} \text{ J}) \left( \frac{1 \text{ eV}}{1/6 \times 10^{-19} \text{ J}} \right)$$

$$= 1/97 \times 10^{25} \text{ eV} = 1/97 \times 10^{26} \text{ MeV}$$

از آنجا که بازده نیروگاه حدود ۳۵ درصد است، لذا تنها انرژی معادل  $200 \text{ MeV} \times \frac{35}{100}$  از هر فرایند شکافت اورانیم ۲۳۵ به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. به این ترتیب تعداد اتم‌های اورانیم ۲۳۵ که باید شکافت یابند تا انرژی معادل  $E$  را تولید کنند برابر است با

$$n = \frac{1/97 \times 10^{26} \text{ MeV}}{0/35 \times 200 \text{ MeV}} = 2/81 \times 10^{27}$$


از آنجا که جرم هر مول  $(6/022 \times 10^{23})$  اورانیم ۲۳۵ معادل  $235 \text{ g}$  است، جرم اورانیم ۲۳۵ مورد نیاز برابر است با

$$m = (0/235 \text{ kg}) \left( \frac{2/81 \times 10^{27}}{6/022 \times 10^{23}} \right) = 1100 \text{ kg}$$

این مقدار اورانیم ۲۳۵ در میله‌های سوخت، که معمولاً بین ۳ تا ۵ درصد آنها حاوی اورانیم ۲۳۵ است، توزیع شده‌اند.


۳۳۱

گرمای آزاد می‌شود. چند کیلوگرم زغال سنگ باید بسوزد تا معادل انرژی به دست آمده در فission آلفا، انرژی تولید شود؟  
**۱۶.** یکی از واکنش‌های ممکن در شکافت  $^{235}\text{U}$ ، داده شده است. در این واکنش عدد اتمی، عدد جرمی، و عنصر X را در  $X$  تعیین کنید.



در صورت لزوم از جدول تناوبی کمک بگیرید.

**۱۷.** در واکنش زیر چه تعداد نوترون تولید می‌شود؟



**۱۸.** بازه انرژی هسته‌ای پرتوهای یونیزان حدود ۳۵ درصد است. یعنی ۳۵ درصد انرژی حاصل از شکافت ایزوتوپ اورانیم ۲۳۵، بصورت گرما تلف و حدود ۳۵ درصد آن، به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود. با توجه به اینکه در هر شکافت حدود ۲.۰۰ MeV انرژی آزاد می‌شود، چند کیلوگرم اورانیم ۲۳۵ در سال شکافت پیدا می‌کند؟ فرض کنید نیروگاه در طول سال با توان باعبار ۱۰۰۰ مگاوات کار می‌کند. (

**۴-۴ شکافت هسته‌ای**

**۱۷.** انرژی آزاد شده در هر واکنش شکافت اورانیم ۲۳۵ با یک نوترون کند حدود ۲۰۰-۲۱۰ MeV و در هر واکنش گداخت دوتریم با ترتیب حدود ۳.۵ MeV است.

**الف)** تعداد نوترون‌های شرکت‌کننده در هر واکنش شکافت چقدر است؟ انرژی آزاد شده به ازای هر نوترون را حساب کنید. با تعداد نوترون‌های شرکت‌کننده در هر واکنش گداخت چقدر است؟ انرژی آزاد شده به ازای هر نوترون را حساب کنید.

**ب)** نتیجه‌های فission آلفا (الف) و ایزوتوپ  $^{235}\text{U}$  با نتیجه به‌عنوان پرتوهای یونیزان بیشتر به انرژی و با توجه به اینکه مواد قابل شکافت مانند  $^{235}\text{U}$  به مقدار بسیار کمی در طبیعت وجود دارد ولی دوتریم به‌طور فراوان در آب اقیانوس‌ها و دریاها موجود است و جدا کردن آن از هیدروژن معمولی آسان و کم‌هزینه است، اهمیت این مقایسه را توضیح دهید.

شده است. سن تقریبی این زغال فسیل چقدر است؟  
**۱۸.** نیمه‌عمر بیسپوت ۲۱۴ حدود ۴۰ دقیقه است. پس از گذشت چهار ساعت، چه کسری از ماده اولیه، در نمونه‌ای از این بیسپوت، باقی می‌ماند؟

**۴-۳ شکافت هسته‌ای**

**۱۶.** معادله زیر بخشی از واکنش را نشان می‌دهد که در یک راکتور هسته‌ای روی می‌دهد.



الف) اهمیت عدد‌های ۲۳۵ و ۹۲ را توضیح دهید.

**ب)** اتم‌های  $^{141}_{54}\text{Xe}$  پایدارند و خودبه‌خود به قطعه‌های کوچک‌تر همراه با تعدادی نوترون سریع (این ۵ تا عدد) و مقدار زیادی انرژی واپسینده می‌شود. این فرایند چه نام دارد و انرژی آزاد شده در این فرایند چگونه تعیین می‌شود؟

**ب)** اورانیم ۲۳۵ عمدتاً نوترون‌های با انرژی کم را جذب می‌کند تا نوترون‌های سریع را. توضیح دهید چگونه نوری نوترون‌ها را در قلب راکتور گرم می‌کنند.

تا چگونه تولید انرژی را در قلب راکتور کنترل می‌کنند؟

تا واکنش زنجیری را توضیح دهید.

**ج)** انرژی بصورت گرما در قلب راکتور تولید می‌شود، چگونه گرما از قلب راکتور گرفته و به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود؟  
**ج)** هنگامی که میله‌های سوخت از مرکز راکتور بیرون کشیده می‌شوند، آنها «پرتوهای» با «نیمه‌عمر» طولانی هستند. واکنش‌های داخل گویه را توضیح دهید.

**۱۸.** الف) حدود ۷۰ درصد اورانیم موجود در سنگ معدن طبیعی اورانیم از ایزوتوپ ۲۳۵ تشکیل شده است. در هر واکنش شکافت حدود ۲۰۰ MeV انرژی آزاد می‌شود. فرض کنید تمامی ایزوتوپ ۲۳۵ موجود در یک کیلوگرم از این اورانیم بتواند بر اثر شکافت، انرژی خود را آزاد کند. مقدار این انرژی بر حسب مگاالکترون‌ولت (MeV) و ژول (J) چقدر است؟

**ب)** با سوختن هر کیلوگرم زغال سنگ، حدود ۲۰ MJ انرژی

**۱۷ الف)** فرایند شکافت، با جذب یک نوترون کند توسط هسته اورانیم ۲۳۵ آغاز می‌شود. بنابراین تعداد نوترون‌هایی که در این فرایند مشارکت دارند برابر ۲۳۶ عدد است. به این ترتیب انرژی آزاد شده در فرایند شکافت به ازای هر نوترون برابر است با

$$E = \frac{200.5 \text{ MeV}}{236} \approx 0.85 \text{ MeV}$$

**ب)** واکنش گداخت یا در هم گداخته شدن دوتریم (شامل ۲ نوترون) و ترتیب (شامل ۳ نوترون) آغاز می‌شود. به این ترتیب در هر واکنش گداخت ۵ نوترون مشارکت دارند. انرژی آزاد شده در فرایند گداخت به ازای هر نوترون برابر است با

$$E = \frac{17.6 \text{ MeV}}{5} = 3.52 \text{ MeV}$$

**پ)** همان‌طور که نتایج قسمت‌های الف و ب نشان می‌دهد انرژی آزاد شده به ازای هر نوترون در فرایند گداخت، بیش از ۴ برابر انرژی آزاد شده به ازای هر نوترون در فرایند شکافت است. این موضوع و فراوانی دوتریم در آب اقیانوس‌ها و دریاها، نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری روی راکتورهای گداخت است.

